نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – ١٩٨٦.
يسوق الدواء من دون وصفة طبيب.

سترتس® تيسبت أكياس محلول للاستعمال الخارجي

كلورهيكسيدين چلوكونات ٠.٠١٥ ٪ w/v / سيتريميد ٠.١٥٪ w/v
Chlorhexidine gluconate 0.015% w/v / Cetrimide 0.15% w/v
المركبات غير الفعالة مفصلة في البند ٦.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مُلخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية, توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء لعلاجك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن وضعهم الطبي مشابه لوضعك. يجب استعمال الدواء بالشكل الصحيح.
عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو أنها لا تتحسن.
الدواء مخصص للكبار والأطفال.

١. لأي غرض مخصص الدواء؟
سترتس تيسبت مخصص للمساعدة في منع تلوثات تحدث خلال أو بعد الولادة, وكذلك في الجروح والحروق.
الفصيلة العلاجية: محلول معقم.

٢. قبل استعمال الدواء
لا يجوز استعمال الدواء:
- إذا كنت حساسًا للكلورهيكسيدين چلوكونات, للسيتريميد أو لأي مركب آخر في الدواء (مفصل في البند ٦). إذا لم تكن واثقًا بأن هذا ينطبق عليك, تحدث مع الطبيب أو الممرضة قبل استعمال الدواء.
- إذا كان هناك تخوف بأن المنتج سوف يدخل الدماغ, أغلفة الدماغ (الأغشية التي تحيط بالدماغ والنخاع الشوكي) أو الجزء الداخلي من الأذن.
- في داخل الفراغات الداخلية في الجسم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء
- تحدث مع الطبيب أو الممرضة قبل استعمال أكياس سترتس تيسبت.
- يجب تجنب ملامسة العينين والأذنين.
- قد تؤدي مواد التبييض المنزلية (التي تحتوي على hypochlorites) إلى ظهور بقع بنية في الأقمشة التي لامست محلول سترتس تيسبت في السابق.
- يمكن أن تقل فاعلية المنتج في الاستعمال سوية مع الصابون أو مواد تنظيف أخرى (منظفات).

أطفال
يجب الاستعمال بحذر لدى المواليد حديثي العهد, خاصة الخدج. قد يسبب سترتس تيسبت حروقًا كيميائية على الجلد.

إذا كنت تتناول, أو إذا تناولت مؤخراً, أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية, أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل, الإرضاع والخصوبة
إذا كنت حاملا أو مرضعة, تظنين أنك حامل أو تنوين الدخول في حمل, أطلبي نصيحة الطبيب أو الممرضة قبل استعمال الدواء.

٣. كيف تستعمل الدواء؟
عليك الاستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا.
للاستعمال الخارجي على الجلد فقط.
ليس مخصصًا للحقن.
عندما يستعمل الدواء في إجراء معقم, يجب تعقيم الجزء الخارجي من الكيس بواسطة كحول إيزوبروپيل ٧٠٪ قبل الفتح.
يجب التخلص من بقايا المحلول في نهاية الاستعمال.
يجب دهن المحلول من دون تخفيف على المنطقة المصابة من الجلد.

إذا بلع طفل بالخطأ من محلول سترتس تيسبت, توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا كان لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء, استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:
كما بكل دواء, إن استعمال سترتس تيسبت قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تفزع من قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من أي منها.

قد تظهر الأعراض الجانبية التالية; لا تتوفر معلومات دقيقة بخصوص الوتيرة لكن المعلومات الموجودة تبين بأن الأعراض نادرة جدًا (على ما يبدو تؤثر على أقل من ١ من بين كل ١٠,٠٠٠ شخص).

- تفاعلات تحسسية وخيمة (حساسية) التي قد تسبب مشاكل في التنفس, ضعف, إنهيار وموت. في بعض الأحيان يتجلى رد الفعل التحسسي في البداية بانتفاخ (خاصة في الشفتين/اللسان والوجه), أو بطفح.
مع أول ظهور لأي مما ذكر أعلاه, يجب تبليغ الطبيب أو الممرضة والتوقف فورًا عن استعمال سترتس تيسبت.

أعراض جانبية إضافية, ذات وتيرة غير معروفة, هي: اضطرابات جلدية تحسسية مثل التهاب في الجلد (Dermatitis), حكة (Pruritus), حمامى (Erythema- احمرار في الجلد), أكزيما, طفح, شرى (Urticaria), تهيج في الجلد وحويصلات.

تم التبليغ عن جلد جاف وفي حالات نادرة حروق كيميائية من بعد استعمال متكرر.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:
يمكنك الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية في أعقاب علاجي دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج الإنترنتي للتبليغ عن أعراض جانبية, أو من خلال دخول الرابط:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

٥. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم ! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انقضاء الصلاحية (Exp. date) المدون على العلبة. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخيرة من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين فوق درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية.
- خزن الأكياس في العلبة الأصلية (كيس البلاستيك).
- لا يجوز استعمال الدواء إذا لاحظت ضررًا أو تسرب من أكياس البلاستيك.
- لا يجوز رمي الدواء في المرحاض. إسأل الصيدلي حول كيفية رمي الأدوية التي لا تستعملها. هكذا بوسعك أن تساعد في حماية البيئة.

٦. معلومات إضافية

بالإضافة للمادة الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على:
ماء مقطر, صبغة طعام sunset yellow (E110) وصوديوم هيدروكسيدي.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة
سترتس تيسبت هو محلول جلدي أصفر وصافي يسوق بأكياس بلاستيك مع تصفيح التي تحتوي ٢٥ ملل أو ١٠٠ ملل محلول. هذه الأكياس مغلفة سوية في كيس بلاستيك خارجي.

رقم تسجيل الدواء: ١٥٦-٣٥-٣٤٤٠٥-٠٠

فُحصت هذه النشرة وتمت المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: حزيران ٢٠١٦

المنتج:
Medlock Medical Ltd., Tubiton House, Medlock Street, Oldham, OL13HS, United Kingdom

صاحب التسجيل:
راز للصيدلة م.ض, شارع همتيخت ٦, كديما

للتبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك, الدواء والمعلومات في النشرة مُخصصان لأبناء كلا الجنسين.