

Important!
Read this Quick Start
Guide and Patient
Leaflet Carefully

Work with your doctor when taking Venclexta.

- Your doctor may schedule blood tests before and during treatment with Venclexta to check for side effects.
- Follow your doctor's instructions exactly about:
 - When to start Prep Day 1
 - When you should take your first dose
- Ask your doctor if you have any additional questions.

How do I take Venclexta?

Take your dose:

- 1 time a day with a meal and water
 - at about the same time each day
- Swallow each tablet whole. Do not chew, crush or break the tablets.

Write the day of the week and the date you took your dose in each calendar box to keep track of your dose and water.

What if I miss my dose?

If it has been **less than 8 hours**, take your dose as soon as possible.
If it has been **more than 8 hours**, skip the missed dose. Take the next dose at your usual time.

Before
your first dose



1.5-2.0 L
(6-8 glasses)

It is important to stay hydrated.
Drink water every day when taking Venclexta.

Pay special attention:

- on Prep Day 1
- on Prep Day 2
- on the days marked "Drink Water"

Drink at least 1.5-2.0 L
(6-8 glasses) of water
throughout the day.

Before
1st Dose

Prep Day 1 and Prep Day 2 are the 2 days before the first dose of Venclexta, as directed by your doctor.

Prep Day 1



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)

Prep Day 2



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)

Week 1

Day 1



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take two
10 mg tablets

Day 2



Take two
10 mg tablets

Day 3



Take two
10 mg tablets

Day 4



Take two
10 mg tablets

Day 5



Take two
10 mg tablets

Day 6



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take two
10 mg tablets

Day 7



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take two
10 mg tablets

Week 2

Day 1



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take one
50 mg tablet

Day 2



Take one
50 mg tablet

Day 3



Take one
50 mg tablet

Day 4



Take one
50 mg tablet

Day 5



Take one
50 mg tablet

Day 6



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take one
50 mg tablet

Day 7



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take one
50 mg tablet

Week 3

Day 1



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take one
100 mg tablet

Day 2



Take one
100 mg tablet

Day 3



Take one
100 mg tablet

Day 4



Take one
100 mg tablet

Day 5



Take one
100 mg tablet

Day 6



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take one
100 mg tablet

Day 7



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take one
100 mg tablet

Week 4

Day 1



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take two
100 mg tablets

Day 2



Take two
100 mg tablets

Day 3



Take two
100 mg tablets

Day 4



Take two
100 mg tablets

Day 5



Take two
100 mg tablets

Day 6



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take two
100 mg tablets

Day 7



Drink Water
1.5-2.0 L (6-8 glasses)
Take two
100 mg tablets

VENCLEXTA
(10, 50, 100 mg
venetoclax) Tablets

Quick Start Guide

Read this Quick Start Guide before
you start taking your medication.

Use this Quick Start Guide to:

- Prepare for your medication.
- Understand your medication schedule.
- Correctly take your medication.



SH Ven QSG 21032016

יצרן: AbbVie Inc. צפון שיקגו, ארה"ב
המוצר: Venclexta, שיקגו, ארה"ב
מייצר: AbbVie Inc., North Chicago, USA

ונקללקסטא
(10, 50, 100 מ"ג
venetoclax) טבליות

מדריך מקוצר להתחלת הטיפול

יש לקרוא את המדריך המקוצר להתחלת
הטיפול לפני שתתחיל לקחת את התרופה.

יש להשתמש במדריך המקוצר להתחלת

- הטיפול כדי:
- להתכונן לקראת נטילת התרופה.
- להבין את לוח הזמנים של נטילת התרופה.
- לקחת את התרופה בצורה נכונה.

فینكلستا
(venetoclax) أقراص
١٠٠، ٥٠، ١٠ ملغ

دليل مختصر لبدء العلاج

يجب قراءة الدليل المختصر لبدء العلاج قبل بدءك
تناول الدواء.

يجب استعمال الدليل المختصر لبدء العلاج لكي

- تتجهز لتناول الدواء.
- تفهم جدول أوقات تناول الدواء.
- تتناول الدواء بشكل صحيح.

חשוב!

קרא בעיון את המדריך המקוצר להתחלת הטיפול ואת העלון לצרכן

יש לשתף פעולה עם הרופא במהלך הטיפול עם ונקלקסטה.

- ייתכן שהרופא יקבע עבורך בדיקות דם לפני ובמהלך הטיפול עם ונקלקסטה, על מנת לבדוק הופעת תופעות לוואי.
- יש לנהוג בדיוק על-פי הנחיות הרופא לגבי: - מתי להתחיל את 'יום ההכנה הראשון' - מתי עליך לקחת את המנה הראשונה
- אם יש לך שאלות נוספות כלשהן, פנה אל הרופא.

כיצד עליי לקחת ונקלקסטה?

קח את המנה שלך:

- פעם אחת ביום עם ארוחה ומים
- בערך באותה השעה בכל יום
- יש לבלוע כל טבליה בשלמותה. אין ללעוס, לכתוש או לשבור את הטבליות.
- יש לרשום את היום בשבוע ואת התאריך שבו לקחת את המנה שלך בכל תיבה המיועדת לתאריך כדי לעקוב אחר המנה שלך והמים.

אם שכחתי לקחת את המנה שלי

אם עברו פחות מ- 8 שעות, קח את המנה שלך בהקדם האפשרי.
אם עברו יותר מ- 8 שעות, דלג על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

מهم!

اقرأ الدليل المختصر لبدء العلاج والنشرة للمستهلك بتمعن

يجب التعاون مع الطبيب خلال فترة العلاج بفينكليستا.

- من الجائز أن يطلب منك الطبيب أن تجتاز فحوص الدم قبل وخلال العلاج بفينكليستا، وذلك من أجل تقصي ظهور أعراض جانبية.
- يجب التصرف بالضبط حسب تعليمات الطبيب بخصوص: - متى تبدأ "اليوم الأول للتحضير" - متى يتوجب عليك تناول الجرعة الدوائية الأولى
- إذا توفرت لديك أية أسئلة إضافية، راجع الطبيب.

كيف يتوجب علي تناول فينكليستا؟

تناول جرعتك الدوائية:

- مرة واحدة في اليوم مع وجبة طعام وماء
 - تقريبا في نفس الساعة كل يوم
- يجب بلع كل قرص بشكله الكامل. لا يجوز مضغ، سحق أو كسر الأقراص.

يجب تدوين اليوم من الأسبوع والتاريخ الذي تناولت فيه جرعتك الدوائية في كل خانة مخصصة للتاريخ وذلك لمتابعة جرعتك الدوائية وشربك للماء.

إذا نسيت تناول الجرعة الدوائية خاصتي

إذا انقضى أقل من - 8 ساعات، تناول جرعتك الدوائية بأسرع ما يمكن.

إذا انقضى أكثر من - 8 ساعات، فوّت الجرعة الدوائية المتسبة. تناول الجرعة التالية في الوقت الإعتيادي.

לפני

המנה הראשונה שלך



יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות)

חשוב שתהיה רווי בנוזלים.

יש לשתות מים כל יום במהלך הטיפול עם ונקלקסטה. יש לשים לב במיוחד:

- ל- 'יום ההכנה הראשון'
- ל- 'יום ההכנה השני'
- לימים המסומנים ב- "יש לשתות מים"

יש לשתות לפחות 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) של מים במשך היום.

قبل

جرعتك الدوائية الأولى



يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس)

من المهم أن تكون مشبع بالسوائل.

يجب شرب الماء كل يوم خلال فترة العلاج بفينكليستا.

يجب الإنتباه خاصة :

- لـ "اليوم الأول للتحضير"
- لـ "اليوم الثاني للتحضير"
- للأيام المعلّمة بـ "يجب شرب الماء"

يجب أن تشرب على الأقل ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) من الماء خلال اليوم.

לפני המנה הראשונה قبل الجرعة الدوائية الأولى

'יום ההכנה הראשון' ו'יום ההכנה השני' הם 2 הימים שלפני המנה הראשונה של ונקלקסטה, בהתאם להנחיות הרופא.

"اليوم الأول للتحضير" و "اليوم الثاني للتحضير" هما اليومان ما قبل الجرعة الدوائية الأولى من فينكليستا، وفقاً لتعليمات الطبيب.

שבוע 1

الأسبوع ١

יום 1 יום 1	יום 2 יום 2	יום 3 יום 3	יום 4 יום 4	יום 5 יום 5	יום 6 יום 6	יום 7 יום 7
יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת שתי טבליות של 10 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرصين من عيار ١٠ ملغ	יש לקחת שתי טבליות של 10 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار ١٠ ملغ	יש לקחת שתי טבליות של 10 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار ١٠ ملغ	יש לקחת שתי טבליות של 10 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار ١٠ ملغ	יש לקחת שתי טבליות של 10 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار ١٠ ملغ	יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת שתי טבליות של 10 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرصين من عيار ١٠ ملغ	יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת שתי טבליות של 10 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرصين من عيار ١٠ ملغ

שבוע 2

الأسبوع ٢

יום 1 יום 1	יום 2 יום 2	יום 3 יום 3	יום 4 יום 4	יום 5 יום 5	יום 6 יום 6	יום 7 יום 7
יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرص واحد من عيار ٥٠ ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار ٥٠ ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار ٥٠ ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار ٥٠ ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار ٥٠ ملغ	יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرص واحد من عيار ٥٠ ملغ	יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת טבליה אחת של 50 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرص واحد من عيار ٥٠ ملغ

שבוע 3

الأسبوع ٣

יום 1 יום 1	יום 2 יום 2	יום 3 יום 3	יום 4 יום 4	יום 5 יום 5	יום 6 יום 6	יום 7 יום 7
יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرص واحد من عيار ١٠٠ ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار ١٠٠ ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار ١٠٠ ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار ١٠٠ ملغ	יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب تناول قرص واحد من عيار ١٠٠ ملغ	יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرص واحد من عيار ١٠٠ ملغ	יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת טבליה אחת של 100 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرص واحد من עيار ١٠٠ ملغ

שבוע 4

الأسبوع ٤

יום 1 יום 1	יום 2 יום 2	יום 3 יום 3	יום 4 יום 4	יום 5 יום 5	יום 6 יום 6	יום 7 יום 7
יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת שתי טבליות של 100 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرصين من عيار ١٠٠ ملغ	יש לקחת שתי טבליות של 100 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار ١٠٠ ملغ	יש לקחת שתי טבליות של 100 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار ١٠٠ ملغ	יש לקחת שתי טבליות של 100 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار ١٠٠ ملغ	יש לקחת שתי טבליות של 100 מ"ג يجب تناول قرصين من عيار ١٠٠ ملغ	יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת שתי טבליות של 100 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرصين من عيار ١٠٠ ملغ	יש לשתות מים 2.0-1.5 ליטרים (8-6 כוסות) יש לקחת שתי טבליות של 100 מ"ג يجب شرب الماء ٢,٠ - ١,٥ لتر (٨-٦ كؤوس) يجب تناول قرصين من عيار ١٠٠ ملغ