

الأطفال: تحديد الجرعة الدوائية حسب الوزن. أطفال لديهم صعوبة في البلع، أنظر أعلاه.

علاج فائض الحموضة في المعدة بسبب ورم في البنكرياس (بمتلازمة زولينجر - إليسون [Zollinger Ellison syndrome])

الجرعة الدوائية الإبتدائية الإعتيادية هي ٦٠ ملغ مرة في اليوم. يرشدك الطبيب بخصوص كمية الكبسولات، زمن تناولها، وفترة العلاج.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية مفرطة من الدواء، أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد يجب تناول جرعة حال تذكر، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعتين معاً في نفس اليوم. يجب تناول الكبسولة التالية في الوقت المعتاد واستشارة الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج قبل إستشارة الطبيب حتى لو طرأ تحسن على وضعك الصحي.

كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعات الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال المستحضر قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

توجه للطبيب حالاً إذا:

• تطور لديك رد فعل تحسسي أو استهدافي (يتجلى بضيق تنفس، صفير مفاجئ، وإنتفاخ الجسم، في منطقة الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة، طفح، إغماء أو صعوبات في البلع).

• ظهر إحمرار في الجلد يرافقه ظهور حويصلات أو تقشر. قد تحدث أيضاً حويصلات خطيرة ونزف في الشفتين، في العينين، في الفم، في الأنف وفي الأعضاء التناسلية.

• تطور لديك يرقان (إصفرار العينين، الجلد، والأظافر وبول داكن) وتعب، الذي قد يدل على مشاكل في الكبد.

• ظهرت تقلصات، دوار، نظم قلب غير سليم أو اضطرابات في نظم القلب، عدم هدوء، عصبية، تشنج فجائي أو رجفان، ضعف في العضلات، تقلص في اليدين والرجلين، تقلصات في العضلات أو آلام عضلية، تقلصات في الحنجرة (علامات لمستوى صوديوم ومغنيزيوم منخفضة في الدم) - توقف عن العلاج وتوجه إلى الطبيب.

• حصل لديك إسهال شديد غير منقطع أو يرافقه آلام بطن قوية وسخونة.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (تؤثر على ١ حتى ١٠ من بين ١٠٠ معالج)

صداع، إسهال، إمساك، آلام بطن، غثيان (شعور بالمرض)، تقيؤ، إنتفاخ في البطن.

أعراض جانبية غير شائعة (تؤثر على ١ حتى ١٠ من بين ١٠٠٠ معالج)

إنتفاخ في الرجلين والكاحلين، نعاس، مشاكل في النوم، دوار، شعور بالتنميل، ترنج، شعور بالإغماء، إرتفاع بإنزيمات الكبد، طفح، حكة، إلتهاب الجلد (dermatitis)، شعور عام غير جيد وضعف.

أعراض جانبية نادرة (تؤثر على ١ حتى ١٠ من بين ١٠٠٠٠ معالج)

• مشاكل في جهاز الدم مثل إنخفاض في عدد كريات الدم البيضاء أو في الصفيحات الدموية التي قد تسبب أحياناً تلوّثات يرافقتها سخونة، قشعريرة شديدة، ألم في الحنجرة، تقرحات في الفم، نزف أو ميل للتعرض للكدمات بسهولة، تعب

• ردود فعل تحسسية، أحياناً شديدة جداً، يشمل إنتفاخ في الشفتين، في اللسان وفي الحنجرة، سخونة وصفير

• مستوى صوديوم منخفض في الدم - الذي قد يسبب ضعف، تقيؤ، تقلص

• تشوش الرؤية، تغيرات في المذاق

• عدم الهدوء، إرتباك، أو إكتئاب

• صفير مفاجئ أو ضيق تنفس (تشنج القصبات)

• جفاف في الفم، إلتهاب في داخل جوف الفم، فطريات في الفم أو في المريء

• مشاكل في الكبد، يشمل يرقان الذي يتجلى بإصفرار الجلد، بول داكن، وتعب

• تساقط الشعر أو خفة الشعر بشكل شان

• فرط حساسية الجلد للضوء

• إنتفاخ المفاصل مترافق بالآلام، آلام في العضلات أو ضعف العضلات

• مرض في الكلى

• تعرق زائد

أعراض جانبية نادرة جداً (تؤثر على أقل من ١ من بين ١٠٠٠٠ معالج)

• تغيرات في تعداد الدم يشمل نقص كريات الدم البيضاء (agranulocytosis)

• عدوانية

• هذيان (رؤية أو الإحساس بأشياء غير موجودة)

• قصور في الكبد يؤدي إلى ضرر في الدماغ

• تفشي مفاجئ لطفح شديد أو حويصلات أو تقشر الجلد. قد يكونوا مترافقين بسخونة وآلام في المفاصل (erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis)

• ضعف العضلات

• تضخم الثديين لدى الرجال

أعراض جانبية شيوعتها غير معروف

• طفح، يترافق أحياناً بالآلام في المفاصل.

• إلتهاب أمعاء يسبب إسهال شديد غير منقطع أو يرافقه آلام شديدة في البطن وسخونة.

• إذا كنت متواجداً بعلاج مع لوسك لفترة تزيد عن ٣ أشهر يحتمل أن يطرأ إنخفاض على مستوى المغنيزيوم لديك في الدم. تتجلى مستويات منخفضة من المغنيزيوم في الدم بالتعب، تقلصات لا إرادية في العضلات، إرتباك، تشنجات، دوار، أو إرتفاع بنبض القلب. إذا كنت تشعر بواحدة من هذه الأعراض عليك أن تحك للطبيب بأسرع ما يمكن. قد يؤدي إنخفاض مستويات مغنيزيوم في الدم أيضاً إلى إنخفاض في مستويات البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم. سوف يفكر الطبيب بإجراء فحوصات دم منتظمة لمراقبة مستويات المغنيزيوم في دمك.

في أحيان نادرة جداً قد يؤثر اللوسك على مستويات كريات الدم البيضاء، مما يؤدي لحدوث إصابة بجهاز المناعة. إذا كنت تعاني من مرض تلوّثي يتجلى بسخونة مع إنخفاض شديد بحالتك الصحية العامة أو سخونة مع أعراض تلوّث موضعي مثل آلام في العنق، في الحنجرة، أو في الفم، أو صعوبات في التبول، عليك إستشارة الطبيب بأسرع ما يمكن لنفي إصابة جهاز المناعة (agranulocytosis) من خلال فحوصات دم.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

(٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Expiry date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. يجب حفظ هذا الدواء في مكان جاف، دون ٢٥ درجة مئوية.

يجب الحفظ في العبوة الأصلية للحماية من الضوء.

يمكن إستعمال المستحضر ٣ أشهر بعد فتح القنينة للمرة الأولى.

يجب إغلاق الغطاء بإحكام بعد الإستعمال لمنع دخول الهواء والرطوبة.

(٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

لوسك ١٠ ملغ

محتوى الكبسولات

Mannitol, methacrylic acid copolymer, lactose anhydrous, hydroxypropylmethyl cellulose (hypromellose), hydroxypropylcellulose, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol, disodium hydrogen phosphate dihydrate, sodium lauryl sulfate, magnesium stearate.

تركيب الكبسولة

Gelatin, red iron oxide, titanium dioxide, food grade oil, sodium lauryl sulfate, magnesium stearate, silicone dioxide colloidal anhydrous.

تحتوي كل كبسولة على ٤ ملغ لكتوز و- ٠,١٢ ملغ صوديوم.

لوسك ٢٠ ملغ

محتوى الكبسولات

Mannitol, methacrylic acid copolymer, lactose anhydrous, hydroxypropylmethyl cellulose (hypromellose), hydroxypropylcellulose, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol, disodium hydrogen phosphate dihydrate, sodium lauryl sulfate, magnesium stearate.

تركيب الكبسولة

Gelatin, red iron oxide, titanium dioxide, water.

تحتوي كل كبسولة على ٨ ملغ لكتوز و- ٠,٢٥ ملغ صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتواه

كبسولات ذات جسم وردي غير شفاف وغطاء أحمر - بني. تحتوي الكبسولات على كريات بتغليف معوي بلون أبيض مائل قليلاً إلى البيج.

تحتوي عبوة لوسك ١٠ ملغ و لوسك ٢٠ ملغ على ٢٠ كبسولة. من الجائز ألا تسوق فعلياً كافة العيارات الدوائية.

صاحب الإمتياز: أبليك.م.ض.، ص.ب. ٨٠٧٧، كريات نوردو، نتانيا.

إسم المنتج وعنوانه: تيفغ للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.، ص.ب. ٣١٩٠، بيتح - تكفا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في

أيار ٢٠١٦

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

لوسك ١٠ ملغ: ٠١-٢٨٧٩٩-٢٢-١٢٨، ٠٠-٢٨٧٩٩-٢٢-١٢٨

لوسك ٢٠ ملغ: ٠٠-٢٦٢٥٦-٦٦-٥٥٠

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

322K112950516