



שינה בחילות או הקאות, כאב ראש, יובש בפה. **תופעות לוואי נוספות:**

גלוקומה (עלייה בלחץ תוך עיני), הפרעות ברזמת דם (כמו הרגשת קור בידיים וברגליים). **תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות**

בילדים ובתנוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה! ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו. אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליו להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ ליישג ידם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך למנוע הרעלה. לא תגרמן לתופעה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/בליסטר/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לשמור במקום חשוך וקורר, מתחת ל25°C.
- טיפוף: לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק, ניתן להשתמש בתרופה עד 6 חודשים.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התכשירים מכילים גם את החומרים הבלתי פעילים הבאים: **סינופד טבליות:** Calcium hydrogen phosphate, microcrystalline cellulose, povidone, carmelose sodium LS, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, titanium dioxide, HPMC 2910, PEG400, erythrosine aluminium lake, quinoline yellow aluminium lake

סינופד טיפוף: Sucrose, glycerol, strawberry flavor, saccharin sodium, methyl hydroxybenzoate sodium, citric acid anhydrous, propyl hydroxybenzoate sodium, purified water

כל 5 מ"ל מכילים 3 גרם סוכרוז ו- 2.5 מ"ג נתרן.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

סינופד טבליות: האריזה מכילה 10 טבליות גולדות מצופות בצפיף אדום. **סינופד טיפוף:** בקבוקו ובו 100 מ"ל טיפוף וכוסית מדידה.

• **היצרן:** תרימה, תוצרי רפואה ישראליים

• מערות בע"מ. מערות 4023000, ישראל.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות

• ב: ינואר 2014.

• מספרי יישום התרופה בפקס התרופות

• הממלכתית במשרד הבריאות:

• סינופד טבליות: 030.06.25464.00

• סינופד טיפוף: 118.91.29978.00

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה

• נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה

• מיועדת לשני המינים.

5 מ"ל כל 6 שעות. אין לעבור על מינון של 4 מנות (20 מ"ל) ביממה.

ילדים מגיל שנה עד גיל 6 שנים:

מינון יקבע על פי הנחיית רופא.

תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות מתחת

גיל שנה.

שים לב:

1. בתרופות נזוליות, עליו להשתמש בכוסית מדידה, מזרק או ספספת המיועדים למדידת הכמות הנכונה של התרופה. **כוסית המדידה המצורפת אינה מותאמת למדידת המינון לילדים מתחת לגיל שנתיים.** גם הטייע בהמלצת הרוקח לקבלת כלי מדידה מתאים. אין להשתמש בכפית ביתית לצורך מדידת כמות התרופה. הכפיות הביתיות שונות בגודלן ויתכן שלא תקבל את כמות התרופה הנכונה.

2. פפקוקי העמידים לפתיחה על ידי ילדים הורידו משמעותית את מספר מקרי ההרעלה הנגרמים על ידי תרופות בכל שנה. אולם, אם אתה מתקשה בפתיחת האריזה, באפשרותך לפנות לרוקח בבקשה להסיר את מנגנון הבטיחות של הפקק ולהפכו לפקק רגיל, קל לפתיחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

משך הטיפול: אם לא חל שיפור במצרך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מנת יתר או בטעות בלע דלי מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. הסימנים אותם ייתכן ותרגיש הם: אי שקט, דפיקות לב, עלייה בלחץ הדם, קושי בהטלת שתן, בחילה/הקאה, צמא מוגבר או פרקססים.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת; אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות בירוד!

אין ליטול תרופות בחושיך! דוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ רופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסינופד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד

לרופא אם מופיעות התופעות הבאות:

- קשיי נשימה, חום, נפיחות בפנים, בצוואר, בלשון או בגרון, פריחה מהירה, גירוד או כאב בקיבוץ (יתכן ומעיד על תגובה אלרגית קשה).
- הפרעות בצבצ הלב, דפיקות לב, יתר לחץ דם, חרדה, רעד, אצירת שתן (בגברים), פריחה.
- הזיות ופזוניה (נדיר), דוחח במיזת בילדים.

יש לפנות מיד לרופא אם מופיעות התופעות הבאות: רעבנות, אי שקט, נדודי

אין להשתמש בתרופה מבלי להיועץ רופא לפני התחלת הטיפול אם:

- הנך סובל מליקוי בתפקוד הכבד או מליקוי בתפקוד הכליות.
- הנך סובל מליקוי בתפקוד שלפוחית השתן.
- הנך עומד לעבור ניתוח, לאור תגובה אפשרית עם חומרי הרדמה.
- הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

אם אתה לוקה, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות לדיכוי תיאבון
- תרופות המעוררות את מערכת העצבים (כגון תרופות המשמשות לטיפול בברקולפסיה או תרופות המשמשות לטיפול בהפרעת קשב וריכוז (ADD)
- תרופות להורדת לחץ דם (כגון: חוסמי בטא)
- תרופות אנטיפסיכיות
- תרופות לטיפול בדיכאון (כגון: מעכבי מונואמינן אוקסיד MAOI)
- דיגוקסין, קונידין
- תרופות לטיפול בפרקינסון (סלגילי ורגליון)
- תרופות לטיפול במיגרנה (ארגוטן אלקלואידיים)

- סטרוי חומצה (קאלולין) ואלומיניום הידרוקסיד)
- פורוליון (תרופה אנטיביוטית)
- אפראקלונדין (תרופה לגלאוקומה)
- תרופות סימפטומטיות נוספות (כגון להפחתת גודש)
- אוסטופנין
- **ארוהן והקנה**

את הינך בהריון או מניקה אין להשתמש בתכשיר.

סינופד וחי היום-יום

לעיתים עלול סינופד לגרום לנדודי שינה. על מנת למנוע זאת יש לקחת את המנה האחרונה של אותו יום כמה שעות לפני השינה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של הטיפול

התכשיר מכיל 3 גרם סוכרוז ו- 2.5 מ"ג נתרן בכל 5 מ"ל טיפוף.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרוקח. עליו לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון המוקבל בדרך כלל הוא:

טבליות:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: טבליה אחת כל 6 שעות. אין לקחת יותר מ- 4 טבליות במשך 24 שעות. יש לבלוע את הטבליות עם מעט מים. מותר לחצות את הטבליות. אין מידע לגבי כתישה/ליעה.

ילדים מתחת לגיל 12 שנים:

מומלץ לתת את התרופה בצורת הטיפול.

סינופד:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים:

10 מ"ל כל 6 שעות. אין לעבור על מינון של 4 מנות (40 מ"ל) ביממה.

ילדים בגילאי 6-12 שנים:

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

סינופד

10 טבליות/סירוף

סינופד טבליות:

פסיודופדרין הידרוכלוריד 60 מ"ג Pseudoephedrine hydrochloride 60 mg.

סינופד טיפוף: 5 מ"ל מכילים: פסיודופדרין הידרוכלוריד 30 מ"ג

Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg. לחומרים בלתי פעילים בתכשיר - ראה טעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. יש להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליו לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים. לילדים מתחת לגיל 12 שנים מומלץ לתת את התרופה בצורת הטיפול. התרופה בצורת הטיפול אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שנה. בילדים מעל לגיל שנה עד גיל 6 שנים יש לפנות לרופא.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול סימפטומטי בגודש באף במקרי נזלת חריפה ולהקלה בגודש בתוצרת השמע בבלוקת האוזן. **קבוצה תרופית** אלפא-אגוניסט.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה טעיף 6).
- אין להשתמש בתינוקות מתחת לגיל שנה.
- הינך בהריון או מניקה.
- הנך מטופל בזמני תרופות מקבוצת מעכבי מונואמינן אוקסיד MAOI (לטיפול בדיכאון), או בתוך 14 יום מהפסקת הטיפול בהן.
- הנך סובל ממחלות לב כגון: מחלת לב אישכמית, מחלת כלי דם חסימית או יתר לחץ דם.
- הנך סובל מסוכרת.
- הנך סובל מליקוי חמור בתפקוד הכליות.
- הנך סובל מפארכימוציטומה (גידול נדיר בבלוטת האדרנל).
- הנך סובל מפעילות יתר של בלוטת התירוס.
- הנך סובל מגלאוקומה.
- הנך סובל מהגדלה של בלוטת הערמונית.
- הנך מקבל תרופות נוספות לטיפול בגודש כולל תרסטים לאף.

אחרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

בילדים מעל לגיל שנה עד גיל 6 שנים יש לפנות לרופא.



מעברות 4023000

תוצרי רפואה ישראליים

מעברות בע"מ

04710

