

פורמט עליון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

Gonabreed veterinary

גונבריד וטרינרי

התכשיר חייב במרשם רופא וטרינר

גונבריד וטרינרי מכיל גונדורלין (כאצטאט) שהינו דקפטיד סינתטי הזהה ל - GnRH, הורמון השחרור של גונדוטרופין המיוצר בהיפותרלמוס, הגורם לייצור ושחרור הורמונים גונדוטרופיים מההיפופיזה הקדמית. גונדורלין גורם לייצור ושחרור של ההורמונים LH ו-FSH מההיפופיזה ומסייע בכך לשיפור ביצועי הפוריות בבקר.

תכולה: כל 1 מ"ל מכיל 100 מק"ג גונדורלין (כאצטאט).

חומרים בלתי פעילים: Benzyl alcohol, Sodium chloride, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Water for injection, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide

פעילות רפואית: טיפול בשחלות משולחפות (cystic ovaries), מניעת ביוץ מאוחר, שיפור הפוריות לאחר המלטה וסינכרוניזציה בשילוב עם PGF2α.

מינון והוראות השימוש: גונבריד ניתן להגשה בהזרקה תוך שרירית בקדמת הצוואר, כלהלן:

פרות:	ההתוויה	מינון
שחלות משולחפות:	5 מ"ל (500 מק"ג גונדורלין)	
מניעת ביוץ מאוחר:	2.5 מ"ל (250 מק"ג גונדורלין)	
שיפור פוריות לאחר המלטה:	2.5 מ"ל (250 מק"ג גונדורלין)	
סינכרוניזציה (יום 0 ויום 9):	1.0 מ"ל (100 מק"ג גונדורלין)	

הוראות טיפול לשם סינכרון: יום 0 - 1 מ"ל גונבריד, יום 7 - 2 מ"ל אסטרופלאן (כלופרוסטנול), יום 9 - 1 מ"ל גונבריד, הזרעה 8-24 שעות לאחר מכן.

הזרעה מבוצעת בזמן קבוע 8-24 שעות לאחר המנה השנייה של גונבריד, ללא קשר אם הופיע ייחום או לא.

הפרוטוקולים לסנכרון מיועדים לפרות חולבות. תוצאות שונות דווחו בספרות במתן GnRH/ PGF2α לעגלות.

התוויות נגד ואזהרות: אין לטפל בחיה הידועה כרגישה לחומר הפעיל.

זמני המתנה: אין.

הערות:

יש לאחסן בקירור בטמפרטורה 8°C - 2°C ובמקום מוגן מאור. **הרחק מילדים.**

חיי מדף לאחר שימוש ראשון - 28 יום. יש להשמיד את היתרה והבקבוק בגמר השימוש.

יש לשמור את הבקבוק מפני זיהום תוך כדי שימוש.

אין להשתמש בתכשיר אם חל בו שינוי בצבע או בצלילות התמיסה.

חייב מרשם רופא וטרינרי.

אריזה: 20 מ"ל.

מספר רישום התרופה: 082-24-92288-00

יצרן: PARNELL MANUFACTURING PTY LTD, 4/476 GARDENERS RD., ALEXANDRIA NSW 2015, AUSTRALIA

בעל הרישום: אביק תוצרים וטרינריים בע"מ, ת"ד 489, בית שמש 99100

6026-1-01/03

070030

