

## لانقيس أقراص ٤٠ ملغ

المادة الفعالة وكميتها:

thioguanine (تيوچوانين) ٤٠ ملغ

قائمة المواد غير الفعالة مفصلة في الفقرة ٦

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء وذلك لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك. إحتفظ بالنشرة. من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب، الممرضة أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أكلك فقط. لا تعطيه للآخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن علامات مرضهم مشابهة لعلامات مرضك.

### (١) لأي غرض مخصص الدواء؟

لانقيس هو دواء لمعالجة مرض إبيضاض الدم الحاد غير اللمفاوي.

الفصيلة العلاجية: دواء سام للخلايا (يسمى أيضاً علاج كيماوي) من مجموعة قرائن البورين.

### (٢) قبل إستعمال الدواء

#### ❗ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الرجي) لـ تيوچوانين (المادة الفعالة) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة ٦).
- كنت في فترة الحمل أو مرضعة.

### تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

#### ❗ قبل العلاج بـ لانقيس، إستشر الطبيب إذا:

- كنت تستعمل الدواء لفترة مطولة. الإستعمال المطول قد يزيد من خطورة حدوث أعراض جانبية، مثل مشاكل في الكبد.
- كنت تعاني من إنخفاض نسبة الإنزيم تيوپورين ميثيل ترانسفيراز - thiopurine methyltransferase (TPMT).
- كنت تعاني من متلازمة ليش - نايهان (Lesch-Nyhan Syndrome) حالة وراثية نادرة تحدث نتيجة نقص (HPRT) (هيبوكسانتين - چوانين فوسفوريبوسيل ترانسفيراز).
- إذا كنت غير واثق فيما إذا إحدى الفقرات أعلاه تنطبق عليك، الرجاء إستشر الطبيب، الممرضة أو الصيدلي قبل تناول لانقيس.

❗ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أو هناك احتمال أن تتناول أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، إضافات غذائية، فيتامينات وإضافات نباتية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بـ لانقيس بالأخص إذا كنت تستعمل واحد من الأدوية التالية:

- أدوية معينة لعلاج إلتهاب القولون التقرحي (مثل أولسالازين أو ميسالازين).
- أدوية معينة لعلاج إلتهاب المفاصل الروماتيزمي أو إلتهاب القولون التقرحي (مثل سولفاسالازين).

- أدوية معينة التي قد يكون لها تأثير ضار على نخاع العظام، مثل علاج كيماوي آخر أو علاج بالأشعة. في هذه الحالة من الجائز أن يحتاج الأمر تخفيض المقدار الدوائي للدواء لانقيس.

### ❗ إستعمال الدواء والتعرض للشمس

عند إستعمال الدواء لانقيس، من الجائز أن يحدث فرط حساسية لضوء الشمس ونتيجة لذلك قد يحدث تغير بلون الجلد أو قد يظهر طفح. تجنب ما أمكن البقاء المطول في الشمس، إرتدي ألبسة طويلة وإستعمل كريم واقى من الشمس.

### ❗ إستعمال الدواء وتلقي اللقاحات

يجب إستشارة الطبيب أو الممرضة قبل تلقي لقاح. بعض اللقاحات (مثل شلل الأطفال، حصبه، نكاف والحميراء) قد تسبب لك العدوى بتلوث إذا أعطيت خلال فترة العلاج بـ لانقيس.

### ❗ الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت في فترة الحمل أو تخططين للحمل، عليك إستشارة الطبيب قبل إستعمال لانقيس.

إذا كان أحد الزوجين يستعمل الدواء لانقيس، فيجب الإمتناع عن الحمل خلال هذه الفترة. لانقيس قد يسبب الضرر للبيوضات أو للنطاف. يتوجب إستعمال وسائل مناسبة لمنع الحمل أثناء إستعمال هذه الأقراص من قبلك أو من قبل زوجك أو زوجتك.

لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج بـ لانقيس. يجب إستشارة الطبيب.

### ❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء لانقيس على اللكتوز.

يجب إستشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء إذا كنت تعرف بأنك تعاني من عدم تحمل لبعض السكريات.

### (٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب أن يُعطى هذا الدواء فقط من قبل طبيب مختص بمشاكل الدم.

يجب إستعمال الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب بالضبط. من المهم تناول الدواء في الوقت الصحيح. عليك الإستيصال من الطبيب، الممرضة أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

- يجب بلع القرص كاملاً مع كأس من الماء.
- إذا كنت ترغب بشرط القرص إلى نصفين، فلا يجوز إستنشاق المسحوق الناتج عن شطر القرص.

يجب غسل اليدين جيداً بعد ذلك. خط الشطر مخصص للسماح بكسر القرص وتسهيل بلعه وليس من أجل تقسيمه لمقدارين دوائيين متساويين. لا توجد معلومات بالنسبة لسحق القرص.

- خلال فترة العلاج بـ لانقيس، يوصيك الطبيب بإجراء فحوص الدم، وذلك لفحص عدد ونوع الخلايا بدمك وذلك للتأكد من سلامة وظائف كبدك؛ من الجائز أن يغير الطبيب تعليمات المقدار الدوائي بما يتناسب المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل طبيبك فقط.

يقوم الطبيب بحساب المقدار الدوائي الملائم لك بحسب المساحة السطحية لجسمك، نتائج فحوص دمك والمرض الذي تعاني منه.

دواء سام للخلايا - المقدار الدوائي يُحدّد من قبل الطبيب فقط!

المقدار الدوائي اليومي الموصى به يتراوح بين ١٠٠ لـ ٢٠٠ ملغ / متر مربع من مساحة سطح الجسم لليوم. في حال كنت تعاني من مشكلة في الكلى أو في الكبد، فمن الجائز أن يُعطى لك مقدار دوائي أدنى من لانقيس.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

## التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة بيريجو بواسطة العنوان التالي:

www.perrigo-pharma.co.il

## ٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
  - لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
  - يجب التخزين بدرجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية.
  - يجب التخزين في مكان مظلم وجاف.
  - يجب الحماية من الضوء.
  - بعد فتح القنينة لأول مرة، يجب استعمال الدواء خلال ٢٥ يوماً.
- إذا قرر الطبيب إيقاف العلاج، قم بإعادة الأقراص التي بقيت لديك إلى الصيدلية. قم بإبقاء الأقراص بحوزتك فقط إذا أوصاك الطبيب بفعل ذلك.

## ٦) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً: Lactose, potato starch, acacia, stearic acid, magnesium stearate.
- كمية اللكتوز في القرص هي ١٥٠ ملغ.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: قنينة زجاجية مغلقة بغطاء لولبة من البلاستيك مقاوم للفتح من قبل الأطفال.
- تحتوي القنينة على ٢٥ قرصاً. الأقراص هي ذات لون أبيض حتى أبيض تقريباً، مستديرة ومحدبة الجانبين، ذات خط للشطر ومطبوع عليها "T40" من جانب واحد.
- صاحب الإمتياز: وكالات بيريجو إسرائيل م.ض.، شارع ليحي ٢٩، بني - براق ٥١٢٠٠
- المنتج: إكسيلا GmbH، فوخت، ألمانيا.
- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في كانون الأول ٢٠١٦
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٠٥-٢٣-٢٠٩٣٦-٠٥٨
- من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلال الجنسين.

إذا إستعملت بالخطأ مقدار دوائي أكبر (جرعة مفرطة) أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبلة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، يجب إستشارة الطبيب. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

## ٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال لانفيس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائر ألا تعاني أياً منها.

يجب التوجه في الحال إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ إذا ظهرت إحدى الأعراض الجانبية التالية:

- سخونة أو علامات أخرى لتلوث مثل: ألم في الحنجرة، ألم في جوف الفم أو مشاكل في المسالك البولية.
- كدمة أو نزف غير متوقعين.
- شعور مفاجئ بوعكة (حتى ولو كانت الحرارة طبيعية).
- إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين (يرقان).

يجب إستشارة الطبيب إذا ظهرت إحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):

- تناقص تعداد خلايا الدم والصفائح الدموية.
- يرقان (إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين) وإصابة خطيرة في الكبد (الأعراض تشمل إرهاق وغثيان يترافقان بحكة، لون بول داكن وقد تشمل طفح أو سخونة) عند الإستعمال المطول أو في المقادير الدوائية العالية من لانفيس؛ هذه قد تتمثل في نتائج فحوص الدم.

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين عشرة):

- ضرر في الكبد الذي قد يسبب يرقان (إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين) أو تضخم الكبد (انتفاخ من تحت أضلاع القفص الصدري) - عند إستعمال لانفيس لفترة قصيرة؛ هذه قد تتمثل في نتائج فحوص الدم.

- الشعور بغثيان أو تقيؤ، إسهال، تقرحات في الفم.
- إرتفاع نسبة حمض البول في الدم (hyperuricemia)، الذي قد يؤدي إلى خلل في الأداء الوظيفي للكلى في بعض الحالات.

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين ١٠٠٠):

- التهاب الأمعاء الناخر، الذي قد يسبب ألم شديد في البطن، غثيان، إسهال، تقيؤات وسخونة.
- ضرر خطير للكبد عند الإستعمال مع أدوية أخرى سامة للخلايا (علاج كيميائي)، أقراص منع الحمل والكحول.

أعراض جانبية التي شيعها غير معروف:

- حساسية للضوء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.