

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

לאנויס טבליות 40 מ"ג

החומר הפעיל וכמותו:

thioguanine (תיאוגואנין) 40 מ"ג
רשימת חומרים בלתי פעילים מפורטת
בסעיף 6.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם
תשתמש בתרופה מכיוון שהוא מכיל
מידע חשוב עבורך.** תרופה זו עלול. ייתכן
שמצטרף לעיון בו שוב. עלון זה מכיל מידע
תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות
נוספות, פנה אל הרופא, האחוז או אל
הרוקח.
התרופה זו נרשמה עבורך בלבד. אל תעביר
אוהה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו
אם נראה לך כי סימני מחלתם דומים.

1. למה מיועדת התרופה?

לאנויס היא תרופה לטיפול בלוקמיה חריפה
(אקוטית) לא לימפוציטית.

קבוצה תרופית: תרופה ציטוטוקסית
(מכונה גם כימותרפית) ממשפחת אלולגים
לפרוין.

2. לפני שימוש בתרופה

⊗ אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לתיאוגואנין (החומר
הפעיל) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים
אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- הינך בהריון או מניקה.

⊗ אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בתרופה

⊗ לפני שימוש בלאנויס, היוועץ ברופא אם:

- אתה משתמש בתרופה זמן ממושך,
שימוש לאורך זמן עלול להגדיל את הסיכון
לתופעות לוואי, כמו בעיות כבד.
- אתה סובל מרמה נמוכה של האנזים
thiopurine methyltransferase (TPMT),
אתה סובל מ-Lesch-Nyhan Syndrome -
מצב תורשתי נדיר הנגרם כתוצאה מחסר ב-
HPRP (hypoxanthine-guanine-
transferase).
phosphoribosyltransferase.
- אם אינך בטוח אם אתה מסתמכים לעיל חל
עליך, אנא התייעץ עם רופא, אחוז או רוקח
לפני תלית בלאנויס.

**⊗ אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה
או שישנו סיכוי שתתקח תרופות אחרות,
כולל תרופות ללא מרשם, תוספי תזונה,
ויטמינים ותוספים צמחיית, ספר על כך
לרופא או לרוקח. במיוחד, יש ליידיע את
הרופא או הרוקח לפני תחילת הטיפול
בלאנויס, אם אתה לוקח אחת מהתרופות
הבאות:**

• תרופות מסוימות לטיפול בדיקת כביט של
המעי הגס (כגון אולסלון או מלזון).
• תרופות מסוימות לטיפול בדיקת פרקים
שגרית או בדיקת כביט של המעי הגס
(כגון סולפאסאלאזין).

• תרופות מסוימות שמעולה להיות להן
השפעה מזיקה על מוח העצם, כגון
כימותרפיה אחרת או רדיותרפיה. במקרה
זה ייתכן שיהיה צורך בהפחתת מינון
התרופה שניה.

⊗ שימוש בתרופה וחשיפה לשמש

בעת השימוש בתרופה לאנויס, תינתן רגשות
יותר לחשיפה לשמש ובתוצאה מרוב עלול להיות
שינוי בצבע העור או עלולה להופיע פריחה.
הימנע ככל הניתן משהיה ממושכת בשמש,
בלש בגדים ארוכים והשתמש בקרם הגנה.

⊗ שימוש בתרופה וקבלת חיסונים

יש היוועץ ברופא או באחות לפני קבלת
חיסון. חיסונים מסוימים (כמו פוליו, חצבת,
חזרת ואדמת) עלולים להזיק אותך ביוזום
אם הם ניתנים במהלך הטיפול בלאנויס.

⊗ הריון, הנקה ופוריות

אם הריון, בהריון או מתכננת להיכנס להריון,
עליך ברופא לפני השימוש בלאנויס.
אם אתה מניחה הוג נולד את התרופה לאנויס,
בתקופה זו יש להימנע מהריון. לאנויס עלולה
לפגוע בביציות או ברע, חובה להשתמש
באמצעי מניעה נאותים על מנת למנוע הריון
בעת שימוש טבליות אלה על ידיך או על
ידי בן או בת הזוג.

אין להניק במהלך הטיפול בלאנויס. יש
להתייעץ עם הרופא.

⊗ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה לאנויס מכילה לקטוז.
יש להתייעץ עם הרופא לפני נטלת התרופה
אם ידוע לך כי אתה סובל מאי סבילות
לסוכרים מסוימים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תרופה זו חייבת להינתן רק על ידי רופא
מומחה בבעיות דם.

תמיד יש להשתמש בתרופה בדיוק לפי
הוראות הרופא. חשוב לטויל את התרופה
בזמן הנכון.
עליך לבדוק עם הרופא, האחוז או הרוקח
אין לך סתוח.

- יש לבלוע את הטבליה שלשומה עם כוס
מים.
- במידה וברצונך לחצות את הטבליה לשניים,
אין לשאוף את האבק מהטבליה, יש לרוץ
ידיים היטב לאחר מכן. לך החצייה נועד
כדי לאפשר את שברית הטבליה ולהקל
על בליעתה ולא כדי לחלק לשתי מנות
שוות. אין מידע לגבי כתישת הטבליה.
- בזמן הטיפול בלאנויס, הרופא יורה לך לבצע
בדיקות דם, זאת כדי לבדוק את מספר סוג
התאים בדמך על מנת לוודא שתפקודיך
הקבד שלך תקינים; ייתכן שרופא ישנה
את הוראות המינון בהתאם.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא
שלך בלבד.

הרופא יחשב את המינון המתאים לך לפי
שטח הפנים של גופך, תוצאות בדיקות הדם
שלך והמחלה ממנה אתה סובל.
תרופה ציטוטוקסית - המינון ייקבע על ידי
הרופא בלבד!

המינון היומי המומלץ הינו בין 100
ל- 200 מ"ג/מ"מ² שטח פני הגוף שלך, במידה
והינך סובל מבעיה בבליות או בכבד, ייתכן
ותקבל מינון נמוך יותר של לאנויס.

אין לעבור על המנה המומלצת.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
(יתר) או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,
פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים
והבא אריות התרופה איתך.**

**אם שכחת לטויל את התרופה בזמן
הדרוש, יש להוועץ ברופא. אין לטויל מנה
כפולה כדי לפצות על מנה ששכחה.**

יש להתמיד בטיפול כפי שזומלך על ידי
הרופא.

גם אם חל שינוי במצב בריאותך, אין
להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות
עם הרופא.

אין לטויל תרופות בחושך! בדוק את התוויות
והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב
מסוימים אין הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות הוועץ לשימוש
בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

לכרו בכל תרופה, השימוש בלאנויס עלול
לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.
אל תיבהל למקרה רשימת תופעות הלוואי.
ייתכן ואלו תסבול מאף אחת מהן.

**יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון אם
מופעה אחת מתופעות הלוואי הבאות:**

- חום או סימנים אחרים של זיהום כמו:
כאב גרון, כאב בחלל הפה או בעיות בדרכי
השתן.
- צהבה או דימום **בלתי צפויים**.
- הרגשה פתאומית של חולי (אפילו אם
החום תקין).
- הצהבה של העור או הלבן בעיניים
(צהבת).

יש להוועץ ברופא אם מופיעה אחת
מתופעות הלוואי הבאות:

- **תופעות לוואי שכיחות מאד (מופיעות
ביותר משתמש אחד מעשרה):**
- ירידה בספירת תאי הדם וטסיות הדם.
- צהבת (צהבה של העור או הלבן בעיניים)
ופגיעה תמורה בכבד (הסימפטומים כוללים
פגיעה ובחילה המלווים בגרד, צבע שנת
כהה ועלולים לכלול פריחה או חום) בעת
שימוש ממושך או במינונים גבוהים של
לאנויס; אלה עלולים להתבטא בתוצאות
בדיקות הדם.

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות בכחות משמשתמש אחד מעשרה):

- נזק בכבד שעלול לגרום לחצבת (צהבה)
של העור או הלבן בעיניים) או לכבד מוגדל
(נפיחות מתחת לצלעות בית החזה) -
בשימוש קצר טווח של לאנויס; אלה עלולים
להתבטא בתוצאות בדיקות הדם.
- הרגשת בחילה או הקאה, שלשול, כיבים
בפה.

• רמה גבוהה של חומצת שתן בדם
(הפרפאוריצימיה), אשר עלולה להוביל
מבצבים מסוימים לתפקוד כלייתי לקוי.

תופעות לוואי נדירות (מופיעות בכחות משמשתמש אחד מתוך 1,000):

• דלקת מעי נבקית, העלולה לגרום לכאב
בטן חמור, בחילות, שלשול, הקאות
וחום.

• נזק חמור לכבד בעת שימוש עם תרופות
ציטוטוקסיות (כימותרפיות) נוספות, גלולות
למניעת הריון ואלכוהול.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה: • רגישות לאור.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות
הלוואי המזוהות, או כאשר אתה סובל
מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך
להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות
באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על
תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא
בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון
לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י ניכסה
לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח לחברת פריגו באמצעות
הכתובת הבאה:

www.perrigo-pharma.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- שמר העלמה לתרופה זו וכל תרופה אחרת
באמצעות במקום סגור מחוץ להישג ידם
ומשדה ראייתם של ילדים ו/או טינוקות ועל
ידי כך תמנע הערלה. אל תגרומ להקאה
ללא תרופה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך
התפוגה (exp. date) המופיע על גבי
האריוזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום
האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C.
- יש לאחסן במקום חשוך ויבש.
- יש להגן מפני אור.
- לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק, יש
להשתמש בתרופה תוך 25 יום.
- אם הרופא מחליט להפסיק את הטיפול,
החזר את הטבליות שנשארו לך אל הרופא
המרחקת. השאר את הטבליות אצלך רק
במידה שרופא הורה לך לעשות זאת.

6. מידע נוסף

• נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה
גם:

starch, acacia, Lactose, potato
acid, magnesium stearate.

כמות הקלטוז בטבליה היא 150 מ"ג.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריוזה:
בקבוק זכוכית הסגור בפקק הברגה
מפלסטיק תמידי לפתיחה על ידי ילדים.
הבקבוק מכיל 25 טבליות. הטבליות הן
בצבע לבן עד כמעט לבן, מעוגלות וקמורות
בשני צידיהן, בעלות קו חצייה והטבעה של
T40' בצד אחד.

• בעל הרישום: פריגו ישראל סוכנויות בע"מ,
רח' לח"י 29, בני ברק 51200.

• יצרן: קאסלה GmbH, פאונט, גרמניה.
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות
בדצמבר 2016.

• מספר רישומי התרופה בפקנס התרופות
הממלכתי במשרד הבריאות:
058-20936-23-058.

לשם הפסטות ולהקלת הקריאה, עלון זה
נוסח בלשון זכר. עם זאת, התרופה מיועדת
לשני המינים.