

يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب.

كروموبتيك، قطرات للعين

المادة الفعالة وتركيزها:

Sodium cromoglycate 2.0 % w/v

لائحة المواد غير الفعالة: انظر الفقرة 6 - معلومات اضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك الدواء. تحوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسلطة أخرى، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي. عليك استعمال الدواء بالطريقة الصحيحة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت أو لم تتحسن أعراض المرض (الأعراض) بعد يومين. حافظ على النشرة الطبية. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

1. لماذا هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصص للوقاية من جميع أنواع الالتهابات التحسسية الملتزمة.

المجموعة العلاجية: تتنمي المادة الفعالة إلى مجموعة مضادات الحساسية.

2. قبل استعمال الدواء:

يُمنع استعمال الدواء وابلغ الطبيب او الصيدلي اذا:
• لديك حساسية للمادة الفعالة في الدواء (كروموجلوكات الصوديوم) أو لأحد مركبات الدواء الأخرى (انظر فقرة 6). تشمل أعراض الحساسية: الطفح الجلدي، صعوبة في البلع أو التنفس، تورم في الشفتين، الوجه، الحلق، اللسان، وتفاقم الاحمرار، الحكة أو تورم في العين أو الجفن.

تحذيرات خاصة تخص استعمال الدواء:
قبل بدء العلاج يجب أن تكون على يقين من أن التهيج في عينيك هو نتيجة للحساسية. إذا كنت غير متأكد، يجب عليك استشارة الطبيب قبل بدء العلاج.
إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومضادات الغذاء، أخبر بذلك الطبيب أو الصيدلي.
خاصة إذا كنت تتناول: مستحضرات أخرى للاستعمال في العين.

الحمل والرضاعة:

يُمنع استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بداية العلاج إذا كنت

حاملاً، قد تكونين حاملاً أو اذا ظلتت ائك حاملاً، او اذا كنت مرضعة او تخططيين للرضاعة.

السواءة واستعمال الماكولات:

قد يحدث تشوش في الرؤية فوراً بعد استعمال الدواء. في هذه الحالة تمنع السياقة أو استخدام الآلات الخطرة حتى تكون الرؤية واضحة.

معلومات مهمة على بعض مركبات الدواء:

يحتوي كروموبتيك ثيومرسال (Thiomersal). قد تؤدي هذه المادة لحساسية في العين.

3. كيف تستعمل الدواء؟

اذا لم تكن متاكداً من كيفية استعمال الدواء، فيجب عليك استشارة الطبيب او الصيدلي.

الجرعة الموصى عادة: 2-1 نقاط في كل عين، 4 مرات في اليوم بفارق زمني منتظم او حسب تعليمات الطبيب.
يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

ليس للبلع، هذا الدواء للاستعمال الخارجي فقط.
طريقة استعمال المستحضر - تعليمات عامة:

أ. لتفادي الثلوث، لا تسمح بلمس طرف القنبلة باي جسم (بما في ذلك العين ذاتها). يجب الحفاظ على القنبلة مغلقة جيداً.

ب. قد تكون قنبلة النقاط غير ممتلئة، وخصوص ذلك من أجل تمكن تحكم أفضل بنظام التقطيق.

ج. كيف تستعمل النقاط:
1. اغسل يديك جيداً.

2. استخدم مرآة لتساعدك بروية ما تصنع.

3. جفف عينيك بجذر بمساعدة منديل وازل غطاء القنبلة
4. بمساعدة الأصبع ابعد قليلاً الجفن الاسفل من العين. لداخل الجفون

المترکنة نقط 2-1 نقاط بجذر. تأكّد من ان لا تلامس القنبلة العين.
5. اترك الجفن الاسفل وارمش عدد مرات كي يتم انتشار كامل للسائل في العين.

6. تأكّد من إغلاق غطاء القنبلة فوراً بعد الاستعمال.
7. يجب العودة على الخطوات 4 و-5 ذلك في العين الاخرى، حسب الحاجة.

فترقة العلاج:

إذا تفاقم وضع العينين او لا يتحسن بعد 2 يومين من استعمال نقط العينين،
يرجى التوجه الى الطبيب او الصيدلي.

يُمنع استعمال كروموبيتك أكثر من 3 أشهر متتالية بدون استشارة الطبيب،
إذا تم استعمال الدواء بتوصية من الطبيب، فعليك إكمال العلاج كما
أوصى به.

يُمنع استعمال المستحضر أكثر من شهر بعد فتح القنينة.
إذا استخدمت كروموبيتك أكثر من اللازم:

توجه إلى الطبيب إذا استخدمت نقاط العينين بنسبة أعلى من اللازم أو
بفترة زمنية أكبر من ثلاثة أشهر.

إذا أبلغ ولد بالخطأ عن الدواء، توجه فوراً للطبيب أو للطوارئ في المستشفى
وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، فاستعمل النقاط فوراً عند
تذكرك، بالرغم من ذلك، إذا كان الوقت الذي تذكرت به قريب من وقت
الجرعة المقبلة، فتجاوز عن الجرعة المنسية، يُمنع تناول جرعة مزدوجة
كتحفيض عن الجرعة المناسبة.

إذا قمت بالتوقف عن تناول الدواء:
حتى إذا كان هناك تحسن في أعراض المرض، فيجب الاستمرار باستعمال
هذه النقاط إذا كنت لا تزال في منطقة مسببات الحساسية. قد يمنع
كروموبيتك الحساسية، بحيث إذا قمت بالتوقف عن العلاج، فإن هذه
الأعراض قد تعود.

يُمنع تناول أي دواء في الليل! افحص أي طابع الدواء والجرعة في كل مرة
تناول/ين الدواء، استعمل/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر.
إذا كانت لديك أسلطة اضافية بما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب
او الصيدلي.

4. اعراض جانبية:

كما الحال في كل دواء، استخدام كروموبيتك قد يؤدي لاعراض جانبية
لدى بعض المستخدمين. لا داعي للذعر من قائمة الاعراض الجانبية، قد
لا تعاني من اي عرض منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن
إذا: تفاقمت الحكة، الاحمرار أو الانتفاخ، قد تكون حساساً لهذا الدواء.
 يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا تفاقمت او استمرت هذه
الاعراض الجانبية لأكثر من عدة أيام، أو إذا لاحظت اعراض جانبية
غير مذكورة في هذه النشرة:

• حكة وحرقة في العيون أو تشوش الرؤية. هذه الاعراض تستمر لفترة
قصيرة وتذهب فوراً بعد استعمال النقاط.
• تهيج طفيف في العين.

- يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية بواسطة الضغط على الرابط:
“إبلاغ عن أعراض جانبية بسبب علاج دوائي” الموجود في الصفحة
الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يصلك
باستمرار للتبليغ عن أعراض جانبية، أو من خلال الدخول للرابط التالي:
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. كيف تخزن الدواء؟

- امنع/ي التسمم؛ يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق
بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/or الرضع وهكذا تمنع التسمم.
لا تتسبب بالتأثير بدون تعليمات واضحة من الطبيب.
يُمنع استعمال الدواء بعد انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على
علبة العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يظهر اليوم الاخير لنفس الشهر.
يجب حفظ الدواء في درجة حرارة تحت 25°C.
يجب حفظ الدواء في العبوة الاصلية لحفظة من الضوء.
يُمنع استعمال المستحضر أكثر من شهر بعد فتح القنينة للمرة الاولى.
يُمنع حفظ ادوية مختلفة في نفس العبوة.

6. معلومات اخرى:

- بالاضافة الى المواد الفعالة يحتوي هذا الدواء كذلك على:
Sodium chloride, thiomersal, sodium hydroxide, disodium edetate,
purified water.

كيف يبدو الدواء وماذا يوجد بداخل العبوة:
 محلول نقى بدون لون حتى الاصفرار بقنية مع قطراء.

المنتاج: فيتاميد صناعة الأدوية مرض.
ص. ب. 114، بنيامينا 3055002، اسرائيل.

فحصت هذه النشرة وصادقت بواسطة وزارة الصحة في تاريخ 11.2016
هذه النشرة لا تحوي كل المعلومات عن المستحضر. إذا كانت لديك أي
اسئلة أو إذا لم تكن متأكداً من شيء ما، فيرجي التوجه للطبيب.
رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في وزارة الصحة: 1003528587

من أجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتبت هذه النشرة بصيغة المذكرة. بالرغم
من ذلك، هذا الدواء مخصص للجنسين.