

سيبوسيل مستعلق

المادة الفعالة وتركيزها:
كل ١ ملل يحتوي:

Selenium sulfide 25 mg

(سيلينيوم سولفيد ٢٥ ملغ)

لقائمة المواد الغير فعالة، الرجاء انظر البند ٦.

اقرأ الشئرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه الشئرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

يجب عليك استعماله بصورة صحيحة. قم باستشارة الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

إذا لم يحدث تحسن في حالتك أو إذا تقاومت حالتك بعد / خلال العلاج الموصى به، هذا الدواء غير مخصص للأطفال والأولاد.

يُمنع البلع! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.

١. لم أعد هذا الدواء؟

لعلاج شئرة الرأس، التهاب الجلد المئتي والسعفة المبرسقة (Tinea Versicolor). المجموعة العلاجية: مضاد للفطريات.

٢. قبل استعمال الدواء:

X يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية للمادة الفعالة (سيلينيوم سولفيد) أو لأحد مركبات الدواء الأخرى (انظر البند ٦).
- كانت هناك جروح مفتوحة أو التهابات حادة في مكان العلاج.

⚠ تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء:

استعمال هذا الدواء قد يُسبب إلى تهيج في الجلد، خاصة في منطقة الأعضاء التناسلية وطيّات الجلد – اغسل جيداً هذه المناطق بعد الاستعمال.

امتنع عن ملامسة الدواء للعينين. إذا دخل الدواء عن طريق الخطأ إلى العينين – اغسل العينين فوراً مع الكثير من الماء البارد.

احرص على غسل اليدين وتحت الأظافر بعد الاستعمال.

لا تترك الدواء ملامساً للشعر أو الجلد لفترة أطول من الفترة الموصى بها. هذا الأمر ممكن أن يُسبب إلى تهيج، لثعور بالحرقه أو لظهور حويصلات. كذلك، لا تستعمل في أحيان متقاربة أكثر من الموصى به.

عليك قبل الاستعمال نزع المجوهرات المصنوعة من الذهب، الفضة ومن معادن أخرى لأن هذا الدواء ممكن أن يُسبب إلى تغيير في لونها.

اغسل جيداً الدواء عن الشعر قبل صبغ الشعر، وضع ألوان، تمويج الشعر أو تلميع

كيميائي. يُمنع استعمال هذا الدواء يومين قبل أو بعد أحد علاجات الشعر هذه.

• انزع دبابيس الشعر قبل الاستعمال وتجنب ملامسة المادة مع سطوح معدنية.

⚠ الحمل والإرضاع:

يُمنع استعمال الدواء إذا كنت حاملاً، تظنين أنك حامل أو مرضعة. يجب أن تستشير طبيبك أو صيدلي قبل استعمال الأدوية إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك الحصى مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

الجرعة وطريقة العلاج المُتبعة، عادة، هي:

لعلاج السعفة المبرسقة (Tinea Versicolor):

١. ادهن على المنطقة المصابة، وارغبها مع القليل من الماء.

٢. اترك الدواء على الجلد تقريباً ١٠ دقائق.

٣. اغسل جيداً.

٤. كرر العملية مرّة في اليوم لمدة أسبوع.

لعلاج شئرة الرأس و التهاب الجلد المئتي:

١. أفرق كمية صغيرة (٥ - ١٠ ملل) من المستعلق على فروة الرأس الرطبة.

٢. اتركه على فروة الرأس لمدة ٢ حتى ٣ دقائق.

٣. اغسل فروة الرأس جيداً.

٤. كرر العملية وأغسل جيداً.

٥. بعد العلاج اغسل يديك جيداً.

٦. تم بتنفيد هذا العلاج مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين ومن ثم مرة كل أسبوع - أسبوعين أو مرة كل بضعة أسابيع. في كل حالة يُمنع استعمال المادة أكثر من مرتين في الأسبوع.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال وللأطفال.

إذا لم يحدث تحسن في حالتك أو إذا تقاومت حالتك بعد / خلال العلاج الموصى به، يجب التوجه للطبيب.

يُمنع البلع! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.

يجب حصى التفتية قبل الاستعمال.

يُمنع التلامس مع العينين و/ أو أنسجة مخاطية.

إذا ابتلعت كمية من الدواء عن طريق الخطأ، أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً، إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك. ابتلاع سيبوسيل ممكن أن يُسبب إلى غثيان أو إلى تقيؤ.

يُمنع تناول الدواء في الظلام! تحقّق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كلّ مرّة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال سيبوسيل أعراضاً جانبية لدى قسم من متناولي الدواء. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل أن تعاني من أي منها.

• طفح جلدي أو شرى.

• تهيج أو حساسية في الجلد أو في فروة الرأس، يتم وصفها أحياناً كشعور بالحرقه.

• تزايد تساقط الشعر.

• تغيير في لون الشعر الذي يمكن تجنبه من خلال غسل الشعر بصورة جيدة بعد العلاج.

• زيادة دهنية أو جفاف الشعر أو فروة الرأس.

• في أحيان نادرة ممكن ظهور حويصلات، خاصة إذا كان الدواء يتلامس مع الشعر أو مع الجلد لفترة أطول بكثير من الفترة الموصى بها.

إذا تقام أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في الشئرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج بالأدوية"، الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّل إلى إستمارة خاصة معدة للتبليغ عن الأعراض الجانبية.

٥. كيف يحزن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير في الشهر ذاته.

• يجب الحفظ تحت 25°C .

• مدة الصلاحية بعد فتح المستحضر: ١٢ شهراً.

• يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات. اسأل الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. إنّ ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

٦. معلومات إضافية:

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً:

Sodium lauryl ether sulfate, aluminum magnesium silicate, sodium dihydrogen phosphate dehydrate, Cocamide DEA, sodium chloride, citric acid anhydrous, fragrance (I.F.F. #9138) herbal, titanium dioxide, methyl paraben, captan, propyl paraben, purified water

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

مستعلق بلون برتقالي مرزوم في قناني HDPE من ١٠٠ غرام

المنتج وصاحب التسجيل:

تارو للصناعة الدوائية مرض، شارع هكيتور ١٤، خليج حيفا ٢٦٢٤٧٦١

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

٠١٦٧٩.٢١١٠٠

تمّ فحص هذه الشئرة والتصدق عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: تشرين الثاني ٢٠١٦.

لتبسيط قراءة هذه الشئرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.