

סבוסל טרחיף

החומר הפעיל וריכוזו:

11 מ"ל מ"ל מ"ל:

Selenium sulfide 25 mg

(סלניום סולפיד 25 מ"ג)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה בצורה הנכונה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. אם לא חל שיפור במצבך או מצבך הוחמר לאחר/במשך הטיפול המומלץ יש לפנות לרופא.

תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות ולילדים.

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

1. למה מיועדת התרופה?

טיפול בקשקשים, חלביות הקרקפת ופטריית שמש (Tinea Versicolor).

קבוצה תרפויטית: אנטי פטריית.

2. לפני שימוש בתרופה:

X אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (סלניום סולפיד) או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים (ראה סעיף 6).
- קיימים פצעים פתוחים או דלקות חמורות במקום הטיפול.

⚠ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- שימוש בתרופה זו עלול לגרום לגירוי בעור, בעיקר באזור אברי המין וקפלי העור - שטוף היטב איזורים אלו לאחר השימוש.
- הימנע ממגע של התרופה עם העיניים. אם בטעות נכנסה התרופה לעיניים - שטוף מיד עם הרבה מים קרים.
- הקפד על רחיצת הידיים ומתחת לצפורניים לאחר השימוש.
- אל תשאיר את התרופה במגע עם השיער או עם העור לזמן ממושך יותר מהזמן המומלץ. הדבר עלול לגרום לגירוי, לתחושת שריפה או להופעת שלפוחיות. כמו כן, אל תשתמש לעיתים קרובות יותר מהמומלץ.
- הסר לפני השימוש תכשירים מזהב, מכסף וממתכות אחרות מכיוון שהתרופה עלולה לגרום לשינוי צבעם.
- הסר היטב את התרופה מהשיער לפני צביעה, עשיית גווני, לסלול או החלקה כימית. אין להשתמש בתרופה יומיים לפני או אחרי אחד מטיפולי שיער אלה.

- הסר סיכות שיער לפני השימוש והימנע ממגע החומר עם משטחים מתכתיים.

⚠ היריון והנקה:

אין להשתמש בתרופה אם את בהיריון, חושבת שאת בהיריון או מיניקה. יש להתייעץ עם רופא או רוקח לפני השימוש בתרופות כאשר הינך בהיריון או מיניקה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן השימוש המוקבל בדרך כלל הוא:

טיפול בפטריית השמש (Tinea Versicolor):

- מרח על האיזור הנגוע, והקצף עם מעט מים.
- השאר את התרופה על העור כ- 10 דקות.
- שטוף היטב.

4. חזור על התהליך פעם ביום במשך שבוע.

טיפול בקשקשים וחלביות הקרקפת:

- עסה כמות קטנה (5-10 מ"ל) של התרחיף על הקרקפת הרטובה.
- השאר על הקרקפת למשך 2 עד 3 דקות.
- שטוף את הקרקפת היטב.

4. חזור על התהליך ושטוף היטב.

5. לאחר הטיפול שטוף את ידך היטב.

- בצע את הטיפול הנ"ל פעמיים בשבוע למשך שבועיים ולאחר מכן פעם בשבוע בשבועיים או אחת לספר שבועות. בכל מקרה אין להשתמש בחומר יותר מפעמיים בשבוע.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולתינוקות.

אם אל חל שיפור במצבך או מצבך הוחמר לאחר/במשך הטיפול המומלץ יש לפנות לרופא.

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

נער את הבקבוק לפני השימוש.

יש להימנע ממגע עם עיניים ו/או רקמות ריריות.

אם בטעות בלעת מן התרופה או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך. בליעת סבוסל עלולה לגרום לבחילה או להקאה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תזונת והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בסבוסל עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

- פריחה בעור או סרפדת.

- גירוי או רגישות בעור או בקרקפת, מתוארים לעתים כתחושת שריפה.
- הגברת תשוקת שיער.
- שינוי בגוון השיער הניתן למניעה על ידי שטיפה יסודית של השיער לאחר הטיפול.
- שמוניות או יובש של השיער או הקרקפת.
- לעתים נדירות עלולות להופיע שלפוחיות, במיוחד אם התרופה נמצאת במגע עם השיער או עם העור לזמן ממושך יותר מהזמן המומלץ.
- אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הזכרנו בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- חיי מדיף לאחר פתיחת התכשיר: 12 חודשים.
- אין להשתמש בתרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Sodium lauryl ether sulfate, aluminum magnesium silicate, sodium dihydrogen phosphate dehydrate, Cocamide DEA, sodium chloride, citric acid anhydrous, fragrance (I.F.F. #9138) herbal, titanium dioxide, methyl paraben, captan, propyl paraben, purified water

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תרחיף בצבע תנוס ארזז בבקבוקי HDPE של 100 גרם

היצרן ובעל הרישום:

תרז תעשייה רוקחית בע"מ, רח' הקיסור 14, מפרץ חיפה 2624761

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

01679.21210

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בנובמבר 2016.

לשם הפטנט והלקלת הקריאה, עליון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.