

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו, אוגוסט 2013

לשימוש וטרינרי בלבד

חייב מרשם רופא וטרינרי

**לוקסיקום 5 mg/ml וטרינרי**

**Loxicom 5 mg/ml Veterinary**

תמיסה להזרקה לכלבים וחתולים

**מרכיב פעיל:** Meloxicam 5 mg/ml

**התכשיר מכיל גם** Ethanol, anhydrous 150 mg/ml

**קבוצה תרפויטית:** נוגד דלקת שאינו סטרואידי ממשפחת (NSAIDs)

#### **התוויות:**

בכלבים- להקלה של דלקת וכאב הנגרמים עקב הפרעות-שלד שריר אקוטיות וכרוניות. להפחתת כאבים ודלקת לאחר ניתוחים אורתופדיים וברקמות רכות.  
בחתולים – להפחתת כאבים לאחר ניתוחי עיקור (Ovariohysterectomy) וניתוחים מינוריים ברקמות רכות

#### **התוויות נגד:**

אין להשתמש בחיות הרות או מניקות.  
אין להשתמש בכלבים הסובלים מהפרעות במערכת העיכול כגון גירוי ודימום, הפרעות בתפקוד כבד, לב או כליות, הפרעות של דימומים.  
אין להשתמש אם ידועה רגישות למרכיב הפעיל או למרכיבים אחרים של התכשיר.  
אין להשתמש בחיות בנות פחות מ- 6 שבועות, ובחתולים השוקלים פחות מ-2 ק"ג.

#### **תופעות לוואי:**

תופעות לוואי אופייניות לשימוש בתרופות ממשפחת NSAIDs כגון איבוד תאבון, הקאה, שלשול, דם נסתר בצואה, אפתייה, וכשל כלייתי דווחו לעיתים. בכלבים תופעות לוואי אלו מתרחשות בדרך כלל בשבוע הראשון של הטיפול, וברוב המקרים חולפות ונעלמות לאחר סיום הטיפול, אך במקרים נדירים מאד עלולות להיות חמורות ואף לגרום למוות.  
במקרים נדירים מאוד תגובות אנפילקטואידיות עלולות להתרחש ויש לטפל בהם באופן סימפטומטי.  
אם מופיעות תופעות לוואי חמורות או תופעות שאינן מוזכרות בעלון זה, יש לפנות לוטרינר.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,

או ע"י כניסה לקישור :

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

## **מינון:**

כלבים: מנה יחידה של 0.2 מ"ג meloxicam לכל ק"ג משקל גוף ליום (כלומר 0.4 מ"ל ל 10- ק"ג משקל גוף)  
חתולים: מנה יחידה של 0.3 מ"ג meloxicam לכל ק"ג משקל גוף (כלומר 0.06 מ"ל לק"ג משקל גוף)

## **דרך מתן:**

**בכלבים:** בהפרעות שריר – שלד: זריקה אחת תת עורית. להמשך טיפול ניתן לתת תרחיף לשתייה המכיל את החומר Meloxicam במינון של 0.1 מ"ג meloxicam לכל ק"ג משקל גוף, לאחר 24 שעות ממתן הזריקה.

להפחתת כאב לאחר ניתוחים (במשך 24 שעות): זריקה אחת תוך ורידית או תת עורית לפני הניתוח, לדוגמא בזמן אינדוקציה – ההרדמה.

**בחתולים:** להפחתת כאב לאחר ניתוחי עיקור וברקמות רכות: זריקה אחת תת עורית לפני הניתוח, לדוגמא בזמן אינדוקציה ההרדמה.  
יש להמנע מחשיפה למקורות זיהום במהלך הטיפול בתרופה.

**למתן נכון:** יש להקפיד על מנה מדוייקת.

## **הוראות אחסון:**

אחסון בטמפרטורת החדר מתחת ל 25°C.  
יש להרחיק מהישג ידם וראייתם של ילדים.  
אין להשתמש לאחר תאריך פג התוקף המוטבע על האריזה.  
לאחר פתיחה ראשונה ניתן להשתמש בתכשיר עד 28 יום מפתיחת האריזה.

## **אזהרות מיוחדות:**

אם מופיעות תופעות לוואי יש להפסיק את הטיפול ולפנות לווטרינר.  
אין להשתמש בחיות הסובלות מהתייבשות, מירידה בנפח נוזל הדם או מירידה בלחץ דם, עקב סיכון אפשרי מוגבר לרעילות כלליות.  
בחתולים: אין לתת טיפול המשכי בלוקסיקום לשתייה או ב NSAIDs אחרים למתן דרך הפה, כיוון שלא נקבע מינון בטוח למתן חוזר דרך הפה.

## **תגובות בין-תרופתיות:**

אין להשתמש עם תרופות אחרות מקבוצת NSAIDs, משתנים, אינטי קואגולנטים, אנטיביוטיקות מקבוצת אמינוגליקוזידים ותרופות עם קשירה גבוהה לחלבונים עשויים להתחרות בקשירה ולהוביך להשפעות רעילות. אין להשתמש בלוקסיקום יחד עם תרופות אחרות מקבוצת NSAIDs או גלוקוקורטיקוסטרואידים.  
אין להשתמש במקביל בתרופות עם סיכון לרעילות כלליות.  
בחיות הנמצאות בסיכון בעת ההרדמה (למשל בחיות מבוגרות), יש לשקול טיפול בנוזלים תוך ורידי או תת עורי במהלך ההרדמה.  
במתן בו זמני של הרדמה ו NSAID לא ניתן לשלול סיכון לתפקוד הכליות.

טיפול מקדים בתרופות אנטי דלקתיות עלול לגרום לתופעות לוואי נוספות או להגביר את תופעות הלוואי ועל כן יש להמנע ממתן קודם שלהן במשך זמן של לפחות 24 שעות לפני תחילת הטיפול בלוקסיקום, לצורך קביעת משך הזמן יש להתחשב בתכונות הפרמקוקינטיות של התרופות בהן השתמשו קודם.

### **מנת יתר:**

במקרה של נטילת מנת יתר יש לטפל באופן סימפטומטי.

### **אזהרות למטפל:**

הזרקה עצמית בטעות עלולה לגרום כאב. אם ידועה רגישות לתרופות מקבוצת NSAIDs יש להמנע ממגע עם התכשיר. במקרה של הזרקה עצמית בטעות, יש לפנוות מיידית לעזרה רפואית ולהראות את העלון או אריזת התרופה.

### **רשימה של חומרים בלתי פעילים**

Meglumine (n-methyl glucamine), Glycine, Ethanol, Polaxamer 188 (Lutrol F68), Sodium Chloride, Glycofural MS, Sodium Hydroxide (1M), Hydrochloric Acid (1M), Water for injection

**האריזה מכילה:** בקבוקונים של 100, 20 או 10 מ"ל .  
יתכן ולא כל גדלי האריזה משווקים.

**מספר רישום:** 150-41-33607-00

**יצרן:** Norbrook Laboratories Limited, United Kingdom

### **בעל רישום וכתובת:**

קומקס בע"מ, ירושלים 97200.