

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

## נורוקארפ לחיות קטנות זריקה וטרינרי Norocarp Small Animal Injection Veterinary

**הרכב:** חומר פעיל (Carprofen 50 mg/ml (5% w/v) כמו כן מכיל בנזיל אלכוהול 1% w/v כמשמר ו- sodium formaldehyde sulphxylate 0.25% כאנטי אוקסידנט.

### **התוויה:**

**בכלבים:** לשיכוך כאבים לאחר ניתוח, ולטיפול בדלקת עקב ניתוח אורתופדי או ניתוח ברקמות רכות (כולל בעיניים).

**בחתולים:** לשיכוך כאבים לאחר ניתוח.

### **התוויות נגד:**

אין לתת את התכשיר כזריקה תוך שרירית.  
אין לחרוג מהמינון וממשך הטיפול המומלצים.  
אין לתת לחיה המטופלת תרופה נוספת מקבוצת NSAIDs במקביל לתרופה זו. יש לחכות פרק זמן של 24 בין מתן תרופה זו ומתן תרופה נוספת ממשפחת NSAIDs, בגלל הסיכון לרעילות במתן משולב.  
מיועד לטיפול בכלבים וחתולים בלבד.

### **אזהרות למטפל:**

יש לנקוט זהירות על מנת להימנע מהזרקה עצמית או מגע עם העור.  
אם ניתז עליך התכשיר יש לשטוף מיידית.  
יש לשטוף ידיים לאחר הטיפול בתכשיר זה.

### **תופעות לוואי:**

אם הנך מבחין בתופעות חמורות כלשהן או בתופעות שאינן מוזכרות בעלון זה, יש לדווח לוטרינר.

"ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור :

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

### **מינון והוראות שימוש:**

**בכלבים:** המינון המומלץ הוא 4 מ"ג carprofen /ק"ג משקל גוף (1 מ"ל/12.5 ק"ג), בזריקה תוך ורידית (I.V.) או תת-עורית (S.C.), מומלץ לפני הניתוח בשלב טרום-אלחוש או בשלב ההרדמה. לפי המחקרים הקליניים בכלבים נחוצה רק מנה אחת ב 24 השעות שלאחר הניתוח. אם יש צורך בשיכוך כאבים נוסף במהלך זמן זה, ניתן לתת חצי מנה נוספת (2 מ"ג/ק"ג).

**בחתולים:** המינון המומלץ הוא 4 מ"ג carprofen /ק"ג משקל גוף (0.24 מ"ל/3 ק"ג) בפעם אחת, בזריקה תת-עורית (S.C.) או תוך ורידית (I.V.), מומלץ לפני הניתוח בשלב ההרדמה.

### **הנחיות למתן נכון:**

שלא כמו בכלבים בהם ניתן במקרה הצורך לתת חצי מנה נוספת, בחתולים לתרופה זו זמן מחצית חיים ארוך יותר וטווח תרפויטי צר יותר, ולכן נדרשת תשומת לב מיוחדת ולהימנע מלחרוג מהמנה המומלצת. מומלץ להשתמש במזרק של 1 מ"ל עם שנתות מתאימות שיאפשר מדידה מדויקת של המנה.

### **אזהרות מיוחדות:**

אין להשתמש בחיות הסובלות ממחלות לב, כבד או כליה, בחיות בהן יש סיכון לכיב או דימום במערכת העיכול, או כאשר יש עדויות לדיסקרזיה של הדם או רגישות יתר לתכשיר.

כמו בתכשירים אחרים מקבוצת NSAIDs, קיימת אפשרות להופעת תופעות לוואי נדירות בכליה או בכבד.

אין להשתמש בחתולים מתחת לגיל 5 חודשים.

בשימוש בכלבים מתחת לגיל 6 שבועות או בחיות זקנות יכול להיות סיכון מוגבר. אם אין אפשרות להימנע מהטיפול בחיות אילו, יתכן ויידרשו עבורן מנה מופחתת וטיפול קליני זהיר. אין להשתמש בחיות במצב של התייבשות, של חוסר נפח דם או של לחץ דם נמוך, עקב סיכון מוגבר לרעילות לכליות.

יש להימנע משימוש מקביל בתרופות להן קיים סיכון של רעילות לכליה.

אין נתונים על שימוש בחיות הרות, לכן אין להשתמש בתכשיר בחיות הרות.

תרופות מקבוצת NSAIDs עלולות לגרום לעיכוב של פאגוציטוזיס, ולכן בטיפול במצבים דלקתיים הקשורים לזיהום חיידקי, יש לתת במקביל טיפול אנטימיקרוביאלי מתאים.

### **חומרים בלתי פעילים:**

Benzyl alcohol  
Sodium Formaldehyde Sulphoxylate  
Poloxamer type 188 (Lutrol F68)  
L-Arginine  
Water for injection

### **מתן בו זמני עם ווארפרין:**

קרפרופן וגם ווארפרין נקשרות חזק לחלבוני הפלסמה. המידע דל ולפיו הקישור הוא לאתרים שונים. הדבר מאפשר מתן בו זמני של 2 התרופות, אולם יש לעשות זאת בצורה מבוקרת.

### **אחסון:**

בטמפרטורת החדר, מתחת ל-25°C. יש להגן מאור. יש לשמור באריזת הקרטון המקורית. לאחר שימוש ראשון בתכשיר, ניתן להשתמש בשארית המוצר עד 28 יום. הרחק מהישג ידם של ילדים.

### **לשימוש וטרינרי בלבד**

### **חייב מרשם רופא וטרינרי.**

מכיל: 20 מ"ל

מספר רישום: 144-27-92435-00

יצרן: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, N. Ireland

בעל רישום: קומקס בע"מ, דרך שכם 1 ירושלים 97200.

נבדק לפי NOAH 2009 P.825