

## كسيفو ٨ ملغ أقراص

المادة الفعالة وكميتها في وحدة جرعة:

- ١ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، إحكام الطبيب أو الصيدلي خاصة إذا كنت تتناول:
  - يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي خاصة إذا كنت تتناول:
  - سيميتين لعلاج المرقان أو فقرة المعدة.
  - أدوية مضادة لخثر الدم مثل هيبارين أو فنثروكمومن.
  - كورتيكosterويدات.
  - ميتوفركسات - لعلاج السرطان أو أمراض مناعية (في جهاز المناعة).
  - لينيوم.
  - مستحضرات تبطّن الجهاز المناعي مثل سيلوكلوبورين وتاكروليموس.
  - أدوية لامراض القلب وارتفاع ضغط الدم مثل ديجوكسین، مثبّطات ACE، مدرات البول، حبّاجات بيتا.
  - مضاد جوي من مجموعة الكربونولات.
  - أدوية تبطّن كبسولات الصفيحات لمنع ثوبات قلب وسكنة دماغية.
  - مستحضرات مضادة للإكتبات من مجموعة SSRI.
  - أدوية لخفض السكر في الدم من مجموعة السولفونيل أوّريا.
  - أدوية تعيق أو تستنشق الإنزيم CYP2C9 (مثل المضاد الحيوي - ريفاپينيس أو دواء لعلاج الفطر - طوكوتارول).
  - حاجيات المستقبل أنجيوتنسين ٢ لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ضرر كولي نتيجة السكري وقصور القلب.
  - بيمير كسيفو ٨ لعلاج أنواع عديدة من سرطان الرئتين

لا تتناول كسيفو ٨ ملغ أقراص إذا كنت تتناول مضادات التهاب غير ستيرويدية أخرى مثل أسيبيرين، آيبوبروفين أو مثبّطات COX2.

### ٤ استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء قبل وجبة الطعام مع كميةكافية من الماء. لا ينصح بتناول الدواء مع الطعام لأن الطعام قد يقلل من نجاعة الدواء.

### ٥ استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية بشكل مبالغ فيه في فترة العلاج بالدواء.

### ٦ الخصوبة، الحمل والرضاع

لا ينصح بإستعمال كسيفو ٨ ملغ أقراص لدى نساء تحاول الحمل.

على النساء التي مشاركون في الخصوبة أو في مرحلة خوض التشخيص مشاكل خصوبة استشارة الطبيب والتفكير بالتوقف عن العلاج بـ كسيفو ٨ ملغ أقراص.

الحمل

لا ينصح بإستعمال كسيفو ٨ ملغ أقراص في الـ ٦ أشهر الأولى من الحمل، إلا إذا

أشار الطبيب بذلك بشكل واضح.

لا يجوز إستعمال كسيفو ٨ ملغ أقراص في الثلث الأخير من الحمل.

الإرضاع

لا ينصح بالعلاج بـ كسيفو ٨ ملغ أقراص خلال فترة الإرضاع، إلا إذا وجدت تعليمات واضحة من قبل الطبيب بذلك.

### ٧ الساقية واستعمال الماكنات

إذا كنت تشعر بدوران و/أو الميل إلى النوم خلال إستعمال الدواء، فهذا يلزم الحذر في القائمة، شفط مكانته خطوة وشطافات ظرام المقاطة.

### ٨ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي كسيفو ٨ ملغ أقراص على الأكتون موسيديرات. إذا كنت تعاني من نقص تحمل لسكريات معينة، عليك استشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء.

### ٩ كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا.

عليه الاستئصال من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا.

يتم تحديد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي:

المعلجة الأولي - جرعة ٨ ملغ - ١٦ - ملغ في اليوم مقدمة إلى ٢ - ٣ جرعات.

لا تزيد الجرعة اليومية عن ١٦ ملغ.

لعلاج الالتهابات الم⺁طية المفصلي والتهاب المفاصل الرئيسي - جرعة يومية أو أعلى قدرها ١٢ ملغ مقسمة إلى ٣-٢ جرعات ومن ثم جرعة داعمة لا تزيد عن ٦ ملغ في اليوم.

يحتوي كل قرص على: Lornoxicam 8 mg

\* الماء الدارق غير الفعالة وموادات الحساسية في المستحضر. انظر الفقرة ٦ أدناه.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تتعنى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسطلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وتحفظ هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يؤذيهم حتى ولو بدا لك أن حاليهم الطيبة مشابهة لحالتك.

الدواء غير مخصص عادة للأطفال دون عمر ١٨ سنة.

### ١٠ لأي غرض مضمض الدواء؟

يستخدم كسيفو ٨ ملغ أقراص لعلاج قصير الأمد لأوجاع بدرجة خفيفة - متوسطة (مثلاً من بعد جراحة أسان)، لآلام الطهر ولعلاج الالتهاب العظمي المفصلي والتهاب المفاصل الرئيسي.

### الخصيلة العلاجية: مضادات الالتهاب الغير ستيرويدية (NSAIDs).

### (٢) قبل إستعمال الدواء

**١١ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**

- كنت في الثلث الأخير من الحمل.

- وُجِدَت سُبُّلَةً لأحد مركبات الدواء أو لأدوية أخرى غير ستيرويدية مضادة للألم والالتهابات تشمل أسيبيرين (مثل رفع بطيجي ضد عصوبات في التنفس، طفح وذُراقة الأنفية).

- في حال وجود فرحة نشطة في الإثني عشر، خلل شديد في أداء الكبد، خلل شديد في أداء الكلية، تلة المضيق، نزف في جهاز الهضم في الماضي نتيجة إستعمال NSAIDs. تصور قلبي خطير، نزف من جهاز الهضم، في المخ أو نزف آخر.

### ١٢ تحدثن خاصية تتعلق بإستعمال الدواء

٠ على إيليك إنخاذ الحذر خاصة إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من -

٠ خلل في أداء الكلية.

٠ ارتفاع ضغط الدم أو قصور قلبي.

٠ التهاب القلقون أو مرض كرون.

٠ ميل للنزف.

٠ ربو.

٠ مرض النسفة الإحمرارية الجهازية (systemic lupus erythematosus).

٠ قد يؤجهك طبيب خارج قخصوص مخبرة، إذا:

٠ كنت تعاني من مشاكل في تختثر الدم.

٠ كنت تعاني من خلل في وظائف الكبد.

٠ أنت فوق عمر ٦٥ سنة.

٠ عليك أن تتناول كسيفو ٨ ملغ أقراص مرتين أكثر من ٣ أشهر.

٠ عليك أن تبلغ الطبيب إذا كنت على وشك الحصول على العلاج بـ تاكروليموس.

٠ إذا لاحظت أعراض غير اعتيادية في البطن مثل نزف في البطن، ردود فعل القلب، المفتقين، الآثني، الأعصاب الناتسالية أو فتحة الشبر أو علامات أخرى لفرط التحسس، يجب التوقف عن تناول الدواء والتوجه إلى الطبيب حالاً.

٠ أدوية مثل كسيفو ٨ ملغ أقراص قد تزيد قليلاً من خطرة التعرض لنوبة قلبية أو سكتة.

٠ الجلوبرة كما زالت المرة ومرة العلاج لا تتجاوز الجرعة ومدة العلاج الموصى بها.

٠ عليك إستشارة الطبيب بخصوص العلاج إذا:

٠ كنت تعاني من أمراض قلب.

٠ كانت لديك سكتة في الماضي.

٠ كنت تعانين من تذبذب خطير في المخ.

٠ كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم، سكري، مستويات عالية من الكوليسترول في الدم أو إذا كنت تخنق.

٠ يجب تجنب إستعمال كسيفو ٨ ملغ أقراص إذا كنت مريضاً بجذري الماء.

- فرط التحسس، رد فعل استهدافي أو صدمة استهدافية (رد فعل الجسم الذي يتجلّى عادة من خلال انتفاخ الوجه، تورّد، صعوبات في التنفس ودوار).  
 - إرثيات، حصبة، قلة الهواء، العليل إلى النوم، شعور بخدش، ارتتجاف، اضطرابات في حالة المذاق، اضطرابات في الرؤية، شقيقة.
- ضغط مرتفع، هبات من الخبر.
  - نزف، آنفحة تحت الجلد، طالة زمن النزف.
  - فرج، تهاب في الفم، التهاب البريء، إرثاد معدني - مريئي، صعوبات في البلع، تقرحات في المعدة، التهاب في اللسان.
  - السلس، بوظائف الكبد.
  - مشاكل جلدية مثل اكتيريا، طفح.
  - الالم، اعظم، الام، عضلات، تشنج في العضلات.
  - اضطرابات في التبول مثل الحاجة للتبول خلال الليل، أو ارتفاع البولة وكرياتتينين في البول.
  - اعراض جانبية نادرة جداً (ظهور في ١ حتى ١٠٠٠٠ معالجين من بين ١٠٠٠٠٠)
  - ضرر للنخاع، هيپاتيسيس (التهاب الكبد)، يرقان، مشاكل في المسالك البولية والقولون.
- Stevens-Johnson syndrome**: جرعة، وذمة، اعراض جلد خطيرة مثل Toxic epidermal necrolysis.  
 • التهاب السحايا العميق (غير جرثومي).  
 • اعراض جانبية لاكافا مستحضرات من فصيلة مضادات الالتهاب الغير ستربورنيدية: قلة العدالات، قلة المحببات، فقر دم لا تستجيب وفقر دم انحلالي وكذلك تسمم كلوي.
- إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.
- ٤) كيفية تخزين الدواء؟**
- تحفّظ النسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس.
  - لا تسبّب التسوس بدورها على تعليمات صرحة من الطبيب.
  - لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة، بشير تاريخ الصلاحية على اليوم الأخير من نفس الشهر.
  - ظروف التخزين: لا يجوز التخزين بدرجات حرارة تزيد عن ٢٥ درجة مئوية. يجب التخزين في الظلة الأصلية.
- ٦) معلومات إضافية**
- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا:
- Magnesium stearate, povidone, croscarmellose sodium, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, macrogol 6000, titanium dioxide, talc, hypromellose.
- كيف يبدو الدواء و ما هو محتوى العلبة؟  
 كسيفيو ٨ ملء اعراض هي اعراض مطلية بلون أبيض حتى أصفر فاتح، على شكل مستقبليل مطبوع عليه ٠٠٧٦٠٨.
  - صاحب الاعتياز المستورد و عنوانه: ك. ص. ط. م. خ. شارع هاهاواش، ٤، هود هشارون.
  - اسم المنتج و عنوانه: Takeda Pharma A/S Denmark, Dybendal Alle 10, DK-2630 Taastrup, Denmark.
  - اقرب وزارة الصحة صبية هذه النشرة و محتواها أحص و رخص في تاريخ: ٢٠١٣.
  - رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٦٢٢٠٦٢٢٠٧٢٨٢٢٠.
  - من أجل سهولة و تهيئة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
- جرعة في حالة وجود خلل في وظيفة الكلى أو الكبد - جرعة يومية قصوى قدرها ٢٧ ملء مقصورة إلى ٢ - ٣ جرعات.  
 لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.  
 يجب بلع الدواء مع الماء. لا تأخذ كسيفيو ٨ ملء اعراض مع الوجبة لأن تناول الدواء مع الطعام قد يقلل من تناول القرص.  
 لا يمكن الشره، يمكن سحق القرص وبلعه حالاً.
- فحوص و متابعة**
- من الجائز أن يوجه طبيبك لفحوص متابعة دورية لوظائف الكبد والكلى، خاصة إذا كنت تعالج بـ كسيفيو ٨ ملء اعراض لفتره تزيد عن ٣ أشهر، كنت فوق عمر ٦٥ سنة أو كنت تعاني من خلل في وظيفة الكلى أو الكبد.
- إذا تناولت بالخطأ جرعة أعلى من الدارم**
- إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع الطفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو الغرفة الطارئ في المستشفى و اخضريه بة الدواء معك.
- في حال جرعة مفرطة الأعراض الجانبية المتوقعة هي: غثيان، تقيّق، اعراض تتعلق بجهاز الأمعاء المركزي مثل دوار وتشوش الرؤية.
- إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.**
- تناول الجرعة الثانية في الوقت المعايير واستشر الطبيب.
- يجب المواظة على العلاج كما وأوصي به الطبيب.
- لا تتناول دواء في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء و تذكر من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم ذلك.
- إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.
- (٤) الأعراض الجانبية**
- كماء بكل دواء، إن استعمال كسيفيو ٨ ملء اعراض قد يسبب أعراضًا جانبية غير بعض المستحبطن، لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز أن تعياني أنا منها.
- قد تزيد كسيفيو ٨ ملء اعراض بشكل قليل من خطرة حدوث نوبة قلبية أو سكتة.
  - إذا لاحظت اعراض غير عادية في البطن مثل نزف بطيء، ردود فعل جلدية مثل طفح في الجلد، اصابة بالاشدات المخاطية الداخلي في المختبر، الفم، الجفون، الأنف، الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج أو علامات أخرى زياده التحسس، يجب التوقف عن تناول الدواء و التوجه إلى الطبيب بشكل فوري.
  - إذا لاحظت الأعراض الجانبية الثالثة، توقف عن استعمال كسيفيو ٨ ملء اعراض وتجوه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ، حالاً.
  - ضيق تنفس، الالم في الصدر أو ظهور اتفاق نفخ في الكاحلين.
  - الالم بطن شديد أو متواصل، بران أسود.
  - اصفرار الجلد و/أو بياض العين.
  - رد فعل اليرجح يتحلى مشاكل في الجلد مثل تقرحات وحويصلات، انتفاخ في الوجه، الشفرين، اللسان أو الحجمة الذي يصعب على التنفس.
  - سخونة، نقش حويصلات أو التهاب خاصة في اليدين، القدمين أو في منطقة Stevens-Johnson syndrome (متلازمة ستيفنس-جونسون).
  - تلوثات خطيرة في الجلد أثناء الإصابة بجدري الماء.
- أعراض جانبية إضافية
- اعراض جانبية شائعة (ظهور في ١ حتى ١٠٠٠ معالجين من بين ١٠٠٠)
  - صداع، اغماء، غثيان، الالم على طرف، صعوبات في الهضم، إسهال، تقيّق.
  - اعراض جانبية غير شائعة (ظهور في ١ حتى ١٠٠٠ معالجين من بين ١٠٠٠)
  - ارق، اكتئاب، انخفاض في الوزن.
  - التهاب الملتقطة.
  - رنين في الأذنين (طنين) دوار.
  - تبخر قلب سريع، تبخر غير منتظم، قصور القلب، تورّد.
  - امساك، غازات، تجشؤات، جفاف في الفم، التهاب المعدة، قرحة معدية أو إثنى عشر، تقرحات في الفم.
  - اضطرابات ايكيدية - ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد، شعور بالمرض.
  - طفح، حكة، تعرق زائد، احمرار في الجلد، وذمة وعائية (وذمة في البقع العميقة من الجلد، خاصة في الوجه، شرى، وذمة، احتجان الانف نتيجة حساسية (rhinitis)).
  - سخاط العضلات المفاصيل.
  - اعراض جانبية نادرة (ظهور في ١ حتى ١٠٠٠ معالجين من بين ١٠٠٠)
  - الالم في الحنجرة.
  - قفر دم، انخفاض في تعداد الدم (قلة الصفائح، نقص الكريات البيضاء)، ضعف عام.