

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר באוקטובר 2016

## עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

### 1. שם התרופה :

אנג'מיצין ספריי וטרינרי  
ספריי לשימוש על העור

**Engemycin Spray Veterinary  
Cutaneous spray**

### 2. הרכב:

חומרים פעילים

Oxytetracycline hydrochloride	25.00 mg/ml
(equivalent to oxytetracycline)	23.15 mg/ml)

חומרים בלתי פעילים

Patent blue V (E131)	1.25 mg/ml
----------------------	------------

רשימת חומרים בלתי פעילים מפורטת בסעיף "מידע נוסף".

### 3. למה התרופה מיועדת:

לטיפול בזיהומים הבאים הנגרמים על ידי או הקשורים לאורגניזמים הרגישים לאוקסייטרצקלין בבקר, כבשים וחזירים.  
זיהומים ברגל הנגרמים בייחוד על ידי: *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necrophorum*, ו- *Fusobacterium ssp.* ו- *Bacteroides* אחרים.  
כטיפול תומך בזיהומי פצעים שטחיים לאחר ניתוח או פציעה גופנית, למשל, נשיכת זנב בחזירים, שריטות ופצעים.

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת טטרציקלינים לשימוש חיצוני.

### 4. התוויות נגד:

אין לרסס על עטין החיה המטופלת, על מנת למנוע שאריות של חומר הפעיל בחלב.  
אין להשתמש במקרה של רגישות לאוקסייטרצקלין או לאחד מהמרכיבים הבלתי פעילים.

### 5. תופעות לוואי:

אין.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:  
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

**6. חיות מטרה:**  
בקר, כבשים וחזירים.

**7. צורת מתן ומינון:**  
תרחיף בצורת תרסיס לעור.  
**לשימוש חיצוני בלבד.**

**8. אופן שימוש בתכשיר:**

נער היטב לפני השימוש. מיכל התרסיס מותאם לשימוש במצב עומד והפוך. יש לנקות את אזור המטופל טרם הריסוס, רסס את המוצר למשך 1-2 שניות, במרחק של 15-20 סנטימטר, עד שהאזור יהיה בצבע אחיד. חזור על הטיפול כל 12 שעות למשך 1 עד 3 ימים, בתלות בתהליך ההחלמה.

- כדי לקבל את התוצאות מיטביות במקרה של פצעים בכפות הרגליים מומלץ לעקוב אחרי ההוראות הבאות:
- נקה באופן מלא את אזור הרגל, הסר כל החומר הזר, הפרשות ואזורים נמקים.
  - שמור את החיות על אדמה יבשה במשך 12 שעות לאחר השמה.

**9. זמן המתנה:**

**בקר, כבשים:**

בשר ושיירים: 0 ימים

חלב: 0 ימים

**חזירים:**

בשר ושיירים: 0 ימים

יש להסיר חלקים מוכתמים של עור החזיר לפני ששאר החיה תשמש למאכל אדם.

**10. אזהרות:**

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחית המטרה

יש לטפל בחיה באזור המאוורר היטב.  
אין לרסס בתוך או ליד העיניים.

השימוש במוצר זה צריך להיות מבוסס על מבחני רגישות לחיידקים המבודדים מהחיה. במקרה והדבר אינו אפשרי יש לנהוג בהתאם למידע אפידמיולוגי אזורי לרגישות החיידק.

• אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר

עקב סיכון להתפתחות רגישות ודלקת בעור (דרמטיטיס), יש להימנע ממגע עם העור של המטפל. יש להשתמש בכפפות לא חדירות בעת הטיפול בתכשיר.  
עקב סיכון לגירוי העיניים, יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים. יש להגן על העיניים והפנים.  
אין לרסס לעבר להבה גלויה או חומרים לוחטים.  
אין לנקב או לשרוף את המיכל גם לאחר סיום השימוש.  
יש להימנע משאיפת אדים.  
יש השתמש בתכשיר באוויר הפתוח או באזור המאוורר היטב.  
יש לשטוף את הידיים לאחר השימוש.  
אין לאכול או לעשן בעת הטיפול בתכשיר.  
במקרים של בליעה בטעות או מגע עם העיניים, יש לפנות לטיפול רפואי ולהציג לרופא את העלון/האריזה של התכשיר.

• הריון והנקה

ניתן להשתמש בחיות בהריון ובחיות מניקות.

• תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות

לא ידוע.

**11. הוראות אחסון:**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה/בקבוק.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C .
- שמור הרחק ממקור אש ומקורות הצתה- אין לעשן.

**12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/ שאריות התכשיר בתום השימוש:**

כל תכשיר ווטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר ווטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

### 13. מידע נוסף:

- נוסף על החומר(ים) הפעיל(ים) התרופה מכילה גם:

Patent Blue V (E131)

Polysorbate 80

Isopropyl alcohol

Mixture of hydrocarbons on butane basis (LPG), with denaturant

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

מיכל לחץ אלומיניום המכיל 200 מ"ל מוצר, 5 גר' אוקסיטרציקלין הידרוכלוריד וצבען כחול. שסתום התרסיס מאפשר לו לעבוד במצב עומד והפוך.

- גודל האריזה:

מיכל המכיל 200 מ"ל.

- בעל הרישום וכתובתו:

אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240.

- שם היצרן וכתובתו:

Intervet Productions SRL, Via Nettunense Km.20.300, Aprilla (LT) Italy.

- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך:

אוקטובר 2016.

- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות

157-22-34471-00