

Препарат отпускается без рецепта

# КСИЛОВИТ 0.1%

## Назальные капли/дозированный спрей для взрослых

# КСИЛОВИТ 0.05%

## Назальные капли/дозированный спрей для детей

**Состав:** Ксилловит 0.1%: Xylometazoline HCl 0.1%  
Ксилловит 0.05%: Xylometazoline HCl 0.05%

Список неактивных компонентов указан в пункте 6 – «Дополнительная информация».

**Перед применением препарата внимательно изучите весь текст данной инструкции.** Инструкция содержит скатую информацию о лекарстве.

Данное лекарство отпускается без рецепта и предназначено для применения детьми, взрослыми и пожилыми людьми. Использовать в соответствии с инструкцией. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с фармацевтом. Следует обратиться к врачу, если симптомы заболевания усиливаются или не проходят.

### 1. Для чего предназначено это лекарство?

Препарат сужает кровеносные сосуды в носу, тем самым облегчая заложенность носа.

Показания: лекарство предназначено для быстрого избавления от заложенности носа на срок до 10 часов.

**Фармакологическая группа:** содержит ксилометазолина гидрохлорид, относящийся к группе симпатомиметиков.

### 2. Перед использованием лекарства

**Препаратом нельзя пользоваться:**

- в случае повышенной чувствительности к одному из компонентов или к похожим препаратам того же назначения,
- после недавней хирургической операции на носу и горле.

### Меры предосторожности при использовании препарата:

- Нельзя применять препарат без предварительной консультации врача** перед началом его использования, если вы беременны или кормите грудью либо страдаете или страдали в прошлом нарушениями функций сердца или кровеносной системы (артериосклерозом), заболеваниями глаз (например, глаукомой), нарушениями функций печени, почек/почечной выделительной системы, гиперфункцией щитовидной железы, гипертонией или сахарным диабетом.
- Длительное применение или передозировка** могут стать причиной усиления заложенности носа либо повреждения его слизистой оболочки! Не допускайте частое или продолжительное применение препарата без консультации врача. Не используйте «Ксилловит» более 3 дней подряд, если это не было предписано врачом.
- При повышенной чувствительности к каким-либо продуктам питания или лекарственным препаратам сообщите об этом врачу перед назначением лекарства.
- Взаимодействие с другими лекарствами:** если вы принимаете какие-либо лекарства или недавно закончили курс медикаментозного лечения, сообщите об этом лечащему врачу во избежание осложнений или неэффективности препарата, вызванных взаимодействием с другими лекарственными средствами. Это особенно важно для препаратов-антидепрессантов, таких как трициклические и тетрациклические ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), поскольку одновременный их прием может привести к усилению системного эффекта ксилометазолина, лекарств типа Метилдопа и Тироксина для снижения артериального давления.

### Важная информация о некоторых компонентах данного лекарства:

содержит 0.01% Benzalkonium Chloride в качестве консерванта.

### 3. Как применять этот препарат?

**Обратите внимание:** лекарство нельзя глотать! Оно предназначено только для наружного применения.

**Стандартная дозировка (при отсутствии иных указаний врача):**

**взрослые и дети старше 12 лет** – «Ксилловит» 0.1%: капли – 2-3 капли каждые 8-10 часов,

дозированный спрей - 1-2 впрыскивания каждые 8-10 часов.

**Дети 2-12 лет** – «Ксилловит» 0.05%: капли – 2-3 капли каждые 8-10 часов,

дозированный спрей – одно впрыскивание каждые 8-10 часов.

Данное лекарство, как правило, не предназначено для детей младше 2 лет, кроме как по назначению врача и под его контролем.

**Не превышайте рекомендованную дозировку.**

**Если вы пропустили время пользования препаратом,** воспользуйтесь им сразу же, как вспомните, но ни в коем случае не принимайте двойную дозу.

### Как можно повысить эффективность лечения?

**Капли для носа:** а) Способ применения: аккуратно прочистите нос. запрокиньте голову назад или лягте на спину. Закапайте капли в каждую ноздрю и оставайтесь в том же положении на несколько минут для проникновения лекарства во все носовые ходы. б) Хорошо промойте пилетку в горячей воде и промокните чистой бумажной салфеткой, следите, чтобы вода не попала внутрь флакона. Тщательно закрывайте флакон после применения. в) Во избежание распространения инфекции не допускайте использования несколькими людьми одного флакона.

**Назальный спрей:** а) Аккуратно прочистите нос. Держа голову прямо, впрысните препарат в каждую ноздрю (при этом вторую ноздрю нужно зажать пальцем) следующим образом: резко и коротко нажимайте на распылитель флакона, одновременно делая короткие вдохи носом. Количество нажатий должно соответствовать рекомендуемой дозировке. б) Подождите 3-5 минут. в) Еще раз аккуратно прочистите нос, при необходимости повторите это действие. г) Промойте носик распылителя горячей водой. Следите, чтобы вода не попала внутрь флакона. Вытрите чистой бумажной салфеткой и тщательно закройте. е) Для предупреждения распространения инфекции не допускайте использования одного флакона несколькими людьми.

Нельзя принимать лекарства в темноте! При каждом использовании препарата проверяйте его название на упаковке и дозировку. Если нужно, надевайте очки.

### 4. Побочные явления

Применение капель и спрея «Ксилловит», как и любого другого лекарственного средства, помимо терапевтического действия может провоцировать побочные явления у некоторых пациентов. Другое списка побочных явлений ни должно вызывать у вас беспокойства. Возможно, что у вас не появится ни одно из них.

**Вероятно возникновение следующих побочных явлений:** ощущение жжения в носу и горле, сухость и зуд в носу, тошнота, чихание. Эти явления обычно проходят в течение короткого времени после периода адаптации к препарату. Если же они продолжают или причиняют неудобства, следует посоветоваться с врачом.

**Явления, требующие особого отношения:** возобновление заложенности носа или возникновение признаков системной абсорбции в организме, например: головной боли, нарушенной зрения, нарушенный сна, учащения или усиления сердечного ритма. При симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии аллергической реакции: затруднение дыхания и глотания, отек лица, губ, языка или горла, сильный кожный зуд, сопровождающийся красной сылью или неровностями кожи: **прекратите лечение и немедленно обратитесь к врачу!**

**Побочные явления и взаимодействие с другими лекарствами у детей, включая младенцев:** родители должны сообщить лечащему врачу обо всех побочных явлениях, а также о любом другом лекарстве, которое получает ребенок! См. выше перечень побочных явлений и взаимодействия с другими препаратами.

При возникновении побочных явлений, не указанных в данной инструкции, или при любом изменении общего самочувствия срочно обратитесь к врачу для консультации.

### 5. Как хранить данный препарат?

- Хранить в темном месте при температуре ниже 25°C.
- **Нельзя использовать препарат после истечения срока годности (Exp date),** указанного на упаковке. Датой окончания срока годности является последний день указанного месяца.
- Даже при соблюдении рекомендованных правил упаковки/хранения лекарства имеют ограниченный срок годности. При любом сомнении следует посоветоваться с фармацевтом, у которого вы приобрели этот препарат. Его можно использовать в течение 6 месяцев после первого открытия флакона, но не позднее даты окончания срока годности, указанного на упаковке.
- Лекарство представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.
- Храните препарат в оригинальной упаковке. Не держите в одной упаковке разные лекарства.
- **Остерегайтесь отравления!** Во избежание отравлений, этот препарат, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте.
- В случае передозировки или ошибочного проглатывания препарата ребенком, немедленно обратитесь в приемный покой больницы, захватив с собой упаковку от лекарства
- **Не пытайтесь вызвать рвоту,** если вы не получили четких указаний от врача!

### 6. Дополнительная информация

Помимо действующих веществ препарат содержит следующие неактивные компоненты: Sodium Chloride, Potassium Chloride, Benzalkonium Chloride, Disodium Edetate, Disodium Hydrogenphosphate, Potassium Dihydrogenphosphate, Purified water.

**Производитель:** Витамед Фармацевтическая Промышленность Лтд, а/я 114, Биньямина 3055002, Израиль.

Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения 04/2010 г.

Регистрационный номер препарата «Ксилловит» 0,05%: 625827663

«Ксилловит» 0,1%: 625727664

Лекарство предназначено как для мужчин, так и для женщин. Для упрощения текста и удобства его чтения данная инструкция сформулирована в мужском роде.