

## הודעה על החמרה (מידע בטיחות) בעלון לצרכן

תאריך: 02.03.2017

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום

**DANALONE: 133.81.31155.00**

שם בעל הרישום: תרימה, תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ

פרטים על השינויים המבוקשים		
טקסט חדש	טקסט נוכחי	פרק בעלון
<p>אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6). <b>תסמינים לאלרגיה חריפה עלולים לכלול פריחה אדומה ובולטת בעור, קשיי נשימה, נפיחות בפנים, בפה, בשפתיים, ובעפעפיים, חום גבוה שאינו מוסבר ותחושת עילפון. במידה והנפיחות משפיעה על הגרון ומקשה על הנשימה והבליעה יש לפנות מיד לבית החולים.</b></p> <p><b>אתה סובל מזיהום המשפיע על הגוף כולו (אלא אם הנך מקבל טיפול לזיהום).</b></p> <p><b>קיבלת לאחרונה חיסון חי.</b></p>	<p>אין להשתמש בתרופה כאשר הינך מניקה. אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה. אין להשתמש בתכשיר במקרה של זיהום פטרייתי סיסטמי.</p>	<p><b>לפני השימוש בתרופה? (אין להשתמש בתרופה אם):</b></p>

**לפני  
הטיפול  
בדנלון  
ספר  
לרופא  
אם:**

אם הינך בשליש ראשון/אחרון של הריון.

אם הינך סובלת/ או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: העיניים (כגון: גלאוקומה), הלב ו/או כלי דם (כולל לחץ דם גבוה), הכבד, הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (כגון: אולקוס) בלוטת התריס (תירואיד).

אם הינך סובלת/ או סבלת בעבר בעבר מהרפס בעיניים, שחפת, זיהום פטרייתי או זיהום אחר בגוף או חבלה רצינית, מחלת עצמות (כגון: אוסטיאופורוזיס), סוכרת, מיאסתניה גרביס.

הנך סובל או סבלת בעבר מדיכאון חמור או מאניה דפרסיה (הפרעה דו קוטבית), כולל דיכאון לפני או במהלך שימוש בתרופות המכילות סטרואידים כגון: דנלון.

בן משפחתך הקרוב סובל או סבל בעבר מבעיות נפשיות.

**בעיות נפשיות במהלך שימוש בדנלון.** בעיות נפשיות עלולות להתרחש במהלך השימוש בתרופות המכילות סטרואידים כגון: דנלון.

מחלות אלו עלולות להיות חמורות.

בעיות נפשיות עלולות להתחיל תוך מספר ימים או שבועות

מתחילת הטיפול.

בעיות נפשיות צפויות יותר במינונים גבוהים.

רוב הבעיות הנפשיות חולפות עם הורדת המינון או הפסקת

הטיפול. בכל מקרה, במידה והן מתרחשות יש לטפל בהן.

ספר לרופא אם הנך (או המטופל אשר נוטל את התרופה) מראה סימנים של בעיות נפשיות. במיוחד אם הנך בדיכאון או חושב על התאבדות. במקרים מועטים בעיות נפשיות התרחשו כאשר המינון הופחת או התרופה הופסקה.

**אבעבועות רוח, שלבket חוגרת או חצבת.**

ספר לרופא אם חלית בעבר באבעבועות רוח, שלבket חוגרת או

חצבת או במידה והתחסנת בעבר לזיהומים אלו.

במהלך נטילת התרופה יש להימנע משהות בסביבת חולים עם

אבעבועות רוח, שלבket חוגרת או חצבת. במיוחד אם לא חלית

במחלות אלו בעבר. במידה ושהיית עם חולים עם אבעבועות רוח,

שלבket חוגרת או חצבת יש לגשת לרופא מיד.

במידת וחלית באבעבועות רוח, שלבket חוגרת או חצבת יש

לגשת לרופא מיד. הרופא ייעץ לך כיצד ליטול את התרופה,

ייתכן והרופא ישנה לך את המינון של דנלון.

<p>הנך סובל או סבלת בעבר משחפת או אלח דם (הרעלת דם).</p> <p>הנך סובל מבעיות כבד או כליה.</p> <p>הנך סובל מיתר לחץ דם (או יש לך היסטוריה משפחתית של יתר לחץ דם), מבעיות לב או לאחרונה סבלת מהתקף לב.</p> <p>הנך סובל או יש לך היסטוריה משפחתית של:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> סכרת.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> אוסטאופורוזיס.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> גלאוקומה (עליה בלחץ התוך עיני).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> אפילפסיה (פרכוסים).</li> </ul> <p>סבלת בעבר מחולשת שרירים במהלך שימוש בפרדניזולון או תרופות אחרות המכילות סטרואידים.</p> <p>הנך סובל או סבלת בעבר מכיב קיבה.</p> <p>הנך סובל מתת פעילות של בלוטת התריס.</p> <p>אם אתה סובל מאחד מהמצבים שהוזכרו לעיל, הרופא יינטר בקפידה את מצבך.</p>		
<p><b>אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.</b> במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:</p> <p><b>ריפאמפיין וריפאבוטין</b> (אנטיביוטיקה לטיפול בשחפת), שימוש בתרופות אלו עם פרדניזולון עלול למנוע מפרדניזולון לעבוד כראוי.</p>	<p>אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם ותוספי תזונה, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:</p> <p>חיסונים, אספירין וסליצילטים, תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרגעה, לשינה, לפרקינסון, לאפילפסיה,</p>	<p><b>תגובות בין תרופתיות</b></p>

להפרעות נפשיות וכו'), תרופות לטיפול בזיהום פטרייתי (כגון : קטוקונזול, איטרקונזול וכו'), סומטרופין, אמפוטריצין, אריתרומיצין, ציקלוספורין, מטוטרקסאט, משתנים/תרופות המספקות אשלגן, תרופות להורדת רמת הסוכר בדם כולל אינסולין, דיגוקסין, ריפאמפין, מיטוטן, ריטודרין, קרבמזפין, פרימידון, אפדרין, מיפריסטון, תרופות המכילות נתרן, סותרי חומצה, תרופה המכילה נגזרת אסטרוגנית ו/או פרוגסטרונית (כגון : גלולות למניעת הריון אנטיביוטיקה ממשפחת הפלואורו-קווינולונים (כגון : ציפרופלוקסצין, לבופלוקסצין וכד')

**קרבאמזפין, פניטואין, פרימידון, פנוברביטון** (לטיפול באפליפסיה), שימוש בתרופות אלו עם פרדניזולון עלולות למנוע מפרדניזולון לעבוד כראוי.

**אפדרין** (לטיפול בגודש באף), שימוש באפדרין עם פרדניזולון עלול למנוע מפרדניזולון לעבוד כראוי.

**אמינוגלוטתימיד** – (לטיפול בסרטן) שימוש בתרופה זו עם פרדניזולון עלול למנוע מפרדניזולון לעבוד כראוי.

**מיפריסטון** (להפסקת הריון), שימוש במיפריסטון עם פרדניזולון עלול למנוע מפרדניזולון לעבוד כראוי למספר ימים.

**אריתרומיצין** (אנטיביוטיקה לטיפול בזיהומים), בנטילת התרופה עם פרדניזולון הרופא עשוי לשנות את מינון הפרדניזולון, כי אחרת ייתכן ותחוה יותר תופעות לוואי.

**קטוקונאזול** (לטיפול בזיהום פטרייתי), בנטילת התרופה עם פרדניזולון הרופא עשוי לשנות את מינון הפרדניזולון, כי אחרת ייתכן ותחוה יותר תופעות לוואי.

**ציקלוספורין** (למניעת דחיית שתל לאחר השתלה) בנטילת התרופה עם פרדניזולון הרופא עשוי לשנות את מינון הפרדניזולון, כי אחרת ייתכן ותחוה יותר תופעות לוואי.

**ריטונאוויר** (לטיפול ב-HIV), בנטילת התרופה עם פרדניזולון הרופא עשוי לשנות מינון הפרדניזולון, כי אחרת ייתכן ותחוה יותר תופעות לוואי.

**הורמונים המכילים אסטרוגנים** כולל גלולות למניעת הריון, ייתכן ותחווי יותר תופעות לוואי. הרופא עשוי לשנות את מינון הפרדניזולון.

**תרופות לסכרת** (כגון : אינסולין), בנטילה עם פרדניזולון ייתכן ותרופות אלו לא יעבדו כראוי.

**תרופות לטיפול ביתר לחץ דם** (כגון : הידרלזין) בנטילה עם פרדניזולון ייתכן ותרופות אלו לא יעבדו כראוי.

**משתנים** (בנדרופלותיאזיד) בנטילה עם פרדניזולון ייתכן ותרופות אלו לא יעבדו כראוי.

**סומטוטרופין** (הורמון גדילה) בנטילה עם פרדניזולון ייתכן ותרופה זו לא תעבוד כראוי.

**תרופות לטיפול במיאסטניה גרביס** (חולשת שרירים), כגון נאוסטיגמין, בנטילה עם פרדניזולון ייתכן ותרופות אלו לא יעבדו כראוי.

**תרופות הניטלות לצורך בדיקת רנטגן**, בנטילה עם פרדניזולון ייתכן ותרופות אלו יעבדו כראוי.

**אנטיקואגולנטים לדילול הדם**, (כגון : וורפרין וקומדין), בנטילה עם פרדניזולון עולה הסיכון לדימומים, לכן הרופא ינטר את מצבך בקפידה.

**אספירין ותרופות אנטי דלקתיות שאינן סטרואידים** (כגון : איבופרופן) בנטילה עם פרדניזולון עולה הסיכון לפתח כיבים או דימומים מהקיבה.

**סליצילטים** (כגון אספירין), ייתכן ותחוה יותר תופעות לוואי של סליצילטים בעת הפסקת הטיפול עם פרדניזולון.

**מתוטרקסאט** (לטיפול אנטי-סרטני), בנטילה עם פרדניזולון ייתכן ותחוה יותר תופעות לוואי חמורות.

**בנוסף, ספר לרופא או לרוקח במידה והנך נוטל את התרופות הבאות, נטילת תרופות אלו בשילוב עם דנלון עלולה לגרום לירידה ברמות האשלגן בדם**

<p><b>(היפוקלמיה):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>אצטאזולאמיד</b> (לטיפול בגלאוקומה ואפילפסיה).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>משתנים כגון:</b> פורוסמיד ובנדרופלומתאזיד (לטיפול ביתר לחץ דם).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>קרבונוקסולון</b> (לטיפול בכיב קיבה).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>תרופות לטיפול באסתמה (כגון: תיאופילון, במבוטרול, פנוטרול, פורמוטרול, ריטודרין, סאלבוטאמול, סאלמטרול וטרבותלין).</b></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>אמפוטרוצין</b> (לטיפול בזיהום פטרייתי).</li> </ul> <p><b>חיסונים,</b> במידה ועשית לאחרונה חיסון או הנך מתכנן לעשות חיסון, ספר לרופא טרם נטילת דלון. זאת מכיוון שישנם זריקות או חיסונים אשר אין לתל לחולים אשר נוטלים פרדניזולון.</p>		
<p>במידה והנך בהריון או מניקה, חושבת שהנך בהריון או מתכננת הריון, יש להיוועץ ברופא או טרם נטילת התרופה.</p>		<p><b>הריון והנקה</b></p>
<p><b>שים לב:</b></p> <p>הרופא יחליט על המינון המתאים ביותר עבורך או עבור ילדך. תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא או הרוקח. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.</p> <p>בתרופות נוזליות, עליך להשתמש בכוסית מדידה, מזרק או טפטפת המיועדים למדידת הכמות הנכונה של התרופה. נא הסתייע בהמלצת הרוקח לקבלת כלי מדידה מתאים. אין להשתמש בכפית ביתית לצורך מדידת כמות התרופה. הכפיות הביתיות שונות בגודלן ויתכן שלא תקבל את כמות התרופה הנכונה.</p> <p>פקקים העמידים לפתיחה על ידי ילדים הורידו משמעותית את מספר מקרי ההרעלה הנגרמים על ידי תרופות בכל שנה. אם אתה מתקשה בפתיחת האריזה, באפשרותך לפנות לרוקח לקבלת עזרה.</p> <p><b>אם נטלת בטעות מנת יתר,</b> פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.</p>	<p>מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל. במידה ולא חל שיפור במצבך או שחלה הרעה, יש לפנות לרופא.</p> <p><b>שים לב:</b> יש להקפיד על מדידת המנה בכפית מידה או בכוסית מדידה מיוחדת, מזלף וכו'.</p> <p><b>כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול ?</b> גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא וגם אז באופן הדרגתי.</p> <p><b>מנע/י הרעלה !</b> תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר</p>	<p><b>כיצד תשתמש בתרופה ?</b></p>

מיון של בית-חולים, והבאי אריזת התרופה איתך.  
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא !  
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך ; בחולה אחרת, היא עלולה להזיק.  
אל תתן/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.  
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך  
נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

**אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש לקחת את המנה בהקדם האפשרי.**  
אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה והמשך במינון הרגיל,  
אין ליטול מנה כפולה.

**אם הפסקת ליטול דנלון:**  
היוועץ עם הרופא טרם הפסקת הטיפול בדנלון.

אין להפסיק את הטיפול בתרופה בפתאומיות. הרופא ינחה אותך כיצד להפחית  
את המינון לאורך מספר שבועות או חודשיים על מנת להקטין את הסיכון  
לתסמיני גמילה.

**הפסקת הטיפול בדנלון (במיוחד בפתאומיות) עלולה להוביל לתסמיני גמילה.**  
התסמינים הנפוצים הם:

- חום גבוה.
- כאבי שרירים וגידיים.
- נזלת.
- ירידה במשקל.
- גרד בעור
- עיניים אדומות, כואבות ודביקות (דלקת בלחמית העין).
- כאב ראש.
- הקאות.
- ראייה מטושטשת.
- ירידה בלחץ דם.

במידה והנך סובל מתסמיני גמילה קשים, ספר מיד לרופא. ייתכן והרופא יבקש  
ממך לחזור ליטול את התרופה ואז להפסיק אותו בקצב איטי יותר.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל  
תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

תופעות לוואי		
<p><b>תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:</b> תכיפות מתן שתן, צימאון מוגבר (נדיר): הפסק/ את הטיפול ופנה/ לרופא. חולשת שרירים, בעיות במחזור החודשי, נפיחות/בצקת בפנים או ברגליים, סחרחורות, חולשה, עייפות (נדיר): הפסק/ את הטיפול ופנה/ לרופא. ראיה מטושטשת, כאב בעין, גלאוקומה, קטראקט, עליה בלחץ תוך עיני - פנה/ לרופא מיד. צמיחת שיער מוגברת, עליה בלחץ הדם, עליה במשקל, נפיחות בפנים, פנים מתעגלות, דילול העור, פיגמנטציה של העור, הזעת יתר: כל אחד ממקרים אלו מחייב פנייה מיידית לרופא! התפתחות זיהום: פנה/ לרופא מיד. כאבי ראש - פנה/ לרופא מיד. שינויים פסיכויטיים (עצבנות או חוסר מנוחה, נדודי שינה, אופוריה, מצבי רוח, דכאון וכד') - פנה/ לרופא מיד.</p> <p>בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.</p> <p><b>תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:</b> שימוש בתכשיר בילדים עשוי להשפיע על קצב הגדילה. על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה! ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.</p>	<p>בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: תאבון מוגבר, קשיי עיכול, כיב קיבה, דלקת בלבב, אקנה, שינויים בבדיקות דם (עליה ברמות הסוכר, שינוי ברמות השומן בדם, שינוי במאזן אלקטרוליטים), אוסטיאופורוזיס, סיכון מוגבר לשברים.</p>	<p>כמו בכל תרופה, השימוש בדנלון סירופ עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.</p> <p><b>יש לפנות מיד לרופא במידה ומופיעות התופעות הבאות:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>תגובה אלרגית חריפה</b> הכוללת פריחה אדומה ובולטת בעור, קשיי נשימה נפיחות בפנים, פה, שפתיים, ועפעפיים. חום גבוה שאינו מוסבר ותחושת עילפון. <b>במידה והנפיחות משפיעה על הגרון ומקשה על הנשימה והבליעה יש לפנות מיד לבית החולים.</b></li> <li>• <b>בעיות נפשיות חמורות.</b> סטראידיים, כולל פרדניזולון, עלולים לגרום לבעיות נפשיות חמורות. תופעה זו יכולה להתרחש במבוגרים וגם בילדים תופעה זו עלולה לפגוע ב 5 אנשים מתוך 100 המשתמשים בפרדניזולון. <b>התסמינים כוללים:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> תחושת דיכאון, כולל מחשבות על התאבדות.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> תחושת אופוריה (מאניה) או שינויים במצב הרוח.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> חרדה, בעיות שינה, קושי במחשבה או בלבול ואיבוד זיכרון.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> תחושה, ראייה או שמיעה של דברים שאינם קיימים. מחשבות מוזרות ומפחידות, שינויים בהתנהגות ותחושת בדידות.</li> </ul> </li> <li>• <b>הנך חולה אפילפסיה והנך סובל מפרכוסים יותר מהרגיל.</b></li> </ul> <p><b>תופעות הלוואי הבאות עלולות להתרחש במידה ונטילת פרדניזולון הינה לאורך זמן:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• במידה וסבלת בעבר משחפת, השחפת עלולה לחזור.</li> <li>• הנך עלול לסבול יותר מזיהומים.</li> <li>• סרטן נדיר אשר עלול להשפיע על העור ואיברים פנימיים (סרקומת קפושי).</li> <li>• עלייה בתאי דם לבנים.</li> <li>• פנים עגולות ועלייה במשקל (cushin goid).</li> <li>• אי סבילות לקרבוהידרטס אשר עלול להוביל לצורך בטיפול אנטי סכרתי</li> </ul>



- הנך יכול לפתח סוג מתון של סכרת ללא תסמינים ברורים.
- חוסר איזון במלחים או אצירת נוזלים בגוף.
- ירידה ברמות האשלגן בדם, העלולה לגרום לעייפות, בלבול, חולשת שריר או התכווצות שרירים.
- עלייה בתיאבון.
- איבוד חלבונים וחוסר איזון בסידן.
- סחרחורת.
- כאב ראש.
- עלייה בלחץ התוך עיניי, נפיחות בעין, קטרקט.
- ניתוק של הרשתית בעין הגורם ליקויים בראייה.
- בליטה של גלגלי העין כלפי חוץ.
- הידללות של הממברנה בעין, החמרה של דלקת בעין.
- ורטיגו.
- קרע של רקמת שריר הלב, במיוחד אם עברת לאחרונה התקף לב.
- אי ספיקת לב בחולים רגישים ( לבעיות לב).
- יתר לחץ דם.
- חסימה בכלי דם (אמבולזים).
- שיהוקים או קלקול קיבה.
- בחילות או הקאות.
- נפיחות בבטן או כאבי בטן.
- שלשול.
- כיב בוושט.
- פטרת הפה.
- דלקת לבלב הגורמת לכאב בטן.
- כיב קיבה (העלול לדמם).
- הידללות העור, סימנים או חבלות על גבי העור.
- הופעת תסמיני מתיחה.

- אקנה.
- נימים נפוחים בולטים לעין.
- הזעה מוגברת.
- פריחה, גרד.
- שיעור יתר בגוף (במיוחד בנשים).
- דלדול מסת שריר, חולשה או כאבים בשריר.
- דלדול העצם עם עלייה בסיכון לשברים (אוסטיאופורוזיס).
- מחלות בעצמות.
- אי סדירות במחזור או הפסקת המחזור לחלוטין.
- החלמה איטית של פצעים.
- תחושה כללית רעה.
- עלייה במשקל.
- קרע בגיד. תסמינים כוללים שמיעה או תחושה של קרע, כאב חמור, חבלה מיידית, חוסר יכולת לשאת משקל או להשתמש באזור הפגוע.

#### **ילדים ומתבגרים:**

שימוש ממושך בתכשיר זה בילדים ומתבגרים עלול לגרום להאטת הגדילה. אם הנך המטופל או המטפל ואתה חושש מהשפעות התרופה, חזור והיוועץ עם הרופא.

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד. ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

#### **מבוגרים:**

אם הנך מבוגר, הרופא ינטר בקפידה את מצבך, בעת נטילת התכשיר, מכיוון שאתה עשוי לחוות יותר תופעות לוואי.

#### **דיווח תופעות לוואי:**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד

הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/תווית. **תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.** יש לשמור מתחת ל-25°C, לא במקרר.

**לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 6 חודשים.**

יש לאחסן מתחת ל-25°C, לא במקרר. סגור/י היטב ומנע/י חדירת אוויר ורטיבות. זהירות! חומר דליק, הרחק מאש!

גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**איך  
לאחסן את  
התרופה**