

**פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו
לשימוש וטרינרי בלבד**

חייב מרשם רופא וטרינרי

**Cobactan LC
Veterinary**

**1. קובקוטן LC
וטרינרי**

Ointment for
intramammary use

משחה למתן
תוך – עטיני

2. הרכב:

כל מזרק במשקל 8 גרם מכיל:
צפקווינום (כמלח סולפט) 75 mg Cefquinome (as Sulfate)

רשימת חומרים בלתי פעילים מפורטת בסעיף "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה:

משחה למתן תוך עטיני לטיפול בדלקות עטין בפרות נחלבות הנגרמות ע"י:
Staphylococcus Aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae,
Escherichia coli.

וחיידקים אחרים הרגישים ל- cefquinome

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת הצפלוספורינים

4. התוויות נגד:

אין לתת לחיות הידועות כבעלות רגישות יתר לאנטיביוטיקות ממשפחת הצפלוספורינים
או אנטיביוטיקות בטא-לקטם אחרות.
אין להשתמש במגבון לניקוי אם מופיע פצע/חבורה על הפטמה.

5. תופעות לוואי:

במקרים נדירים מאוד, תגובות אנפילקטיות דווחו בבעלי חיים לאחר השימוש בקובקוטן
LC.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על
תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה
לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffect>
Medic@moh.gov.il

6. חיות מטרה:

פרות נחלבות

7. צורת מתן ומינון:

למתן תוך עטיני כל 12 שעות לאחר החליבה במשך שלוש חליבות רצופות.

8. אופן השימוש בתכשיר:

יש לחלוב החוצה בעדינות את תוכן הרבע הנגוע. יש לנקות היטב את אזור הפטמה ואת
פתח התעלה בעזרת מגבון לניקוי, יש לרוקן בעדינות את תוכן המזרק אל תוך תעלת
העטין של הרבע הנגוע. יש לעסות בעדינות את אזור הפטמה והעטין כדי לפזר את
התכשיר לכל האזור הנגוע. יש לחזור על הטיפול כל 12 שעות לאחר החליבה במשך
שלוש חליבות רצופות.

9. זמן המתנה:

בשר - אין לשחוט את הפרות למאכל אדם בזמן הטיפול, ובמשך 48 שעות לאחר הטיפול האחרון. אין להשתמש בחלב למאכל אדם בזמן הטיפול, ולא לאחריו אלא בחלוף 96 שעות מן הטיפול האחרון.

10. אזהרות:

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחיית המטרה
השימוש בקובקטן LC צריך להיות מבוסס, במידת האפשר, על מבחני רגישות. יש לקחת בחשבון תקנות מקומיות (במידה וקיימת) כאשר משתמשים בתרופות אנטי-מיקרוביאליות בחיות משק.
שימוש לא ראוי עלול להגדיל את השכיחות לעמידות לצפקווינום ועלול להפחית את היעילות של הטיפול בצפלוספורינים בעקבות הפוטנציאל לעמידות-צולבת.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
תרופות מסוג פניצילינים או צפלוספורינים עלולים לגרום לתופעות אלרגיות לאחר הזרקה, שאיפה, בליעה, או מגע עם העור. רגישות יתר לפניצילינים עלולה להוביל גם לרגישות לצפלוספורינים ולהיפך. תופעות אלרגיות כאלה עלולות להיות רציניות. על כן יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:
 - אין להשתמש בתכשיר אם ידוע לך שאתה רגיש לחומרים אלו, או אם הורו לך לא לעבוד עם תכשירים אלו.
 - יש להשתמש בתכשיר בזהירות תוך נקיטת כל האמצעים למניעת חשיפתך לתכשיר.
 - אם פיתחת סימני רגישות יתר כגון דלקת בעור, פנה לרופא והראה לו אזהרות אלו. נפיחות בפנים, בשפתיים או בעיניים הם סימנים יותר רציניים של רגישות זו ומצריכים עזרה רפואית דחופה.
 - אין להשתמש שימוש חוזר במזרק. יש להיפטר ממזרק משומש חלקית.
 - רחץ ידיים לאחר השימוש במגבונים לניקוי והשתמש בכפפות אם ידועה רגישות או נחשדת רגישות ל- Isopropyl alcohol.
- היריון והנקה
קובטן LC מיועד לשימוש בזמן הנקה.
- תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות
ידוע שקיימת רגישות-צולבת לצפלוספורינים בחיידקים הרגישים לקבוצת הצפלוספורין.
- מינון יתר
לא נצפו סימפטומים במינון יתר.

11. הוראות אחסון:

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון: לאחסן מתחת ל - 25°C .
- יש להיפטר מהמזרק לאחר השימוש בצורה בטוחה.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/ שאריות התכשיר בתום השימוש:

אין להשליך שאריות של תרופות לביוב או לפח האשפה. שאל את הוטרנר כיצד להשמיד שאריות של תרופות על מנת להגן על הסביבה.

13. מידע נוסף:

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
White soft paraffin, Liquid paraffin

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: משחה שומנית, צמיגה והומוגנית, לבנה עד מעט צהבהבה.
- האריזה מכילה 15 מזרקים המכילים 8 גרם משחה ו-15 מגבונים לניקוי.
- **בעל הרישום וכתובתו:** אינטרווט ישראל בע"מ, א.ת. נווה-נאמן, הוד השרון 45240.
- **שם היצרן וכתובתו:**

Intervet International GmbH,
Feldstrasse 1 A, 85716 Unterschleissheim, Germany

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 18.04.2017
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-92316-72-082



 **Intervet**