

דאביציקלין 500 וטרינרי DABICYCLINE 500 VETERINARY

אבקה מסיסה למתן במי שתיה לשימוש וטרינרי בלבד

הרכב:

כל 1 גרם מכיל Oxytetracycline HCl 500 mg
Citric Acid חומרים בלתי פעילים:

פעילות רפואית:

לטיפול במחלות זיהומים הנגרמים ע"י חיידקים הרגישים לאוקסיטטריצקלין בתרנגולי פטם, תרנגולי הודו ובדגים.

קבוצה תרפויטית:

אנטיביוטיקה רחבת טווח ממשפחת הטטראציקלינים.



מינון והגשה:

לתרנגולי פטם: 40-60 גרם דאביציקלין 500 לכל 100 ליטר מי שתיה במשך 5-7 ימים, כמקור יחיד למי שתיה. בהגשה ללהקה: להמיס את הכמות המתאימה של האבקה בכמות מתאימה של מי השתיה.

לתרנגולי הודו: 100 גרם דאביציקלין 500 לכל 100 ליטר מי שתיה במשך 5-7 ימים. אפשר גם להכין תמיסה מרוכזת יותר. יש להכין תמיסה טרייה כל 12 שעות. לדגים: להגשה ע"י ערבוב במזון. המינון המומלץ: 150 גרם דאביציקלין 500 לכל 1 טון דגים משקל חי. משך הטיפול: 10 ימים. צריכת המזון משתנה בהתאם לטמפרטורת המים. לצורך התאמת המינון לקצב צריכת המזון יש להיוועץ ברופא הוטרינר.

אזהרות:

אין להשתמש במטילות. אם לא חל שיפור תוך 24-48 שעות מתחילת הטיפול, יש לערוך אבחון מחדש. זמני המתנה: יש להפסיק את הטיפול בתרנגולי פטם 4 ימים לפני השחיטה ובתרנגולי הודו 5 ימים לפני השחיטה. זמן המתנה בדגים: 400 ימי מעלה (או 20 יום ב-23°C). מינון יתר עלול לגרום לשאריות בבשר מעבר לזמן ההמתנה.

תופעות לוואי:

עלולים להתפתח זיהומים משניים של פטריות וחיידקים עמידים לתכשיר. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

תגובות בין תרופתיות:

לא תומלץ להשתמש בו זמנית עם תכשירים המכילים פניצילין.

איחסון: מתחת ל-25°C Store below 25°C

מספר פריט: 10-511250

משקל אריזה: 250 גרם

מס' אצווה: 23652145

ת. תפוגה: 08/2019

מס' רישום: 0726291206-03

היצרן ובעל הרישום: אביק תוצרים וטרינריים בע"מ, ת.ד. 489, אזור תעשייה בית שמש.

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר ב 7.10.



אביק תוצרים וטרינריים בע"מ
ת.ד. 489, בית שמש

אבקה
A Division of **Phibro** ישראל

Vr. 02



10-51125 0

3 of 3