

أوكورت

مرهم لتجويف الفم

المادة الفعالة - ٤ غرام من المستحضر يحتوي:

ترامسينولون أسيتونيد ١ ملغم Triamcinolone Acetonide 1 mg
المواد غير الفعالة ومؤذنات (مستحبات الحساسية): انظر الفقرة ٦ "معلومات إضافية".

إن الشرة بمعنى حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا كان لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

إذا شعرت بالغثيان أو القيء، يجب التوجه إلى الطبيب.
الدواء غير موصى به عادة للرضع والأطفال دون عمر ستين. تحت هذا الجيل، يجب التوجه إلى الطبيب.

يجب عليك استعماله بصورة محيضة. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوخه إلى الصيدلي. يجب عليك التوجه إلى الطبيب في حال تفاقم علامات المرض (الأعراض) أو إذا لم تتحسن خلال ٧ أيام.

١. لأي غرض مخصص الدواء؟

أوكورت مخصص لعلاج ماسد ولتخفيض المؤقت من الأعراض المرتبطة بجرح التهابية وتقرّحات في الفم.

الفصيلة العلاجية:
من الكورتيكosterونيدات الاصطناعية للعلاج الموضعي، ذات خواص مضادة للالتهاب، تخفف من الحكة وتساعد على انتفاخ الأوعية الدموية.

٢. قبل استعمال الدواء

- ☒ لا يجوز استعمال الدواء إذا:
 - كنت حساساً (الergicي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.
 - وجدت ثلث فيروسي (مثل الهرپيس البسيط)، فطري و/أو جرثومي في الفم وأو في الجيوب أو سل الجلد وبالآخر عند الاستعمال المطول بالاستهان.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب.
- يتطلب الحذر الخاص عند الاستعمال لدى الأطفال. إن العلاج لدى الأطفال والماهرين يجب أن يتركز هرقلة طبية. يوصى الاستعمال بعدر لدى كبار السن.
- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل استعمال الدواء.
- يجب إيقاف العلاج والتوجه حالاً إلى الطبيب في حال ظهور تهيج موضعي.

٣. قبل العلاج بأوكورت، أحكِ للطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز المناعي.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من السكري.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أحكِ للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

٤. استعمال الدواء والطعام
 يجب استعمال الدواء بعد وجبات الطعام.

١. الحمل والإرضاع
إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، فلا يجوز استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج.

٢. الأطفال

إن سلامة ونجاعة استعمال أوكورت للعلاج لدى الأطفال غير معروفة. من شأن الأطفال أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة من الكبار أثناء العلاج بالمستحضرات التي تحتوي على كورتيكosterونيدات للاستعمال الموضعى، لذلك يجب استعمال الكمية الأصغر المطلوبة. إن العلاج الدائم بالكورتيكosterونيدات قد يلحقضرر بنمو وتطور الأطفال.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك الاستفهام من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية الاعتيادية عادة هي:

٣-٢ مرات في اليوم بعد وجبات الطعام وقبل النوم.

الجرعة الدوائية للأطفال: حسب تعليمات الطبيب.

يُنصح بتناول الماء المستهان لريض وأطفال دون عمر ٤ سنين لأكثر من ٣ أسابيع. بعد تحقيق الشفاء، يجب التوقف عن استعمال المستحضر. يجب مراجعة الطبيب، إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال ٧ أيام.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

إرشادات الاستعمال:

يجبأخذ كمية صغيرة بواسطة العود المخصص لتنظيف الأذنين، وبواسطة الضغط الخفيف ضع المسمار لتفتيحة الجرح.

من المحتمل أن يتخلص الأمر كمية أكبر لتفتيحة جروح أكبر. للحصول على نتائج أفضل، استعمل الكمية المطلوبة فقط من أجل تفتيحة الجرح بطبقة دقيقة.

لا تفوت. إن محاولة بعثة هذا المستحضر قد تؤدي لشعور من الشهوة والساواة وتسبب تفكك المستحضر. على أية حال، بعد الدهن تشکل طبقة مسححة وملساء.

يجب دهن المستحضر قبل النوم ليتمكن المستيرونيد من ملامسة الجرح خلال الليل.

لا يجوز أبداً لهذا الدواء مخصوص للاستعمال في تجويف الفم فقط.

يجب الامتناع عن الشمام مع العينين، في حالة الشمام يجب شطفهما حالاً الفحوص والمتابعة:

يجب إجراء اختبار تشخيصي للحساسية الأنوية بالثماش مع الكورتيكosterونيدات.

خلال فترة العلاج من الجهاز أن يتم توجيهك أيضاً لإجراء فحوص:

- تواجد كورتيزول في البول.

- تفثير الورمون ACTH.

- فحص نشاط الغدة الكظرية.

- تعداد عام بوزينيات.

- فحص ترزيز الجلوکوز في الدم وفي البول.

تلك الفحوص يمكنها أن تساعد في تحديد إصابة في عمل محور الغدد الولائية - النخامية - الكظرية (HPA).

إن الكورتيكosterونيدات للعلاج الموضعي التي تمت في أجهزة الجسم (المتصاص جازاري) تبيّن بشكل علني عمل العكس عمل محور الغدد الولائية - النخامية - الكظرية (HPA). لذلك، يفضل إجراء فحوص دورية لدى المعالجين الذين يتلقون علاجاً لفتره طويلة مهراهم تجويي كورتيكosterونيدات لتحديد أي تبيّن في عمل محور HPA. إذا تم تشخيص تبيّن في عمل المحور HPA، يجب محاولة التوقف عن استعمال الدواء أو تقليله ونبرة الاستعمال.

في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.
من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج بالأدوية"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة خاصة معدّة للتبليغ عن الأعراض الجانبية.

٥. كفالة تخزين الدواء؟

تُجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقى بدون تعليمات مريحة من الطبيب.

يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العلبة الخارجية وعلى الأنبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير في الشهر.

يجب تخزين بدرجات حرارة تحت ٢٥ درجة مئوية، وفي مكان بارد ومظلم. فترة الصلاحية بعد فتح المستحضر: ٣ أشهر.

٦. معلومات إضافية

بالإضافة للمادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً:
Mineral oil, fine gelatin powder, pectin, sodium carboxymethylcellulose, polyethylene.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

مرهم بلون بيج فاتح، ذو مظهر حبيبي.
الدواء مسوق ضمن أنبوية تحوي على ٥ غرام.
المنتاج: تارو فارامونستيكليس إينك، أونتاريو، كندا.
صاحب التسجيل: تارو إنترشينوال م.ض، شارع هكثير ١٤، خليج حينما.
٠٣٦٤٧٦١

تم فحص هذه النشرة والتصديق عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: آب ٢٠١٦

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٠١٦٨٢٤٨٣٠
لتبييض قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكورة. مع هذا
الفدواء معدّ لكلا الجنسين.

إن الأداء الوظيفي للمحور HPA يتحسن عادة بشكل فوري وكامل بعد التوقف عن العلاج.

إذا استعملت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توخي حالاً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت استعمال الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز استعمال جرعة مضاعفة، استعمل الجرعة الدوائية التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الليل! تتحقق من الملصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة! تناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلنة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، إن استعمال أوراكورت قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تقدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية من المحتمل أن تعاني من أي منها.

يجب وقف الاستعمال والتوجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن إذا:

- تطورت حساسية متزايدة في الجلد، يشمل تبيّح الجلد من حول الفم (نادرًا).
- ظهرت تغيرات في نتائج الفحوص المخبرية، أنظر فقرة "الفحوص والمتتابعة".

أعراض جانبية إضافية طفح، حكة - تزول هذه الأعراض عادة خلال زمن قصير بعد فترة تأقلم على المستحضر.

حرقة، جفاف، حوصلات أو تقرّم لم تكن قبل العلاج، التهاب الجلد المحيط بالفم (perioral dermatitis)، التهاب الجلد نتيجة رد فعل أرجي بالثمار (allergic contact dermatitis)، طراوة وإيضاً مخاطية (maceration of the oral mucosa)، التهابات ثانوية وضمور مخاطية الفم (atrophy of the oral mucosa).

الأعراض الجانبية التي يمكن أن تظهر بعد علاج مطول بكورتيكوستيروئيدات للعلاج الموضعي:

متلازمة كوشينج (Cushing's syndrome)، ارتفاع نسب السكر في الدم (hyperglycemia)، بيلةًةً چلوكوزية (glucosuria)، ظهر هذه الأعراض نتيجة تثبيط في عمل المحور HPA (أنظر "الفحوص والمتتابعة").

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية لدى الأطفال ولدى الرّضع:
يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن أيّ عرض جانبي وأيضاً عن أي دواء إضافي يعطى للطفل!
إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر