



- كنت تهمن بالقرب من العينين أو على الجفنين، نظرًا لأنه قد يحدث كاتاراكت أو جلوكوما في حال دخول المرحم / الكريم للعين مواراً وتكراراً.

• إذا لم يوصي الطبيب، يجب الانتباه على الصمام المسود في المنطقة المصابة، بما في ذلك حفاظ الأطفال. هذه الصمامات تسهل من عبور المركب الفعال عبر الجلد، وبذلك قد تستعمل بالخطأ كمية أكبر مما ينبغي من الدواء.

• لا يجوز استخدام صمامات أو كمامات على الأطفال أو على الوجه، في مكان تم فيه دهن المرحم / الكريم.

• إن الاستعمال لدى الرضع والاطفال أو على الوجه يجب أن تكون محدوداً له أيام.

• يتطلب تحفيز الحذر الخاص عند الاستعمال لدى الأطفال والمرأة. إن الاستعمال في هذه الأعمار يجب أن يقتصر بمتابعة طبية.

• إذا كنت تهمن لای طعام أو لای دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل استخدام الدواء.

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان واحد مما ذكر ينطبق عليك، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل استعمال هذا الدواء.

٤. الأدوية الأخرى وبيتاكورتين

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، أخذ للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالطبع إذا كنت تتناول الأدوية روتينياً، ابتداً كثراً أو إذا كنت تستعمل مستحضر / مستحضر آخر / أخرى للإستعمال الخارجي.

٥. الحمل، الإرضاع والخصوبة

• لا يجوز استخدام الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج وذلك إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة. تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل.

٦. معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء

بيتاكورتين كريم يحتوي على كلوروكربنول الذي قد يؤدي لردود فعل حساسية وعلى سيفوتستيريل الكحول الذي قد يؤدي لردود فعل حساسية في الجلد (مثل التهاب الجلد التماسي).

٣. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الاستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا، عليك الإستنجاج من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددها من قبل الطبيب فقط.

٤. المقادير الدوائية الاعتيادية:

• دهن بيتاكورتين مرة أو مرتين في اليوم. من الجائز أن يتم تقليل المقدار الدوائي عندما يبدأ وضد الجلد بالختن.

• المرحم / الكريم مخصوصان للإستعمال على جلدك فقط.

• لا يجوز إستعمال كمية أكبر من الكمية الموصوفة لك وكذلك لا يجوز تجاوز وتيرة وفتره العلاج الموصوف بها.

• لا يجوز إستعمال على مساحات كبيرة من الجسم لفترة زمنية طويلة (مثلاً كل يوم لفترة أسبوع كثيرة أو أشهر) بدون تعليمات من الطبيب.

• الجرام / سبيكة مثبتات التلوث تحب طروف الحرارة والرطوبة تحت الضمامات أو العصائب، لهذا يجب دائمًا تنظيف الجلد قبل تضمينه بضماد نظيف.

• إذا كنت تهمن المرحم / الكريم لشخص آخر، احرص على غسل اليدين بعد الإستعمال أو إرتدى قفازات بلاستيكية أحذية الإستعمال.

• إذا لم تتحسن مشكلة الجلد خلال أسبوعين، استشر الطبيب.

لا يجوز البالغ.

للإستعمال الخارجي فقط.

٥. إرشادات بخصوص دهن المرحم / الكريم

(١) إغسل يديك.

(٢) ادهن طبق رقيقة على المناطق المصابة ودلك بلطف حتى يتم امتصاصها بالكامل داخل الجلد.

(٣) أغسل يديك ثانية بعد إستعمال المرحم / الكريم، إلا إذا كان من المفترض أن تهمن المرحم / الكريم على راحتي يديك كجزء من العلاج.

نشرة للمستهلك بمحوج انتلملة الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

بيتاكورتين

كريم / مرحم

المادة الفعالة وتركيزها:

بيتاميتازون (كاليلات) ٠.١%
Betamethasone (as 17-valerate) ٠.١%

المواد غير الفعالة: «علوات إضافية».

اقرأ النشرة تمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إن توفرت لديك أسلحة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذه الدواء من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

١. لأي غرض مخصص الدواء؟

يُستخدم بيتاكورتين للتقليل من الالتهاب والحكمة في مشاكل جلدية معينة، مثل إكزيما (مرض جلدي)، الصدفية (psoriasis) والتهاب الجلد (dermatitis) لدى الكبار والأطفال فوق عمر سنة.

الفصيلة العلاجية: من الكورتيكosteroides وثيادات القوية.

٢. قبل إستعمال الدواء

١. لا يجوز إستعمال الدواء:

• إذا وجدت لديك حساسية مفرطة (البرحجي) لبيتاميتازون فاليرات أو وكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء بيتاكورتين (كما هو مفصل في الفقرة ٦).

• لدى الأطفال دون عمر سنة.

• على الأنسجة المخاطية (فتحة الشرج، الأعضاء التناسلية، حول الفم / الأنف).

• لعلاج آية واحدة من المشاكل الجلدية التالية، لأن الدواء قد يؤدي إلى تفاقمه:

- حب الشباب (acne)

- إحمرار شديد في جلد الأنف وما حوله (العد العوردي rosacea).

- طفح بقع حمراء حول الفم.

- تلوثات جلدية مصدرها فيروس (مثل العقبولة / فيرس، جدرى الماء)، يكتيرى (مثل سل الجلد) وفطري (إذا كان التلوث معالجاً في نفس الوقت بدواء مضاد للتلوك).

- حكة في الجلد على خلفية تلوثية.

لا يجوز الإستعمال إذا ينطبق عليه واحد مما ذكر، إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل إستعمال بيتاكورتين.

٣. تدابير خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

• تحدث مع الطبيب او الصيدلي الخاص بك قبل حساسية لستيرويد آخر.

• حدث لديك في الماضي رد حساسية لستيرويد آخر.

• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد، الكلية أو الجهاز المناعي.

• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض السكري، الpileokoma أو كاتاراكت.

• كنت تعاني من الصدفية، سيرغط الطبيب في روئينك في أوقات متقاربة أكثر.

• كنت تستعمل الدواء لفترة زمنية في الرجل، لأن ذلك تكون معرض لخطورة أكبر لحدوث رد فعل حساسية موضعية أو لحدوث تلوث.

• كنت تهمن على مساحة واسعة من الجلد، جروح مفتوحة أو ملوثة.

• كنت تهمن على جلد مشقة، داخل طيات الجلد.

• كنت تهمن على جلد رقيق مثل الوجه أو على الأطفال نظرًا لأن جلدتهم أكثر رقة مقارنة بالكبار ونتيجة لذلك قد تختص كميات أكبر.

للاطفال

- لا يجوز الاستعمال لدى اطفال دون عمر ستة.
- فترات العلاج لدى الاطفال يجب الا تتجاوز ٥ ايام (خاصة ليس في المناطق المغطاة بالطفح) الا اذا اوصى الطبيب باستعمال المرهم / الكريم لفتره اطول.
- على الوالدين ابلاغ الطبيب المعالج عن اي عرض جانبى وكذلك عن اي دواء اضافي يعطى للطفل ؟ انظر الفقرة ؟ الاعراض الجانبية المفصلة.

(psoriasis)

- إذا كان لديك افات سميكة المسدبة في المرفقين او في الركبتين، من الجائز أن يقتصر الطبيب دهن المرهم / الكريم تحت ضماد مسدود. يوضع الضماد فقط في الليل كي يساعد المرهم / الكريم على بดء التئير. بعد فترة قصيرة، ادهن المرهم / الكريم بشكل عادي.

إذا كنت تذهب بيتاكورتين علىوجه

- يجب دهن المرهم / الكريم على الوجه حسب تعليمات الطبيب فقط. لا يجوز الاستعمال لفتره تزيد عن ٤ ايام، ظهرت آثار جلد الوجه بصبغه سهولة. لا يجوز السماح المرهم / الكريم بالدخول للعينين. في حالة التماس مع العينين يجب غسلهما جيداً بالماء.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به. هذا الأمر هاماً بالخصوص بعلاج الأطفال.

إذا استعملت بالخطأ قدرة دوائية أكبر

- إذا برهنت كمية زائدة عن الدواد أو إذا بلغت بالخطأ من المرهم / الكريم، فانت قد تضررت. حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء.

إذا نسيت استخدام الدواء

- إذا نسيت دهن هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب دهنه لحظة تذكره. إذا كان الوقت قريباً لموعده، يجب دهن القream الذي نسيت الدهن به، انتظر حتى بلوغ هذا الموعد.
- يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن استخدام الدواء

- إذا توقفت بيتاكورتين بشكل دائم، تحدث مع طبيبك قبل أن تتوقف عن العلاج بالدواء. يمكن أن تتفاقم حالتك إذا توقفت عن العلاج بشكل مفاجئ.
- لا يجوز تناول أدوية أخرى في الغتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، وضع النظارات الطبية إذا لم يتم ذلك.
- إذا توقفت لديك أسلطة إضافية، يخصوص استخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(؟) الاعراض الجانبية

- كما يكل دواء، إن استعمال بيتاكورتين قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين.
- لا تندفع من قائمة الاعراض الجانبية، من الجائز احتاجي أي منها.

بجب التوقف عن الاستعمال ومراجعة الطبيب حالاً إذا:

- إنكشفت أن وضع جيليك ينقاوم، ظور لديك طفح عام أو إذا انتفخ جلدك أثناء العلاج.
- من الجائز أن حساسية بيتاكورتين لديك تؤثر أو أنه بحاجة لعلاج آخر.
- لديك صدفيه (Psoriasis) (؟) وتتطور لديك نتوءات متراقبة بقع تتحف الجلد هذا الأمر يمكن أن يحدث في أحياناً نادرة جداً خلال العلاج أو بعده حيث يعرف باسم الصدفيه البترية.
- تطور ثلوث.

اعراض جانبية إضافية:

- شعور بحرارة، حرقة، الم، تهيج أو حكة في مكان دهن المرهم / الكريم، عادة تزول هذه الاعراض خلال فترة وجبرة بعد فترة التمدد على المستحضر لكن في حال عدم زوالها أو إذا تغير آخر إلى الأسوأ في الجلد يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب.
- اعراض جانبية نادرة جداً من شأنها أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص(لكنها شائعة أكثر لدى الأطفال والرضع:
- زيادة خلورة حدوث ثلوث

