

## ציקלודרם קרם / תמייסה

יש לשמר על יבש במקומות הנגוע. יש לרוחץ האזור הנגע לפני כל שימוש בתווצה. בין טיפול לאנטיביוטיק, או אבקה נגד פטריות כדי ליבש את המקים. אם הטיפול הוא ברולילין, יש להקפיד על הרציה יודית יבוש במיוחד בין הבונאות. רצוי להשתמש בגוררים מוגנתה; יש להימנע מגירת גורמים חמירים או מחומרים סינטטיים. רצוי להחליפם במספר פעמיים ביום (לפי כמות החזקה). בעקבות המתאמים מומלץ לנעל סדרלים ללא גורביים. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל יד מן התווצה, פנה מיד לחדר מין של בית-חולים, ובaba אוירית התווצה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בוקט התווצה והמנה בכל פעם שהין נטל תעופה. הרוכב משקפיים אם הנין דקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתווצה, הייעוץ הרפואי או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בציקלודרם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל

תibal להקאה או רשותת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מכך מוחן.

ש פונת לרופא בהקדם האפשרי במרקמים בהם מתרפה גירוי מקומי, דלקת או פריחה במקום היטפון.

אם אחת מתופעות הלוואי מהירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזוכרה בעבר, עיר להתייעץ עם הרופא.

### דיזוז תופעות לוואי

ניתן לדוחו על תופעות לוואי למשרד הבריאותות באמצעות לחיצה על הקישור "דיזוז תופעות לוואי" עקי בטיפול רפואי" שמצוא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס מהקון לדוחו על תופעות לוואי, או ע"כ כנסיה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

ניתן גם לדוחו על תופעות לוואי לדוא"ל: [safety@trima.co.il](mailto:safety@trima.co.il)

### 5. אך לאחסן את התווצה?

- מען הרעליה! התווצה זו וכל התווצה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי קרמן העטללה. אל גברום לנקה לא לזרואה מופשטת מהרopia.
- אין להשמש בתווצה אחריה תאריך התגופה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/תווצה. תאריך התגופה מתייחס ליום האחרון של אותו חדש.
- ב溫室 קירור מוחתך ל-25°C.
- ציקלודרם תמייסה – אין להಡיל סיגריה או להיחשף לאש עד ליבש מוחלט של התכשיר.

### 6. מידע נוספים

- נסוך על החומר הפעיל, התווצה מכילה גם את החומרים הבולט-פעליים הבאים:  
קרם:

2-Octyldecanol, Liquid paraffin, Stearyl alcohol, Cetyl alcohol, Cocamide DEA, Polysorbate 60, Myristyl alcohol, Sorbitan monostearate, Benzyl alcohol, Lactic acid, Purified water.

תמייסה: Polyethylene glycol 400, Propylene glycol, Isopropanol, Lactic acid, Purified water.

#### - כיצד נאותת התווצה ונמה האריזה?

- כדי נאותת התווצה על ציקלודרם קרם מכילה שיפורות ובתוכה 15 גרם של קרם בצעע לב-שנהה. כל אריזה של ציקלודרם תמייסה מכילה בקודות ובתוכה 30 מ"ל של גול חרס צבע עד צהבהב.
- יצ'ן ובעל הרישום: תרימה, תוצרת רפואה ישראליים מעבorthot בע"מ, מעברות 4023000, ישראל.
- עלון זה נבדך ואשר ע"י משרד הבריאות בתאריך: אפריל 2017.
- מס' רישום התווצה בנקודות התווצה הממלכתי במשרד הבריאות: 136.35.28781.00, ציקלודרם תמייסה.
- ציקלודרם קרם: 062.23.26751.00. עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התווצה מיועדת לשני המינים.

חומר פעיל: Ciclopirox olamine 1%, ציקלופירוקס אולמין 1%.

חומרים בתלי פיעלים בתכשיר – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העalon עד סופו בטรม תשמש בתווצה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התווצה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו גורמת לנזקים לאם נראת או לרוקח או גורמת היפואידומה.

ביטחונות השימוש בתווצה בילדים מתחת לגיל 10 לא הוכח.

אם לא שיפור במצבר תוך 30 ימים יש לפנות לרופא.

### 1. למה מייעצת התווצה?

ఈ תכשיר אנטיטריפטי ריחב טוחנו לטיפול מקומי בפרטת העור.

### 2. كيف שימוש בתווצה?

הן רג'יש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים שמכליה התווצה (ראה

סעיף 6).

**3. אחריות מיוחדות בתווצה מה:** אין להشمש בתווצה מבלי להיוועץ ברופא לפני הinitial treatment אם הנין בהריין, או מניקה.

**4. אדרחות נסוכות:** אם הנין רישי לחום קלשו או לתהופה כלשהיא, עליך להודיע על-כך לרופא לפני השימוש בציקלודרם.

• אין להشمש בתהובות אוטומות.

• קרם ציקלודרם יכול פגיעה אשר עלול לגרום לדיפת קונדומים לטקס, שכן יש להימנע מלהוביל בין שימוש בקרם לבין קונדומים אלו.

אם אתה לקלוק, או אם לך קלה לאחורונה, תרופות אחותות כולן תרופות ללא מושם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח.

### 5. הרוון ונמה

אם הנין בהריין או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתווצה.

### 6. עישון

ציקלודרם תמייסה – אין להಡיל סיגריה או להיחשף לאש עד ליבש מוחלט של התכשיר.

### 3. כיצד תשמש בתווצה?

תמנד' יש להشمש לתווצה לפני הרופא העיל. לבודק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח באשר לאוון השימוש.

המיון ואופן בטיפול יקבע על ידי הרופא בלבד. יש להתמודד בטיפול כי שהומלץ על ידי הרופא.

בהעדר הרוואה אחרמת מהרופא או הרופאות השינויים: למראה את הקרם או להתייחס מהתמייסה על המקומות הנגוע ולבתוח ולסוטות בע"מ, פג'מיים בע"מ ובור' וערב. יש להמשיך בטיפול עד הульמות סימני הפרטורה ושבוע עד שבוחניים נסוכים למניעת הופעתם מחדש.

אריתצ' ציקלודרם תמייסה מכילה מנצח נסוף המיעוד לשימוש במילדי השהרופה העיל.

אם לא שיפור במצבר תוך 30 ימים יש לפנות לרופא.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אין לבולו, לשימוש חיצובי בלבד. יש להימנע מגע עם העיניים. אין מיעוד לשימוש גינגל.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא. לחות מעודדת את צמיחת הפטיריות, וכן

