

הודעה על החמרה (מידע בטיחות) בעלון לצרכן
(מעודכן 05.2013)

תאריך אישור העלון: 08.2017

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום:

Kaletra 200 mg/50 mg tablets, 137-96-31542-00, 137-96-31542-01

Kaletra 100 mg/25 mg tablets, 141-07-32003-00

Kaletra Oral Solution, 122-05-30210-00

AbbVie Biopharmaceuticals Ltd. : שם בעל הרישום

טופס זה מיועד לפרוט החמרות בלבד !

החמרות המבוקשות		
טקסט חדש	טקסט נוכחי	פרק בעלון
<p>.....</p> <p><u>- דרונדרון (dronedarone) - לטיפול</u> <u>בפרפור פרוזדורים לאחר השבת מקצב</u> <u>לב תקין.</u></p> <p><u>- אלבאסווייר/גראזופרוויר</u> <u>(elbasvir/grazoprevir) - לטיפול</u> <u>בדלקת כבד נגיפית</u></p> <p>.....</p> <p><u>- לוראסידון, פימוזיד (lurasidone,</u> <u>pimozide) - לטיפול בסכיזופרניה</u></p> <p><u>- רנולזין (ranolazine) - לטיפול בתעוקת</u> <u>לב כרונית</u></p>	<p>-----</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>-----</p>	<p>לפני השימוש בתרופה</p>
<p>במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:</p> <p>.....</p> <p><u>- בדאקווילין (Bedaquiline)</u></p> <p>.....</p> <p><u>- בודסוניד (Budesonide), דקסאמתאזון</u> <u>(dexamethasone), פלוטיקאזון</u> <u>(fluticasone), פרדניזון</u> <u>(prednisone), טריאמינילון</u> <u>(triamcinolone) סטרואידים-כגון:</u> <u>Dexamethasone, Fluticasone,</u> <u>budesonide, prednisone, ethinyl-</u> <u>oestradiol</u></p> <p><u>- איסווקונאזוניום (Isavuconazonium)</u></p>	<p>במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>סטרואידים Dexamethasone, כגון; Fluticasone, budesonide, prednisone, ethinyl (oestradiol</p> <p>-----</p>	<p>אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:</p>

<p>.....</p> <p>– אומביטאסוויר/פאראטאפרווייר/ריטובויר ודאסאבוויר (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir</p> <p>.....</p> <p>– ונטוקלקס (venetoclax)</p>	<p>.....</p> <p>-----</p> <p>.....</p> <p>-----</p>	
<p>.....</p> <p>אין ליטול קלטרה טבליות בפעם אחת ביום אם את בהריון. אין ליטול קלטרה תמיסה אם את בהריון.</p> <p>.....</p> <p>אין לתת לילדים קלטרה בפעם אחת ביום.</p>	<p>.....</p> <p>-----</p> <p>.....</p> <p>-----</p>	<p>כיצד תשתמש/י בתרופה?</p>
<p>.....</p> <p>תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות (שכיחות של עד ל- 1:10 משתמשים):</p> <p>.....</p> <p>תגובות אלרגיות, כולל חרלת/סרפדת ודלקת בפה</p> <p>.....</p> <p>קלטרה עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, הכוללות:</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • תגובות אלרגיות. פריחות בעור, חלקן חמורות, עלולות להופיע במטופלים הנוטלים קלטרה. ספר לרופא שלך אם היתה לך פריחה כאשר נטלת תרופה אחרת לטיפול בזיהום HIV או אם אתה מבחין בכל פריחה כלשהיא בעור בזמן נטילת קלטרה. 	<p>.....</p> <p>תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות (שכיחות של עד ל- 1:10 משתמשים):</p> <p>.....</p> <p>תגובות אלרגיות, כולל חרלת/סרפדת ודלקת בפה</p> <p>.....</p>	<p>תופעות לוואי</p>

הודעה על החמרה (מידע בטיחות) בעלון לרופא
(מעודכן 05.2013)

תאריך אישור העלון : 08.2017

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום :

Kaletra 200 mg/50 mg tablets, 137-96-31542-00, 137-96-31542-01

Kaletra 100 mg/25 mg tablets, 141-07-32003-00

Kaletra Oral Solution, 122-05-30210-00**שם בעל הרישום : AbbVie Biopharmaceuticals Ltd.****טופס זה מיועד לפרוט החמרות בלבד !**

החמרות המבוקשות

מעוצב: גופן: 8 נק', גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

מעוצב: גופן: (ברירת מחדל) semiT גופן: 8, namoR weN גופן עבר עברית ושפות אחרות: 8, namoR weN semiT נק', סמן

טקסט חדש	טקסט נוכחי	פרק בעלון																																										
		2 DOSAGE AND ADMINISTRATION																																										
<p>Table 387. Drugs That Are Contraindicated With with KALETRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Drug Class</th> <th>Drugs Within Class That Are Contraindicated With KALETRA</th> <th>Clinical Comments:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antianginal</td> <td>Ranolazine</td> <td>Potential for serious and/or life-threatening reactions</td> </tr> <tr> <td>Antiarrhythmic</td> <td>Dronedarone</td> <td>Potential for cardiac arrhythmias.</td> </tr> <tr> <td>Anti-gout</td> <td>Colchicine</td> <td>Potential for serious and/or life-threatening reactions in patients with renal and/or hepatic impairment.</td> </tr> <tr> <td>Antimycobacterial</td> <td>Rifampin</td> <td>May lead to loss of virologic response and possible resistance to KALETRA or to the class of protease inhibitors or other co-administered antiretroviral agents. <i>[see DRUG INTERACTIONS (7)H]</i></td> </tr> <tr> <td>Antipsychotic</td> <td>Lurasidone</td> <td>Potential for serious and/or life-threatening reactions.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pimozide</td> <td>Potential for serious and/or life-threatening reactions such as cardiac arrhythmias.</td> </tr> <tr> <td>Ergot Derivatives</td> <td>Dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine</td> <td>Potential for acute ergot toxicity characterized by peripheral vasospasm and ischemia of the extremities and other tissues.</td> </tr> <tr> <td>GI Motility Agent</td> <td>Cisapride</td> <td>Potential for cardiac arrhythmias.</td> </tr> <tr> <td>Hepatitis C direct acting</td> <td>Elbasvir/grazoprevir</td> <td>Potential for the increased risk of alanine transaminase (ALT) elevations.</td> </tr> </tbody> </table>	Drug Class	Drugs Within Class That Are Contraindicated With KALETRA	Clinical Comments:	Antianginal	Ranolazine	Potential for serious and/or life-threatening reactions	Antiarrhythmic	Dronedarone	Potential for cardiac arrhythmias.	Anti-gout	Colchicine	Potential for serious and/or life-threatening reactions in patients with renal and/or hepatic impairment.	Antimycobacterial	Rifampin	May lead to loss of virologic response and possible resistance to KALETRA or to the class of protease inhibitors or other co-administered antiretroviral agents. <i>[see DRUG INTERACTIONS (7)H]</i>	Antipsychotic	Lurasidone	Potential for serious and/or life-threatening reactions.		Pimozide	Potential for serious and/or life-threatening reactions such as cardiac arrhythmias.	Ergot Derivatives	Dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine	Potential for acute ergot toxicity characterized by peripheral vasospasm and ischemia of the extremities and other tissues.	GI Motility Agent	Cisapride	Potential for cardiac arrhythmias.	Hepatitis C direct acting	Elbasvir/grazoprevir	Potential for the increased risk of alanine transaminase (ALT) elevations.	<p>Table 3. Drugs That Are Contraindicated With KALETRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Drug Class</th> <th>Drugs Within Class That Are Contraindicated With KALETRA</th> <th>Clinical comments:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antimycobacterial</td> <td>Rifampin</td> <td>May lead to loss of virologic response and possible resistance to KALETRA or to the class of protease inhibitors or other co-administered antiretroviral agents. <i>[see DRUG INTERACTIONS (7)]</i></td> </tr> <tr> <td>Ergot Derivatives</td> <td>Dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine</td> <td>Potential for acute ergot toxicity characterized by peripheral vasospasm and ischemia of the extremities and other tissues.</td> </tr> <tr> <td>GI motility agent</td> <td>Cisapride</td> <td>Potential for cardiac arrhythmias.</td> </tr> </tbody> </table>	Drug Class	Drugs Within Class That Are Contraindicated With KALETRA	Clinical comments:	Antimycobacterial	Rifampin	May lead to loss of virologic response and possible resistance to KALETRA or to the class of protease inhibitors or other co-administered antiretroviral agents. <i>[see DRUG INTERACTIONS (7)]</i>	Ergot Derivatives	Dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine	Potential for acute ergot toxicity characterized by peripheral vasospasm and ischemia of the extremities and other tissues.	GI motility agent	Cisapride	Potential for cardiac arrhythmias.	4. Contraindications
Drug Class	Drugs Within Class That Are Contraindicated With KALETRA	Clinical Comments:																																										
Antianginal	Ranolazine	Potential for serious and/or life-threatening reactions																																										
Antiarrhythmic	Dronedarone	Potential for cardiac arrhythmias.																																										
Anti-gout	Colchicine	Potential for serious and/or life-threatening reactions in patients with renal and/or hepatic impairment.																																										
Antimycobacterial	Rifampin	May lead to loss of virologic response and possible resistance to KALETRA or to the class of protease inhibitors or other co-administered antiretroviral agents. <i>[see DRUG INTERACTIONS (7)H]</i>																																										
Antipsychotic	Lurasidone	Potential for serious and/or life-threatening reactions.																																										
	Pimozide	Potential for serious and/or life-threatening reactions such as cardiac arrhythmias.																																										
Ergot Derivatives	Dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine	Potential for acute ergot toxicity characterized by peripheral vasospasm and ischemia of the extremities and other tissues.																																										
GI Motility Agent	Cisapride	Potential for cardiac arrhythmias.																																										
Hepatitis C direct acting	Elbasvir/grazoprevir	Potential for the increased risk of alanine transaminase (ALT) elevations.																																										
Drug Class	Drugs Within Class That Are Contraindicated With KALETRA	Clinical comments:																																										
Antimycobacterial	Rifampin	May lead to loss of virologic response and possible resistance to KALETRA or to the class of protease inhibitors or other co-administered antiretroviral agents. <i>[see DRUG INTERACTIONS (7)]</i>																																										
Ergot Derivatives	Dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, methylergonovine	Potential for acute ergot toxicity characterized by peripheral vasospasm and ischemia of the extremities and other tissues.																																										
GI motility agent	Cisapride	Potential for cardiac arrhythmias.																																										

	<p>dosing interval of nilotinib and dasatinib may be necessary for patients requiring co-administration with strong CYP3A inhibitors such as KALETRA. Please refer to the nilotinib and dasatinib prescribing information for dosing instructions.</p> <p>Coadministration of venetoclax and KALETRA may increase the risk of tumor lysis syndrome. Refer to the venetoclax prescribing information for dosing instructions.</p>		<p>CYP3A inhibitors such as KALETRA. Please refer to the nilotinib and dasatinib prescribing information for dosing instructions.</p>	
<p>מעוצב:סמן</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p> <p>מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי</p>	<p>Antifungals: ketoconazole*, itraconazole, voriconazole, isavuconazonium sulfate*</p> <p>↑ ketoconazole ↑ itraconazole ↓ voriconazole ↑ isavuconazonium sulfate*</p> <p>High doses of ketoconazole (>200 mg/day) or itraconazole (> 200 mg/day) are not recommended.</p> <p>Co-administration-The coadministration of voriconazole with-and KALETRA has-not-been studied. However, a study has-been shown that administration of voriconazole with ritonavir 100 mg every 12 hours decreased voriconazole steady-state AUC by an average of 39%. therefore, co-administration of KALETRA and voriconazole may result in decreased voriconazole concentrations and the potential for decreased voriconazole effectiveness and-should be avoided, unless an assessment of the benefit/risk to the patient justifies the use of voriconazole.</p> <p>Isavuconazonium and Kaletra should be coadministered with caution. Otherwise, alternative-Alternative</p>	<p>Antifungals: ketoconazole*, itraconazole, voriconazole</p> <p>↑ ketoconazole ↑ itraconazole ↓ Voriconazole</p>	<p>High doses of ketoconazole (>200 mg/day) or itraconazole (> 200 mg/day) are not recommended.</p> <p>Co-administration of voriconazole with KALETRA has not been studied. However, a study has been shown that administration of voriconazole with ritonavir 100 mg every 12 hours decreased voriconazole steady-state AUC by an average of 39%. therefore, co-administration of KALETRA and voriconazole may result in decreased voriconazole concentrations and the potential for decreased voriconazole effectiveness and should be avoided, unless an assessment of the benefit/risk to the patient justifies the use of voriconazole. Otherwise, alternative antifungal therapies should be considered in these patients.</p>	

מעוצב:סמן

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT ונפוח עבור עברית 8, namoR weN ונפוח אחרות: semiT 8, namoR weN נקי

מעוצב:סמן

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT, namoR weN 8, namoR weN semiT: ושפות אחרות: נק', גופן עבור עברית

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT, namoR weN 8, namoR weN semiT: ושפות אחרות: נק', גופן עבור עברית

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT, namoR weN 8, namoR weN semiT: ושפות אחרות: נק', גופן עבור עברית

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT, namoR weN 8, namoR weN semiT: ושפות אחרות: נק', סמן

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT, namoR weN 8, namoR weN semiT: ושפות אחרות: נק', גופן עבור עברית

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT, namoR weN 8, namoR weN semiT: ושפות אחרות: נק', גופן עבור עברית

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT, namoR weN 8, namoR weN semiT: ושפות אחרות: נק', גופן עבור עברית

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT, namoR weN 8, namoR weN semiT: ושפות אחרות: נק', גופן עבור עברית

מעוצב:גופן: (ברירת מחדל) semiT, namoR weN 8, namoR weN semiT: ושפות אחרות: נק', סמן

		<p>been co-administered with fluticasone propionate or budesonide.</p> <p>Coadministration with oral dexamethasone or other systemic corticosteroids that induce CYP3A may result in loss of therapeutic effect and development of resistance to lopinavir. Consider alternative corticosteroids.</p> <p>Coadministration with corticosteroids whose exposures are significantly increased by strong CYP3A inhibitors can increase the risk for Cushing's syndrome and adrenal suppression.</p> <p>Alternative corticosteroids including beclomethasone and prednisolone (whose PK and/or PD are less affected by strong CYP3A inhibitors relative to other studied steroids) should be considered, particularly for long-term use.</p>				
Dihydropyridine Calcium Channel Blockers: e.g., felodipine, nifedipine, nicardipine	↑ dihydropyridine calcium channel blockers	Caution is warranted and clinical monitoring of patients is recommended, and a dose reduction of the dihydropyridine calcium channel blocker may be considered.	Dihydropyridine Calcium Channel Blockers: e.g., felodipine, nifedipine, nicardipine	↑ dihydropyridine calcium channel blockers	Caution is warranted and clinical monitoring of patients is recommended.	
HCV- Protease Inhibitor	↓ lopinavir	For contraindicated hepatitis C direct acting antivirals. [see Contraindications (4)].	HCV- Protease Inhibitor	↓ lopinavir	It is not recommended to co-administer Kaletra-KALETRA and boceprevir. Concomitant administration of KALETRA and boceprevir reduced boceprevir, lopinavir and ritonavir steady-state exposure [see Clinical Pharmacology (12.3)].	
Hepatitis C direct acting antivirals: boceprevir* simeprevir	↓ boceprevir ↓ ritonavir ↑ simeprevir ↑ ombitasvir		Hepatitis C direct acting antivirals: boceprevir* simeprevir	↓ boceprevir ↓ ritonavir ↑ simeprevir ↑ ombitasvir		
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir*	↑ paritaprevir ↑ ritonavir ↔ dasabuvir		ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir*	↑ paritaprevir ↑ ritonavir ↔ dasabuvir		

<p>מעוצב: גופן (ברירת מחדל) semiT גופן עבור עברית namoR weN 8, נק', ושפות אחרות: namoR weN semiT 8, נק'</p>			<p>tonavir, steady-state exposure [see Clinical Pharmacology (12.3)] and dasabuvir.</p>			
<p>מעוצב: סמן</p>						
<p>מעוצב: גופן (ברירת מחדל) semiT גופן עבור עברית namoR weN 8, נק', ושפות אחרות: namoR weN semiT 8, נק'</p>	<p>Immunosuppressants: ↑ immunosuppressants e.g., cyclosporine, tacrolimus, sirolimus rapamycin</p>		<p>Therapeutic concentration monitoring is recommended for immunosuppressant agents when co-administered with KALETRA.</p>			
<p>מעוצב: גופן (ברירת מחדל) semiT גופן עבור עברית namoR weN 8, נק', ושפות אחרות: namoR weN semiT 8, נק'</p>						
<p>מעוצב: גופן (ברירת מחדל) semiT גופן עבור עברית namoR weN 8, נק', ושפות אחרות: namoR weN semiT 8, נק'</p>						
<p>מעוצב: גופן (ברירת מחדל) semiT גופן עבור עברית namoR weN 8, נק', ושפות אחרות: namoR weN semiT 8, נק'</p>						
<p>מעוצב: גופן (ברירת מחדל) semiT גופן עבור עברית namoR weN 8, נק', ושפות אחרות: namoR weN semiT 8, נק'</p>						
<p>מעוצב: גופן (ברירת מחדל) semiT גופן עבור עברית namoR weN 8, נק', ושפות אחרות: namoR weN semiT 8, נק'</p>						

.....