

פינק ביסמות טבליות לעיסה 262 מ"ג

פינק ביסמות תרחיף 262.5 מ"ג/15 מ"ל

כל טבילה מכילה:

ביסמות אבסולסיליט 262 מ"ג

כל 15 מ"ל ורחיף מכלים:

ביסמות אבסולסיליט 262.5 מ"ג

ביסמות אבסולסיליט 262.5 mg

* חומרים בלתי פעילים בתכשיר - ראה

סעיף 6 לעיל.

█ אם אתה לוקח או לך תחת לאחרונה
התופעות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ומוספי תזונה, ספר עליך או לרוקח. בימייד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח אספירין וסליצילטים, תרופות נגד קריישטם, תרופות גונדיים, פרגזודין או סולפינפריזון, טריציקלים, תרופות לסתורתיות, תרופות לדלקת מפרקים או ארטיריטיס).

█ שימוש בתרופת ומזהן: ניתן ליטול את התופעה עם או בלי מזוין.

█ שימוש בתרופת וצrichtת אלכוהול:
אין לשותות ייונת או משקאות חריפים בתפקידו הטיפול עם התופעה.

█ הרין והנקה: אם הירך בהריון או מניניה, יש להזיע ברופא לפני השימוש בתרופת.

█ מידע חשוב על חלק מהמריכבים של התופעה: התופעה מכילה סליצילט. אין להשתמש בה אם הירך או גוף סולוציליטים. ככל אספירין, או אם הירך לוקח תכשירים אחרים המכילים סליצילט.

█ כיצד תשתמש בתרופת?
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בסות.

█ המיןון המקורי דרך כל הוא:
פינק ביסמות, טבליות לעיסה

█ אין להשתמש בתרופות אם:
• אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התופעה.

• אין להשתמש בילדים ובמבוגרים עד גיל 20 עם מחלות מסוימות בחום כדוגמת שפעת ואבעבועות רוח מהקש למסמנות רין.

• התופעה מכילה סליצילט. אין להשתמש בתרופת אם הירך או גוף סולוציליטים (כולל אספירין), או אם הירך נוטל תכשירים אחרים המכילים סליצילט.

• אתה סובל מכיב קיבה (אולקוז), דימויים, כאה דימת או שחורה.

█ אחריות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופת:
• לפני תחילת הטיפול בפינק ביסמות, ספר לרופא או:

הירך בהריון או מניניה.

5. איך לאחסן את התופעה?

- מגע הרעליה? זול התופעה זו ולן תופעה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים / או תינוקות ועל ידי קר תמן הרעליה. אל תגרום להתקפה. אין לאלה הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתופעה תאריך התופעה (exp. date) המופיע על גבי האריזה או הבקבוק, תאריך התופעה מתייחס ליום האחרון של אותו Woche.
- אחסון מתחת - 25°C.
- נהריה: לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש במשך 3 חודשים.

6. מידע נוסף:

nbsp; על החומר הפעיל התופעה מכילה גם:
nbsp; טבליות:

Calcium carbonate, wintergreen flavor, magnesium stearate, mannitol PWD unchil, red #27 D&C Al lake, sodium saccharin, stearic acid.

כמות הנתרן בכל לטבילה: 0.3 mg

תרחיף:

Magnesium aluminium silicate, methylsalicylate, methyl cellulose, D&C red 22, D&C red 28, sodium saccharin, salicylic acid, sodium salicylate, sorbic acid, xanthan gum, purified water.

כמות הנתרן בכל 30 מ"ל: 12 mg

כמות החומר המשמר בכל 30 מ"ל: Sorbic acid 11.4 mg

כיצד נראה התופעה ומה תוכן האירוע?

פינק ביסמות טבליות: אריזה המכילה 12 או 24 או 30 טבליות ורודות שטוחות. פינק ביסמות תרחיף: בקבוק המכיל 237 מיל של נוזל ורוד סמייך.

על הרישום וכותבות: Perrigo ישראל סוכנויות בע"מ, רח' לח"י 29, בני-ברק 51200.

שם היצרן וכותבות: חברת פריגו, אלגן, מישיגן, ארה"ב.

עלון זה בדוק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך יינואר 2015.

מספר רישום הממלכתי בפינקס התופעה הממלכתי במשרד הבריאות:

פינק ביסמות טבליות: 12876.30717
פינק ביסמות תרחיף: 12877.30747

שם הפשטות והקלות הקרייה, עלון זה נסוח בלשון ذכר. על אף זאת, התופעה מיועדת לשני המינים.

13.10.16

אין להשתמש בתופעה למשך יותר מיוםיים אלא בהנחיית רופא. לפני השימוש יש לנער היטוב ולשחות בהתאם למילוי המומלץ. שי Lokped על מדות המנה בכוסית המומלצת. אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטשעת מינון בוהה יתר: אם נטלת מנת יתר או אם בטשעת בעל ולד על התופעה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי מין של בית חולים ובוא את אריזת התופעה איתך.

אם שכחת ליטול את התופעה: אם שכחת ליטול התופעה זו בeneric, יש להרבות במקרה של שלשלולים שלא קפאי כדי בשתיית משקאות לפחות לאן קפאי כדי להתגבר על איבוד מזון.

• אין ליטול טולו מינון ביחס לאן קפאי כדי להרבות התופעה המומלצת. הררכב משקפיים אם הנר זוקה להם. אם יש לך שאלות מוספות לגבי שימוש בתופעה, הייoused ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו כל תרופת השימוש בפינק ביסמות עלול לגרום לתופעות לוואי בחALK מהמשתמשים. אל שגרה נטול תופעות הלואיא. יתכן שלא תסבול מ一封ן אחד מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לróפָא:

• מופעים התסמים הבאים: חולשה, עייפות, ביוטה בנסיימה, טשטוש ראייה, לבול, צצוצים באזוניהם או איבוד שמייע, עצירות חמורה.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לróפָא:

לróפָא בהקדם האפשרי: מופעים טמיינים של מינון יתר כגון נסוכות, כאב ראש.

• מוקם, גובה. מקרה של שלשול המלווה בחום גובה. תרופת זו עלולה לגרום לשינוי בצבע הצואנה או האילן. בשינויים אלה אין מוקם לדאגה.

אם אתה מתופעת הלואיא מוחמייה, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא הוזכרה בעילון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דוחות על תופעות לוואי:

נתן לדוחות על תופעות לוואי לאירוע הבראיות באמצעות החיזיה על הקישור "דו"וויה על תופעות לוואי יעקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר www.health.gov.il משדר הבריאות לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לרשומות:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>
במסוף, ניתן לדוחות לחברת פריגו באמצעות כתובתה הבא:
www.perrigo-pharma.co.il

הנר סובל או סבלת בעבר מרילקיין בתפקוד מערכת הנשימה (כגון אסתמה), הכליה/ מערכות השתן, מערכת העיכול (כגון כיב קבב), מערכות הדם (כגון קדישה וכו'), שגדון, התיבשות, אם יש לך חום.

יש לך אואה רופא או תרופה אחרת, ביפוי או אספירין וסליצילטים, עליך להודיע על רופא או רופא נטול תופעה או תרופה.

אם בשימוש בתופעה מילויים בחייבות ובחייבות, התיעץ עם הרופא או רופא נטול תופעה או תרופה או תרופה מילויים מוקדם (Reye's syndrome), מחלת נירה

או תרופה מילויים או מבוגרים לטיפול בבחילות ובהקאות.

• אין להשתמש בתופעה מילויים מוקדם (Reye's syndrome), מחלת נירה או מחלת נירית.

• אין להשתמש בתופעה או תרופה או תרופה מילויים למכורנים ולילדים מילויים.

• אין להשתמש בתופעה או תרופה מילויים למכורנים ולילדים מילויים.

• אם אתה לוקח או לך תחת לאחרונה התופעות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ומוספי תזונה, ספר עליך או לרוקח. בימייד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח אספירין וסליצילטים, תרופות נגד קריישטם, דם, תרופות נגד שדוזון, פרגזודין או סולפינפריזון, טריציקלים, תרופות לסתורתיות, תרופות לדלקת מפרקים או ארטיריטיס).

• שימוש בתרופת ומזהן: ניתן ליטול את התופעה עם או בלי מזוין.

• שימוש בתרופת וצrichtת אלכוהול: אין לשותות ייונת או משקאות חריפים בתפקידו הטיפול עם התופעה.

• הרין והנקה: אם הירך בהריון או מניניה, יש להזיע ברופא לפני השימוש בתרופת.

• מידע חשוב על חלק מהמריכבים של התופעה: התופעה מכילה סליצילט. אין להשתמש בה אם הירך או גוף סולוציליטים. ככל אספירין, או אם הירך לוקח תכשירים אחרים המכילים סליצילט.

• כיצד תשתמש בתרופת?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בסות.

• המיןון המקורי דרך כל הוא:

פינק ביסמות, טבליות לעיסה

• מבוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים: 2 טבליות.

לפי הוצרך ניתן לחזור על מינון זה כל חיizi שעה עד שעה, עד 8 פעמים (16 טבליות) בכל 24 שעות. יש ל忧虑ים או לאפשר לטבילה להתרומות בפה ולבלועו.

אין לעבור על המנה המומלצת.

פינק ביסמות, תרחיף:

• מבוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים: 2 כפות (2 TBSP).

הצרוך ניתן לחזור על מינון זה כל חיizi שעה עד שעה, עד 8 פעמים (16 כפות).

ילדיים מתחת גיל 12 שנים: יש להזיע ברופא.