

ציקלודרם קרם / תמיסה

חומר פעיל: 1% Cyclopirox olamine, ציקלופירוקס אולמין 1%
חומרים בלתי פעילים בתכשיר – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בטיחות השימוש בתרופה בילדים מתחת לגיל 10 לא הוכחה.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 30 ימים יש לפנות לרופא.

1. למה מיועדת התרופה?

תכשיר אנטי פטרייתי רחב טווח לטיפול מקומי בפטרית העור.

קבוצה תרופוטית: אנטי פטרייתי.

2. לפני שימוש בתרופה

✖ אין להשתמש בתרופה אם:

הנך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים שמכילה התרופה (ראה סעיף 6).

⚠ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך בהריון, או מניקה.

אזהרות נוספות:

- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני השימוש בציקלודרם.
- אין להשתמש בתחבושות אוטומות.
- קרם ציקלודרם מכיל פרפין אשר עלול לגרום לקרעית או דליפת קונדומים לטקס, לכן יש להימנע משיילוב בין שימוש בקרם לבין קונדומים אלו.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

עישון

ציקלודרם תמיסה - אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיר.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח באשר לאופן השימוש.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. בהעדר הוראה אחרת מהרופא הוראות השימוש הן: למרוח את הקרם או להתיז מהתמיסה על המקום הנגוע וסביבתו ולעסות בעדינות, פעמיים ביום בוקר וערב. יש להמשיך בטיפול עד העלמות סימני הפטרת ושבוש עד שבועיים נוספים למניעת הופעתה מחדש.

אזיות ציקלודרם תמיסה מכילה מתח נוסף המיועד לשימוש במידה שהרופא הורה על כך.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 30 ימים יש לפנות לרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע, לשימוש חיצוני בלבד. יש להימנע ממגע עם העיניים. אינו מיועד לשימוש וגילני.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא. לחות מעודדת את צמיחת הפטריות, לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע. יש לרוחץ האזור הנגוע לפני כל שימוש בתרופה. בין טיפול

לטיפול ניתן להשתמש באבקת טלק או אבקת נגד פטריות כדי לייבש את המקום. אם הטיפול הוא ברגליים, יש להקפיד על רחיצה יסודית וייבוש במיוחד בין הבהונות. רצוי להשתמש בגרביים מכותנה; יש להימנע מגרביים מצמר או מחומרים סינטטיים. רצוי להחליף מספר פעמים ביום (לפי כמות הזיעה). בעונות המתאימות מומלץ לנעול סנדלים ללא גרביים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בציקלודרם עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי במקרים בהם מתפתח גירוי מקומי, דלקת או פריחה במקום הטיפול.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על "כניסה לקישור":

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

ניתן גם לדווח על תופעות לוואי לדוא"ל: safety@trima.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מעט הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תימקוט ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לשמור במקום קריר מתחת ל-25°C.
- ציקלודרם קרם - לאחר הפתיחה הראשונה, ניתן להשתמש בתרופה במשך 6 חודשים.
- ציקלודרם תמיסה - אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיר.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את החומרים הבלתי-פעילים הבאים:

קרם:

Glycerol, Glyceryl monostearate, Propylene glycol, Cetostearyl alcohol, white beeswax, Glyceryl stearate (and) PEG-100 stearate, Dimethicone, Citric acid anhydrous, Chlorocresol, Purified water.

תמיסה:

Polyethylene glycol 400, Propylene glycol, Isopropanol, Lactic acid, Purified water.

• **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה -**

כל אריזה של ציקלודרם קרם מכילה שפופרת ובתוכה 15 גרם של קרם בצבע לבן-שנהב. כל אריזה של ציקלודרם תמיסה מכילה בקבוק ובתוכו 30 מ"ל של נוזל חסר צבע עד צהבהב.

- **יצרן ובעל הרישום:** תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, מעברות 4023000, ישראל.
- **עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך:** אפריל 2017.

• **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

ציקלודרם קרם: 062.23.26751.00, ציקלודרם תמיסה: 136.35.28781.00

- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.



מעברות 4023000
תוצרי רפואה ישראליים
מעברות בע"מ

12716