

كاريفلوكس ١٠٪ محلول بيطري

إنروفلوكساسين

للاستعمال البيطري فقط • ملزم بوصفة طبيب بيطري

١. اسم المستحضر

كاريفلوكس ١٠٪ محلول بيطري

٢. تركيب المستحضر

كل ١ مل ليختوى: إنروفلوكساسين ١٠٠ مل (Enrofloxacin 100 mg) لقائمة المواد الغير فعالة في المستحضر انظر البند ١٣ - "معلومات إضافية".

٣. دواعي الاستعمال

لعلاج التلقيحات الناجحة عن الجراثيم الحساسة لإنروفلوكساسين في الدجاج فقط بعد ثبوت أن هذه الجراثيم حساسة ووجد أنه لا يوجد دليل علاجي (ثبوت وجود مقاومة للمضادات الأخرى). قائمة الجراثيم الحساسة لإنروفلوكساسين في الدجاج هي *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*.

المجموعة العلاجية: إنروفلوكساسين هي مادة مضادة للجراثيم، من مجموعة الفلوروكوبنيلونات.

٤. موانع الاستعمال

لا يجوز الاستعمال كعلاج قاتلي.
لا يجوز الاستعمال عند العلم بوجود مقاومة / مقاومة متصالبة للفلوروكوبنيلونات.
لا يجوز الاستعمال في حالة حساسية معروفة للمركب الفعال، (لفلوروكوبنيلونات أخرى أو لأحد المركبات الغير فعالة).

٥. اعراض جانبية

غير معروفة.
إذا لاحظت أعراض خطيرة أو أعراض أخرى والتي لا تنتهي في هذه الشرة، يجب الوجوه للطبيب البيطري.
يمكن التخلص من الأعراض الخطيرة بعد انتهاء فترة الصلاحية المسجلة على العبوة.
يجب تجنب التخزين بدرجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية.
مدة الصلاحية بعد فتح العبوة للمرة الأولى: ٣ أشهر.
مدة الصلاحية بعد الاسترجاع: ٤٤ ساعة.
يجب ذكر تاريخ الانتهاء على الملصق.

٦. تحذيرات خاصة

يجب بحظ استعمال الفلوروكوبنيلونات لعلاج أوضاع سريرية التي لم تستحب جيداً أو من المتوقع أن لا تستجيب جيداً، لمجموعات أخرى من مضادات الجراثيم.
منذ أن تم إثبات الصالحة لأدوى على استعمال إنروفلوكساسين في الطيور، كان هناك انخفاض واضح في حساسية الأشريكية الغلوبولينية (*E. coli*) للفلوروكوبنيلونات وظهور ميكروبات مقاومة، بلغ أيضاً عن مقاومة من ميكولايزما سينوفيقية (*Mycoplasma synoviae*) في أوروبا.
عند الامكان، يجب استعمال الفلوروكوبنيلونات فقط على أساس

شخص للحساسية.
استعمال المستحضر بخلاف التعليمات قد يزيد من انتشار الجراثيم مقاومة للفلوروكوبنيلونات وقد يتضمن من نجاعة العلاج بفلوروكوبنيلونات أخرى نتيجة مقاومة متصالبة ممكناً.
استعمال الفلوروكوبنيلونات في مرحلة التمويولنة مع ارتفاع ملحوظ ومستمر يمكنه استهلاك ماه شرب، لذلك بالمركي القفال، يجب اعطاء الدواه في طريقه الماء الشرب، وبعده تشرب، يجب تناوله كل يوم من جيداً وبشكل متقطن على أساس حصر للحساسية.
يجب تناوله كل فراة العلاج، لا يجوز اعطاء الدواه قبل تناوله كل يوم من جيداً وبشكل متقطن على أساس حصر للحساسية.
يجب تناوله كل فراة العلاج، لا يجوز اعطاء الدواه قبل تناوله كل يوم من جيداً وبشكل متقطن على أساس حصر للحساسية.

- أشخاص مع حساسية معروفة لـ(فلوروكوبنيلونات) يتوجب عليهم الابتعاد عن المنس المتأثر بالمستحضر.
- يجب الابتعاد عن ملامسة الجلد والعينين.
- يجب غسل اليدين وأخذ المعرض بعد الاستعمال.
- لا يجوز الإكثار، الشرب أو التدخين أثناء استعمال الدواه.

٧. تحذيرات خاصة بخصوص رمي الدواه

كل مستحضر بيطري لم يستعمل أو كل مادة زائدة بقيت بعد استعمال مستحضر بيطري طي يجب التخلص منها على أنها بقايا سامة، لا يجوز الرمي في المارزي.

٨. تاريخ المصادقة على النشرة

٢٠١٥ تشرين الثاني

٩. معلومات إضافية

قائمة المواد الغير فعالة:
Benzyl Alcohol (E1519), Potassium Hydroxide, Purified water

زجاجات ٢٥٠ مل، ١ لتر أو ٥ لتر.
قد لا تكون كل أحجام العبوات مسوقة.

١٠. اسم و عنوان صاحب التسجيل والمنتاج:

صاحب التسجيل: اوديم، شارع تسل ٥٧، رمات جان.
المنتاج: كريزو-مختبرات S.A., برشلونة، إسبانيا.

رقم تسجيل الدواه في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١٥٤٩٤٣٣٦٨٠٠

٦. الأنواع المستهدفة

الدجاج اللام

٧. الجرعة وطريقة الاعطاء

١٠. منه إنروفلوكساسين لكتغم وزن الجسم كل يوم لمدة ٥-٣ أيام متواصلة.