

<div></div>
<div>نشرة للمستهلكت بموجب أنظمة الصيدلة</div>
 (مستحضرات) ١٩٨٦
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ريفولِد ٢٥ ملغ أقراص مطلية

ريفولِد ٥٠ ملغ أقراص مطلية

يحتوي كل قرص مطلي على:

إنترومبوجاڨ (ك أدولامين) ٢٥ ملغ أو ٥٠ ملغ.
Eltrombopag (as Olamine) 25mg or 50mg

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة ٦ «معلومات إضافية»

إقرا النشرة بتمعن حتى نهائيتها قبل إستعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي، وصف هذا الدواء من أجلك لا تعطيه للأخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدأ لك أن حزنهم الطبية مشابهة لحالك.

١) لأي عرض مشابهة

لعلاج مرضى من عمر ٦ سنوات وصاعداً الذين يعانون من إضطراب تخثر مزمن من نوع فرقرية قلّة الصفيحات الدموية مجهولة السبب (ITP) بعد علاج سابق، وذلك لرفع تعداد الصفيحات الدموية وتقليل أو منع حدوث نزف.

لعلاج قلّة الصفيحات الدموية (إنخفاض تعداد الصفيحات الدموية) لدى مرضى كبار لديهم إتهاب كبد فيروسي مزمن من نوع C (HCV) وذلك لتمكين بدء

وواصله علاج يعتمد على إنترفرون.

لعلاج مرضى كبار يعانون من فقر الدم اللانسجي الخطير (SAA) حيث أن علاجهم بدواء منبّط للجهاز المناعة لم يحقق إستجابة كافية.

الصفيلة العلاجية

ريفولد ينتمي إلى فصيلة أدوية تسمى مقلدات لمستقبلِ تربموبويتين

(*thrombopoietin receptor agonists*).

٢) قبل إستعمال الدواء

❌ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
كنت حساسا (ألمرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة ٦).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

❌ قبل العلاج بد ريفولد إحتل للطبيب:

إذا وجدت لديك مشاكل في الكبد. إن الأشخاص الذين لديهم تعداد منخفض للصفائح الدموية بالإضافة لمرض كبدي مزمن متقدم معرضون لخطورة زائدة

لحدوث أعراض جانبية تشمل ضرر كبدي يشكل خطراً على الحياة وخثرات دموية. إذا كان طبيبك يعتقد بأن الفوائد من تناول ريفولد تزيد عن المخاطر، فأنت مستخضع لمراقبة حثيثة خلال علاجك.

إذا كنت معرضاً لخطورة تشكل خثرات دموية أو في الإبردة أو في الشرايين لديك. أو كنت تعالِمُ جان الخثرات الدموية شائعة لدى عائلتك.

أنت قد تكون معرضاً لخطورة زائدة لتشكّل خثرات دموية.

كلما تقدمت في العمر

إذا اضطرت لملازمة الفراش لفترة زمنية طويلة

إذا كان لديك سرطان

إذا كنت تتناولين أقراص لمنع الحمل أو تتلقين علاج هورموني بديل

إذا اجزرت مؤخرا عملية جراحية أو إذا أصبت

إذا كنت ذو وزن زائد بشكل كبير (*فرط بدانة*)

إذا كنت من المدخنين

إذا وجد لديك مرض كبدي مزمن متقدم

إذا إنطبق عليك واحد مما ذكر إحتل طبيبك قبل بدء العلاج. لا تتناول ريفولد إلا إذا كان طبيبك يعتقد بأن الفوائد المرتفعة تزيد عن الخطورة لحدوث خثرات دموية.

إذا كنت تعاني من **كاتاراكت** (كدر عدسة العين)

إذا وجدت لديك مشكلة **تعلق بالمدم**، مثل متلازمة سوء النمو النخاعي (*syndrom myelodysplastic - MDS*) . قبل أن تبدأ بتناول ريفولد،

يقوم طبيبك بإجراء فحوصات للتأكد من عدم معاناتك من هذه المشكلة الدموية. إذا وجد لديك متلازمة سوء النمو النخاعي وكنت تتناول ريفولد فإن متلازمة سوء النمو النخاعي قد تتفاقم لديك.

إحتل طبيبك إذا إنطبق عليك واحد مما ذكر

❌ فحوص العينين

فحوص طبيبك بإجراء فحص بؤبؤ كاتاراكت. إذا كنت لا تجتاز فحوص عينين إعتيادية، سيرسلك طبيبك لإجراء فحوص من الجائز أيضاً أن تجتاز فحصا لوجود نزف داخل الشبكية أو حولها (طبقة الخلايا الحساسة للضوء في القسم الخلفي للعين).

❌ فحوص دائمة

قبل أن تبدأ بتناول ريفولد يقوم طبيبك بإجراء فحوص دم وذلك لفحص خلايا دمك، بما في ذلك الصفيحات الدموية. سيتم تكرار هذه الفحوص خلال فواصل زمنية محددة أثناء تناول الدواء.

❌ فحوص دم لوظائف الكبد

يمكن أن يؤدي ريفولد إلى نتائج كبد من التي من شأنها أن تدل على حدوث ضرر كبدي - إرتفاع في عدة إنزيمات في الدم، خاصة بيليريتين والألئين/أسبارتات ترانسأميناز. إذا كنت تتلقى علاجات أساسها إنترفرون سوية مع ريفولد لعلاج

إنخفاض تعداد الصفيحات الدموية الناتج عن ثلوثات التهاب الكبد من نوع C، فقد تتفاقم مشاكل كبدية معينة.

أنت ستحتاج فحوص للدم لفحص وظائف كبدك قبل أن تبدأ بتناول ريفولد، وأيضاََ فواصل زمنية محددة خلال تناوله. من الجائز أن تضطر إلى التوقف عن تناول

ريفولد إذا زادت كمية هذه المواد عن الحد. أو إذا ظهرت لديك علامات أخرى لنضمر الكبد. إقرا المعلومات التي تظهر تحت بند «مشاكل في الكبد» في الفقرة ٤ من هذه النشرة.

❌ فحوص دم لتعداد الصفيحات الدموية

في حال توقفك عن تناول ريفولد، فمن المتوقع أن ينخفض تعداد الصفيحات الدموية لديك ثانية خلال عدة أيام. ستتم مراقبة تعداد الصفيحات الدموية لديك وينافسك طبيبك بالنسبة لسنوات الحد المناسية.

إذا وجد لديك تعداد مرتفع جدا للصفائح الدموية، قد يزيد الخطورة لحدوث خثرات دموية. عند ذلك، إن الخثرات الدموية قد تتشكل أيضاً عندما يكون تعداد الصفيحات الدموية طبيعياََ أو حتى منخفضاََ. يقوم طبيبك بملازمة مفاراك الدوائي من ريفولد

للتأكد من أن تعداد الصفيحات الدموية لديك لا يرتفع عن اللازم.

توجه حثاً لتلقي مساعدة طبية إذا وجدت لديك أي من العلامات التالية لحدوث خثرة دموية:

- إنتفاخ أتم أو حساسية في رجل واحدة

- ضيق تنفس مفاجيء بالأخص عندما يتراقف بالم حاد في الصدر أو تسرع التنفس

- ألم في البطن (المعدة)، تضخم البطن، دم في البراز لديك

❌ فحوص نخاع العظم

لدى أشخاص لديهم مشاكل في نخاع العظم، فإن أدوية مثل ريفولد قد تتفاقمها علامات لحدوث تغيرات في نخاع العظم يمكن أن تظهر نتيجة شذوذ في فحوص الدم لديك خلال العلاج ب ريفولد. من الجائز أن يقوم طبيبك أيضاً بإجراء فحوص تختبر نخاع العظم لديك بشكل مباشر.

❌ فحوص لحدوث نزف في الجهاز الهضمي

إذا كنت تتلقى علاجات أساسها إنترفرون سوية مع ريفولد، فأنت ستخضع لمراقبة أية علامة لحدوث نزف في البطن أو الأمعاء بعد التوقف عن تناول ريفولد.

❌ مراقبة أتم

من الجائز أن يفكر طبيبك بأنه من الضروري مراقبة قلبك خلال العلاج ب ريفولد، ويجري فحص التخطيط الكهربائي للقلب.

❌ الأطفال والمراهقون

ريفولد أقراص غير مخصص للأطفال دون عمر ٦ سنوات الذين يعانون من ITP، كذلك، فإن ريفولد غير مخصص للأطفال ومراهقين دون عمر ١٨ سنة لديهم إنخفاض في تعداد الصفيحات الدموية نتيجة التهاب الكبد الفيروسي المزمن من نوع C أو فقر الدم اللانسجي الخطير.

❌ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحتل لطبيبك أو الصيدلي عن ذلك بالأخص إذا كنت تتناول:

- مضادات الحموضة لعلاج إضطرابات الهضم، الحرقان أو القرحات المعدية (أنظر أيضاََ الفقرة ٣ «كيفية إستعمال الدواء»)»

- أدوية مسهبة سستانتينات، لتخفيض الكوليسترول

- أدوية معينة لعلاج ثلوث HIV، مثل لوبينافير و/أو راتونافير

- سيكلوسبورين المستعمل بما يرتبط بعمليات زرع الأعضاء أو الأمراض المناعية

- معادن مثل الحديد، كالسيوم، مغنزيوم، ألومنيوم، سيلينيوم وتوتياء التي يمكن أن تتواجد في الإضافات الفيتامينات والمعادن (أنظر أيضاََ الفقرة ٣، «كيفية إستعمال الدواء»)»

- أدوية مثل ميتونيريكسات وتوبوتيكان. لعلاج السرطان

- فلوفوكسامين

- ريفامپيسين

بلغ طبيبك إذا كنت تتناول أي دواء من تلك الأدوية، فبعضها لا يجوز تناوله سوية مع ريفولد أو من الجائز أن يحتاج الأمر لملازمة مفاراك الدوائي، أو مستضع لتغيير أوقات تناولها، يحسن طبيب الأدوية التي تتناولها، ويقترح بديل ملائم إذا

دعت الحاجة لذلك. إذا كنت تتناول أيضاََ أدوية لمنع تخثر الدم فهناك خطورة زائدة لحدوث أنزفة، بناقشك طبيبك حول ذلك.

إذا كنت تتناول كورتيكوستيروئيدات، دنازول و/أو أزاتيوبرين، فمن الجائز أن تضطر لتناول مقدار دوائي أخفض أو التوقف عن تناولها خلال تناول ريفولد.

❌ إستعمال الدواء، الطعام والشراب

لا تتناول ريفولد مع الأطعمة أو المشروبات التي تحوي الحليب لأن الكالسيوم الموجود في منتجات الحليب يؤثر على امتصاص الدواء. لمعلومات إضافية، أنظر الفقرة ٣، «كيفية إستعمال الدواء»)».

❌ الحمل والإرضاع

لا تستعملي ريفولد إذا كنت في فترة الحمل إلا إذا أوصى طبيبك بذلك بشكل صريح إن تأثير ريفولد خلال الحمل غير معروف.

- إحتكي لطبيبك إذا كنت حامل، تتعقدن بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل.

- إستعملي وسائل موثوقة لمنع الحمل أثناء تناولك ريفولد، وذلك لمنع الحمل.

- إذا أصبحت حاملاََ أثناء العلاج ب ريفولد، إحتكي لطبيبك.

لا تقومي بالإرضاع أثناء تناولك ريفولده، لا يعرف إذا كان ريفولد ينتقل إلى حليب الأم، إذا كنت مرضعة أو تخططين للارضاع، إحتكي للطبيب.

❌ السياحة وإستعمال الماكينات

ريفولد يمكن أن يسبب لك الدوار وأعراض جانبية أخرى التي قد تجعلك أقل بوظة، لا تقوموا ب إستعمال ماكينات إلا إذا كنت وثقاََ من عدم تأثرك.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماََ

عليك الإستينصاح مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن وثقاََ.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

أو الصيدلي الخاص بك بتغيير ذلك، خلال فترة تناولك ل ريفولد مستخضع لمراقبة طبيب مختص في علاج حالك.

المقدار الدوائي الإعتيادي

المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي لمعالجين لديهم **ITP** - و **SAA** هو قرص واحد بعتبار ٥٠ ملغ من ريفولد في اليوم. إذا كنت من أصل شرق آسيوي

(صيني، ياباني، تاواني، تايلندي أو كورياني) فمن الجائز أن تحتاج للبدء بمقدار دوائي أخفض ذو **٢٥ ملغ.**

المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي لأشخاص لديهم التهاب كبد فيروسي من نوع **C** هو قرص واحد بعتبار **٢٥** ملغ من ريفولد في اليوم. إذا كنت من أصل شرق آسيوي (صيني، ياباني، تاوياني، تايالندي أو كورياني) فعليك البدء بنفس المقدار الدوائي ذو **٢٥** ملغ.

من شأن من ريفولد أن يؤثر خلال أسبوعين حتى أسبوعين، وفقاً لإستجابتك ل ريفولد من الجائز أن يوصي طبيبك بتغيير المقدار الدوائي اليومي الخاص بك.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به

يجب بلع القرص بشكله الكامل، مع التقليل من الماء.

متى يجب تناول الدواء

لا يجوز إستهلاك واحد مما يلي خلال أربع ساعات قبل تناول ريفولد وكذلك خلال ساعتين بعد تناول ريفولد.

- الأطعمة التي تحتوي على الحليب مثل جبنة، زبدة، بيوجورت و بوظة

- الحليب أو خلاط الحليب (المشروبات المخفف، المشروبات التي تحوي حليب، يوجورت أو قشدة

- مضادات الحموضة - أدوية الصد الإضطرابات الهضمية والحرقان

- مضافات معينة من مضادات العناصر والفيتامينات، تشمل: حديد، كالسيوم، مغنزيوم، ألومنيوم، سيلينيوم والتوتياء

إن تم تقيد بهذه التعليمات، فإن آثار هذه المشكلة، الإبتسداد المفاجئ للأوعية الدموية من الإشارات بالنسبة للأظعمة والمشروبات الملائمة، تحدث مع طبيبك،

إذا تناولت بالحظ مقدار دوائي أكبر

إذا تناولت مقدار دوائي مضط أو إذا بلع بالخطأ من الدواء توجه حالاً إلى الطبيب أو المستشفى وأعرض مرعك عليه الدواء، سيتم فحصك لتحدد علامات أو أعراض أي ألامت حدوث أعراض جانبية ويعطى لك حلاََ علاجاً مناسباً.

إذا نسيت تناول الدواء

تتاول مقدار الدوائي التالي في الوقت المخصص لذلك. لا تتناول أكثر من مقدار دوائي واحد من ريفولد في يوم واحد.

في حال توقفك عن تناول الدواء

لا تتوقف عن تناول ريفولد من دون التحدث مع طبيبك. إذا أوصاك الطبيب بوقف العلاج، فيستمر فحص تعداد الصفيحات الدموية لديك بعد ذلك بكل أسبوع خلال أربعة أسابيع (أنظر معلومات إضافية تحت «أنزفة أو كدمات بعد التوقف عن العلاج» في الفقرة ٤). يجب التواظية كما أوصى به الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ريفولد قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا ندمشش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أياََ منها.

الأشخاص الذين يجب إنتباهنا إليها: راجع ITP

إن الأشخاص الذين يتناولون ريفولد لعلاج ITP أو لتعداد منخفض من الصفيحات الدموية جراء التهاب الكبد من نوع C يمكن أن يطوروا علامات لأعراض جانبية التي قد تكون خطيرة. من المهم إبلاغ الطبيب إذا تطورت لديك تلك الأعراض.

خطورة زائدة لتشكّل خثرات دموية

من الجائز أن يشكو الأشخاص مهيمنة خطورة زائدة لحدوث خثرات دموية وإن أدوية مثل ريفولد قد تتفاقم هذه المشكلة. الإبتسداد المفاجئ للأوعية الدموية بواسطة خثرة دموية هو عرض جانبي غير شائع ويمكن أن يظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠ شخص.

توجه حثاً لتلقي مساعدة طبية إذا تطورت لديك علامات وأعراض لحدوث خثرة دموية مثل:

- إنتفاخ أتم، الشعور بسخونة، إحمرار أو حساسية في رجل واحدة

- ضيق تنفس مفاجيء، بالأخص إذا تراقف بالم حاد في الصدر أو تسرع التنفس أو ألم في البطن (المعدة)، تضخم البطن، دم في البراز.

مشاكل في الكبد

ريفولد يمكن أن يسبب تغيرات تظهر في فحوص الدم وقد تشكل علامات لحدوث ضرر في الكبد، مشاكل في الكبد إنزيمات في الإزيمات الذي يظهر في فحوص الدم) هي شائعة ويمكن أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠ أشخاص. مشاكل

أخرى في الكبد (عدم سلامة تدفق العصارة الصفراوية) هي غير شائعة ويمكن أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠ شخص.

إحتل طبيبك فوراً إذا وجد لديك أي واحد من العلامات التالية لحدوث مشاكل في الكبد:

- إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين (*يرقان*)

- بول داكن من المعتاد

أنزفة أو كدمات بعد التوقف عن العلاج

خلال أسبوعين من إيقاف العلاج ب ريفولد، عادة ما ينخفض تعداد الصفيحات الدموية لديك حيث يعود إلى طبيعته الذي كان عليه قبل بدء تناول ريفولد. إن إنخفاض تعداد الصفيحات الدموية يمكن أن يزيد الخطورة لحدوث خثرات دموية

يقوم طبيبك بفحص تعداد الصفيحات الدموية لديك خلال أربعة أسابيع على الأقل بعد توقفك عن تناول ريفولد.

إحتل طبيبك إذا وجدت لديك أنزفة أو كدمات بعد التوقف عن العلاج ب ريفولد. تحدث لأشخاص معينين أنزفة في الجهاز الهضمي بعد توقفهم عن تناول بيچ

إنترفرون، ريفامپيسين وريفولد (تغوطات ندم).

- براز أسود، يتغير اللون (تغوطات ندم) من مختلف عن المعتاد هي عرض جانبي غير شائع الذي يمكن أن يظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠ شخص)

دم في البراز لديك

تقياد دم أو مزاج تبدو مثل حبيبات القهوة

إحتل لطبيبك حالاً إذا وجد لديك واحد من تلك الأعراض.

أعراض جانبية إضافية **مستحبة لدى** **معالجين** **يعانون** **من** **فرقرية قلّة الصفيحات** **الدّموية** **مجهولة** **السبب** **(ITP)**

أعراض جانبية شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠ أشخاص:

- غثيان
- إسهال
- كدر عدسة العين (كاتاراكت)
- جفاف العينين
- تساقط أو خفة الشعر بشكل شاذ
- طفح جلدي
- حكة
- ألم في العضلات، تقلصات عضلية
- ألم في الظهر
- ألم في العظام
- وخز أو خدر في اليدين أو راحتي الرجلين
- نزف طمئي شديد
- تقرحات في الفم

أعراض جانبية شائعة التي يمكن أن تظهر في فحوص الدم:

- إرتفاع إنزيمات الكبد
- إرتفاع البيليريوين (مادة تنتج من قبل الكبد)
- إرتفاع نسب بروتينات معينة.

أعراض جانبية غير شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠ شخص:

- إضطراب في تزويد الدم إلى قسم من القلب

- ضيق تنفس في النوم، بالأخص إذا تراقف بالم حاد في الصدر و/أو أنظر «خطورة التي يمكن أن تشكل علامات لتفاوتات حمية في الرئتين (أنظر «خطورة زائدة لتشكّل خثرات دموية» في الفقرة ٤ سابقاً)

- فقدان وظيفة كبد، من الرثرة نتيجة إبتسداد في شريان الرثة

- مشاكل في الكبد، تشمل إصفرار العينين والجلد (أنظر «مشاكل في الكبد» في الفقرة ٤ سابقاً).

- تسرع ضربات القلب، نبض غير منتظم. إزرقاق الجلد

- إضطرابات في نظم القلب (إطالة QT)

- إتهاب الوريد

- إنتفاخ موضعي ممثل بآلم نتيجة إصابة وعاء دموي (ورم دموي) ألم في الحجرحة وإنزعاج أثناء البلع، التهاب الرئتين، الجيوب، اللوزتين، الأنف والحنجرة

- إنفلوانزا

إتهاب الرئتين

فقدان الشهية للطعام

- إنتفاخ وألم في المفاصل ناتجين عن حمض البول (نقرس)

- مشاكل في النوم، إكتئاب، عدم الإكترار، تغيرات في المزاج، الشعور بعنأس، شقيقة، إرتفاح، مشاكل في التوازن، في النطق وبالآداء الوظيفي للأصابع

- مشاكل في العين تشمل: إصفرار الرؤية وتناقص حدة الرؤية

- ألم في الأذنين، الصدور (تورخ)

- مشاكل في الأنف، الحجرحة والجيوب، مشاكل في التنفس أثناء النوم

- مشاكل في الجهاز الهضمي، تشمل: تقيؤ، غازات، تغوط متكرر، ألم وحساسية في البطن

سرطان المستقيم

- مشاكل في الفم، تشمل: فم جاف أو مؤلم، حساسية اللسان، نزف من اللثة

- تغيرات في الجلد، تشمل: تقرق زائد، طفح درني حاك، نقط حمراء، تغيرات في المظهر

حروق نتيجة التعرض للشمس

إحمرار حول إنتفاخ حول اللرحم

نزف حول الفمطر (إذا وجد) إلى داخل الجلد

الشعور بحسوم غريب

ضعف عضلي

- مشاكل في الكلية، تشمل: إتهاب الكلية، زيادة التبول الليلي، فشل كلوي.

- إتهاب المسالك البولية، خلايا دم بيضاء في البول، ظهور بروتين في البول.

- شعور عام غير جيد، سخونة عامة، الشعور بسخونة، ألم في الصدر.

- تعرق بارد

إتهاب نسيج اللثة

هريس في الجلد

ثلوث في الفم

أعراض جانبية غير شائعة التي يمكن أن تظهر في فحوص الدم:

- إنخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء (فقر دم)، خلايا الدم البياض والصفائح الدموية

إرتفاع في تعداد الصفيحات الدموية

- إرتفاع في عدد خلايا الدم الحمراء

تغيرات في تركيب الدم

- تغيرات في نسب حمض البول، الكالسيوم والپوتاسيوم.

أعراض جانبية إضافية **محمّلة لدى الأطفال** **الذين يعانون من فرقرية قلّة الصفيحات الدموية مجهولة السبب (ITP)**

أعراض جانبية شائعة جداً

تلك من شأنها أن تظهر لدى أكثر من ١ من كل ١٠ أطفال:

- ألم في الحجرحة، رشح، إحتقان في الأنف وعطاس

- إتهاب في الأنف، في الجيوب الأنفية، في الحجرحة والطرق التنفسية العلوية، زكام (ثلوث في الطرق التنفسية العلوية)

إسهال

أعراض جانبية شائعة

تلك من شأنها أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠ أطفال:

إضطرابات في النوم

آلام في البطن

ألم في الأستان

سعال

ألم في الأنف وإنسداد في الأنف

حكة، سيلان أو إبتسداد في الأنف

سخونة