

**بيكونيس، أفراد مُلمسة**

كل فرق ملمس يحتوي على:

٢٢ ملء خاصية جافة من قرون نبات السنما

١٥٠-١٥٢ mg Dry extract of Tinnevelly Senna pods corresponding to 20 mg hydroxyanthracene derivatives calculated as Sennosides B

المادة غير الفعالة - انظر البند ٦ "معلومات إضافية"

وذلك "معلومات مهمة عن جزء من مرکبات الدواء"

اقرأ النشرة يامن عن هذه النشرة على معلومات ملخصة

عن الدواء. إنما تذكر أسلطة إضافية، توجه إلى

الطبيب أو إلى الصيدلي

هذا الدواء وصف العلاج المرض، لا عطمه إلى

أن رضمه ممائل.

الدواء مخصص للبالغين، الأطفال والمرأةن فين فرق

جبل ١٢

## ١. لا يغوص مخصوص الدواء؟

ملاعع قصير الأداء التخفيف من الإمساك.

(Contact laxative)

## ٢. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (أرج) لل المادة الفعالة (نيات السنما

أو لاي واحد من مرکبات الأدواء إضافية التي يحتوي

عليها (انظر البند ٦)

كنت تعاني من تهابيات الأمعاء المزمنة (مثل

مرض كرون، تهاب القولون المعوي التقرحي)، من

انسداد الأمعاء وبن تهاب الأذن الوذمة (التي

تعانى منها أمم من شنجات أو انتفاخ البطن،

كنت تعانى من الم في البطن لسبب غير معروف

أو حالات الخطأ.

النتائج خاصة بعلقة باستعمال الدواء:

قبل العلاج ببيكونيس، أخر الطبيب إذا:

كنت حساساً ملمساً معن، أو لدواء معن.

كت تعانى من خلل في وظيفة القلب أو من

نزيف في قمة الشرج.

استعمال متواصل قد يؤدي إلى التعلق بمستحضرات

سهولة مثل هذا وإلى الإسهال.

٥- يجب بلغ القرص الملبس بكامله مع الكثير من  
السوائل.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ ولد من الدواء  
عن طريق الطبيب توجه فوري إلى الطبيب في فرات  
غرفة الطوارئ في المستشفى، واصطبغ عودة  
الدواء المعد. لا تسبب التقطور دون معلومات صريحة  
من الطبيب.

٦- يجب تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب،  
او الرفع وذلك تمنع الدسم لا تسبب التقطور بدون  
تضليلات صحية من الطبيب.

٧- لا يجوز تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية  
(exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ  
انتهاء الصلاحية يرجح على اليوم الأخير من نفس  
الشهر.

٨- ملخص درجة حرارة تتقدل ٣٠ درجة منوبة.  
ملخص استعمال الدواء حتى ٦ أشهر بعد الفتح لأول  
مرة.

## ٨. معلومات إضافية

٩- إضافة المادة الفعالة، يحتوى الدواء أيضاً على:  
Sucrose, Talc, Cellulose Microcrystalline,

Lactose Anhydrous, Eudragit L 30 D, Calcium Carbonate, Silicon Dioxide Methylated, Titanium Dioxide (E 171), Gelatine, Magnesium Stearate, Gum Arabic spray dried, Liquid Glucose (Dry Substance), Macrogol 6000, Polysorbate 80, Stearic Palmitic Acid, Montan Glycol Wax, Carboxymethylcellulose Sodium

١٠- كتف بيتو الدواء وما هو محتوى العبوة: في  
عبوة توجيه قراروة التي تحتوي على ٤٥ فرق  
ملخص لاعي بلاد بون رمادي-أبيض.

١١- كتف بيتو الدواء وما هو محتوى العبوة: في  
عبوة توجيه قراروة التي تحتوي على ٤٥ فرق  
ملخص لاعي بلاد بون رمادي-أبيض.

١٢- اسم المنتج وعوانه: روها، أرنزنبيتل Gmbh,  
برلين، ألمانيا

١٣- فحصت هذه النشرة وتم المصادقة عليها من  
قيل وزارة الصحة في تاريخ: ٢٠١٧/٠٧

١٤- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي  
في وزارة الصحة: ٣٦٦٦٢٢٥٧٤٠٠

١٥- التبسيط وتبسيط القراءة، تمت صياغة هذه النشرة  
وصيغة المذكرة، على الرغم من ذلك، الدواء  
والمعلومات في النشرة مخصوصة للكبار الذين.

صاحب الامتياز: دكسل م.ض.  
شارع دكسل ١، أور-عكيفاً، ٣٠٦٠٠٠، إسرائيل

١٦- يجب بلغ القرص الملبس بكامله مع الكثير من  
السوائل.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ ولد من الدواء  
عن طريق الطبيب توجه فوري إلى الطبيب في فرات  
غرفة الطوارئ في المستشفى، واصطبغ عودة  
الدواء المعد. لا تسبب التقطور دون معلومات صريحة  
من الطبيب.

١٧- إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب،  
لا يجوز تناول جرعة مساعدة.خذ العجرة التالية في  
وقت المحدد واستمر الطبيب.

١٨- لا يجوز تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية  
(exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ  
انتهاء الصلاحية يرجح على اليوم الأخير من نفس  
الشهر.

١٩- ملخص درجة حرارة تتقدل ٣٠ درجة منوبة.  
ملخص استعمال الطبيب أو الصيدلي.

## ٩. الأعراض إضافية

٢٠- إذا كنت تأخذ، أو إذا كنت مؤخراً أدوية  
أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب  
وأضافات تغذية، أخر الطبيب أو الصيدلي  
جاهية لدى جزء من المستخدمين. لا تزعم من قراءة  
هذه الأدوية سوءة الأحساس الجاهية. من الممكن أن لا تصاب  
بأي واحدة منها.

٢١- إيجابي اتيلاكروزيريزات (مثل جلايكوزيدات النظم)،  
ديجيوكس، أدوية لعلاج اضطرابات القلب،  
العنق، العلاج التوالي.

٢٢- تقييم انتشار الطبيب.

٢٣- اعراض جانبية إضافية:  
احمرار لون البول. إذا تغير لا يدعه إلى القلق.

٢٤- استعمال مزمن قد يؤدي إلى وجود بروتين  
ويم في البول. كذلك إلى الاصطدام بالطباط.  
(pseudomelanosis col)

٢٥- ينصح عادة بوقف التناول من قبل الطبيب  
عشرة أيام. ثم بانتظار شهر. يرجى عض غبار  
الجرعة الافتراضية عادة هي:

٢٦- عثيل وتقؤلات لأسباب غير معرفة.  
كت تعانى من الم في البطن لسبب غير معروف

أو حالات الخطأ.

٢٧- النتائج دو جبل ١٢

٢٨- تحسينات خاصة بعلقة باستعمال الدواء:  
٢٩- قبل العلاج ببيكونيس، أخر الطبيب إذا:

٣٠- كنت تعانى من خلل في وظيفة القلب أو من

نزيف في قمة الشرج.

٣١- استعمال متواصل قد يؤدي إلى التعلق بمستحضرات  
سهولة مثل هذا وإلى الإسهال.

٣٢- طلاء وأقى.