

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

בקונים מחפיות

ל מחפית מכילה:
150-220 מ"ג תמיצת יבשה של תרמילי צמח הסנה
150-220 mg dry extract of Tinnevelly Senna pods corresponding to 20 mg hydroxyanthracene derivatives calculated as Senosides B

חומרים בלתי פעילים – ראה טיפוס "מדע נוסף" וסעיף "מידע חשוב על חלק המרכיבים על התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו ברטם שתשמת בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמיצתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה לרופא או אל הרוקח. תרופה זו גרשמה בעבורך. לא תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם לראיה לך כי מעידת הרופאי דומה.

התרופה מיועדת למבוגרים, ילדים ומתבגרים מעל לגיל 12.

1. למה מיועדת התרופה?

• לטיפול קצר טווח בהקלת העצרות.

קבוצה תרופוטיית: משלשל (Contact laxative)

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:
• אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (צמח הסנה) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה טיפוס 6).
• אתה סובל מדימום מדיקות מעיים כרוניות, (כגון מחלת קרוהן, דלקת מעי כרונית, מחסמת מעיים או ממלדת תסנתן (ססתמיניה משלש; כאבים, עונית, התנפחות הבטן), בחילות והקאות מסובכות בלתי מזוהות).
• אתה סובל מנזק מסוכן למערכת הלב או למערכת העיניים.
• אתה סובל ממתח לגיל 12.

אזהרות מיוחדות המנועות לשימוש בתרופה:

- **לפני הטיפול בבקונים, ספר לרופא אם:**
 - אתה רגיש למוקד כלשהו או לתרופה כלשהי.
 - אתה סובל מלוקמיה בתפקוד הלב או מדימום בלי שטבעת.
- שימוש ממושך עלול לגרום לתלות בתשירים משלשלים כגון זה ולשלשולים.

- אין להשתמש בבקונים מחפיות לעיתים קרובות או במשך תקופה ממושכת בלי להיעזר ברופא.
- **בקונים מחפיות מיועד רק לעצרות הנמשכת מספר ימים ואינה מביאה לשינוי בדיאטה או לתשייר המגדיל נפח צואה.** חוסר פעילות מעיים ליום או יומיים אינו מצדיק שימוש ב-מק, כן, אין להשתמש בו למטרות אחרות כגון "לקיח גוף" וזדומה.
- אם לאחר נטילת התרופה עדיין אין פעילות מעיים, הפסק את הטיפול ופנה לרופא. במסופות והסבלים מאי-שלשה על הסטורים יש להימנע מגעג ממושך על העור עם הצואה בזמן נטילת התרופה על-ידי החלפת פדים תופכה.

אם אתה **לוקה**, או **ליתך לאחרונה**, **תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקה: תרופות משלשות אחרות, קורטיקוסטרואידים, לקורזי.

תרופות מחלות בל (למשל גליקוזידים כגון דיגיטקסין, תרופות לטיפול בהפרעות קצב לב), משתנים.

הריון והנקה:
ברק אתה בהריון או מניקה היועצי ברופא או בהקח לפני השימוש בתרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
המחפיות מכילות לקטוז, גלוקוז וסוכרוז. אם נאמר לך בעבר על-ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, היועצי ברופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

3. כיצד שתשמת בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. על-יך לבלוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא: מחפית אחת של **בקונים** לפני השינה. **אין לעבור על המנה המומלצת.** תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנים.

יש להפיד על שתיית נוזלים במשך היום שתעוזו בריכות הצואה. התרופה מעוררת פעילות מעיים לאחר כ- 8-12 שעות. שים לב: יש להכות פרז זמן של שתיים-שלוש יום נטילת **בקונים** מחפיות לבין נטילת תרופה אחרת דרך הפה.

- אין לכתוש או לחצות את המחפית, היות והתרופה בעלת ציפי מגן.
- הרבה בלוקז את המחפית בשלמותה עם גיליון נוזלים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?
מנע הערלה תרופה זו מן תרופה אחרת • יש לשמור במקום סגור וחסך היבש ידם ליום/ליום, לרמיקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. לא תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
אחסן בתרופה המכונה "C-30" • יתן להשתמש בתרופה עד 6 חודשים לאחר הפתיחה הראשונה.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועצי ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:
כמו בכל תרופה, השימוש בבקונים עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. לא תביהל למקראי שמיית תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסכול מאף אתר מנהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא בהופעת:
עוניתות בטן, רגישות יתר (גיורוד, הרתי, פריחה מקומית או כללית) (מדיר ביותה), תופעות לוואי המוחות של מערכת העיכול אשר עלולות לגרום כתוצאה משימוש כרוני או מינון יתר; עוניתות בטן, כאובות, שלשול, מינים של אובוד נוזלים אלקטרוליטים (בלבול, הפרעות בעצביות הלב, עיפות או חולשה) ו/או התכווצות שרירים, במיוחד תוך כדי שימוש עם תרופות לטיפול בלב (גליקוזידים כגון דיגיטקסין), משתנים וסטרואידים אדרנליים.

תופעות לוואי נוספות:
מאומיות בצבע השתן, בשינוי זה אין מקום לדאגה. שימוש כרוני עלול לגרום להימנאות חלבון ודם בשתן, כמו גם לסימנטיאז של המעי (pseudomelanosis coli), תופעה שאינה מזיקה וחולפת בדרך כלל לאחר הפסקת השימוש בתרופה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אין אתה מתופעות הלוואי ממחירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צויה בעלון, על-יך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדלות על תופעות לוואי למשך בריאותי באמצעות החיזה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שמצא בדף הבית של אתר משד

הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או כי נטי לקישור:
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence?method=adversesEffect&formType=AdversesEffect>
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence?method=adversesEffect&formType=AdversesEffect>

5. איך לאחסן את התרופה?
מנע הערלה תרופה זו מן תרופה אחרת • יש לשמור במקום סגור וחסך היבש ידם ליום/ליום, לרמיקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. לא תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
אחסן בתרופה המכונה "C-30" • יתן להשתמש בתרופה עד 6 חודשים לאחר הפתיחה הראשונה.

6. מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:
Sucrose, Talc, Cellulose Microcrystalline, Lactose Anhydrous, Eudragit L 30 D, Calcium Carbonate, Silicon Dioxide Methylated, Titanium Dioxide (E 171), Gelatine, Magnesium Stearate, Gum Arabic spray dried, Liquid Glucose (Dry Substance), Macrogol 6000, Polysorbate 80, Stearic Palmitic Acid, Montan Glycol Wax, Carboxymethylcellulose Sodium

יצד נראית התרופה ומה תוקן:
האריזה: בכל אריזה יש בקבוקון המכיל 45 מחפיות מבריקות מעט בצבע אפור-לבן. GmbH, ברמן, גרמניה

שם היצרן ותכונותיו: רוהה, ארצנמיטל
עלון זה נבדק ואושר על ידי משד הבריאות בתאריך: 07/2017

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשד הבריאות:
036 62 25740 00

לשם הפיסות והלקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשן זכר. על אף זאת, התרופה והמידע בעלון מיועדים לבני שני המינים.

בעל רישום: **דקסל® בע"מ**
רח' דקסל 1, אור-עקיבא 3060000, ישראל