

زريديكس

زريديكس ١٥٠، قرص
رانتيندين (كيبدرولوكوريد) ١٥٠ ملء،
Ranitidine (as hydrochloride) 150 mg

زريديكس ٣٠٠، حبوب
رانتيندين (كيبدرولوكوريد) ٣٠٠ ملء،
Ranitidine (as hydrochloride) 300 mg

المركبات غير المغالة - أنظر البند ٦ "معلومات إضافية". انظر
أضلاع البند "معلومات مهمة عن هذه من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بالعلن حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.

تحذير هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك
أسئلة إضافية، اطلب الطبيب بذلك تأخذ زريديكس قبل عملك.

إذا كنت ممتنعًا بأن تأخذ الدواء، اطلب الطبيب أو الصيدلي قبل تناول زريديكس.

لهذه، حتى إذا بدا لك أن وضع الطبي مماثل.

١. لاي غرض مخصوص الدواء؟

البالغون: زريديكس مخصوص لعلاج فرحة الأثني عشرى والفرحة المعوية
المديدة، يشمل التهارة الناتمة عن الملاج بأدوية مضادة للآهاب.

غير سينيروبيدين: زريديكس مخصوص لعلاج فرحة بعد جراحة
المتزايدة للآهاب (نار)، زريديكس مخصوص لعلاج فرحة بعد جراحة

الآهاب: زريديكس مخصوص لحالات متزايدة للآهاب وذلك قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

معلومات مهمة عن هذه من مركبات الدواء
هذا الدواء يحتوي على كلوروزن. إذا قيل لك في الماضي من قبل
الطبيب قبل ذلك عدم تناول الكرب في الجهاز الهضمي.

إذا كنت حاملًا، قد تكوني جاهلاً، تحظين للحمل، أو إذا كنت
التكميل: زريديكس يحتوي على كلوروزن الذي يزيد من خصوبة النساء.

الأطفال (٤-١٢ سنة): علاج فرصة الآهاب في الماء خلال الولاد.
جرعات تناول التباقي في المريء وتخفيف أعراض مرض الجزء

المعدى المزمني.

القياسية المائية: يتمي بمحاجة أدوية تدعى مثبطات مستقبلات H.
٢. قبل استعمال زريديكس

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

إذا كنت حساساً (رجي) المادة الغالبة (رانتيندين) أو لأحد
المركبات الإضافية الموجودة في الدواء (انظر البند ٦).

تحذيرات خاصة متقدمة باستعمال الدواء:
قبل تناول زريديكس، اخبر الطبيب إذا:

كنت تعاني أو تعاني في الماضي من خلل في وظيفة الكبد، الكلية.
كنت تعاني أو عانت في الماضي من فرحة مدة أنت تتناول

استهلاك لدى الآهاب (نار)، يجيء ١٢ سنة وما فوق: الجرعة وفق ما
هو مذكر للبالغين.

كنت تعاني من مرض البرقيرية الحادة سرطان المعدة مرض
في الرئتين، سكري.

كنت تعاني من متلازمة ايا كانت في جهاز المناعة.
٣. كف تستعمل الدواء؟

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت في الأونة الأخيرة أدوية
أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبيب وأسفلات

تغذية، اخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، ذلك لأن زريديكس

يسقط على طرفة التي تحمل بها أدوية معينة، أضفاف
خصوصاً إذا كنت تأخذ:

أدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي مثل: ديزابيم

اعراض نادرة التي قد تظهر في فحوصات الدم: فحص وظائف الكلى -ارتفاع توجه فروّالى إلى الطبيب أو إلى عرقه المطرى في المستشفى مصطبخ بيرة الدواء معك.

اعراض جلدية يبيو عنها غير معروف (اعراض التي لم يتم تحديد شيعوها بعد): إذا نسيت تناول هذا الدواء لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. يجب فرقة؛ تناول الجرعة الثانية في الوقت المعتاد واستشارة الطبيب.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما يتعافى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التخلص عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط www.health.gov.il، وللوقت لا يعتمد على تاريخ التسجيل الموجود في الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الموقع الإلكتروني للتخلص عن اعراض جانبية، او عن طريق الدخول الرابط: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence.aspx?formType=AdverseEffectMedic@mhov.gov.il>

٥. كفتهن تخزين المستحضر؟

تجنب التسمم: يجب تناول الدواء وكل دواء آخر في مكان مختلف بعيداً عن تناول أي الأطفال وأو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التسمم: يجب تناول الدواء بعد تناول انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي ظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجح إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا يجوز تخزين الدواء مختلطة في نفس العبوة.
 يجب حفظه في العبوة الأصلية.

٦. معلومات إضافية:

اضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على: Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Lactose monohydrate, Magnesium stearate, Hypermellose, Basic butylated methacrylate copolymer, Quinoline yellow Al Lake (E104), Triacetin, Titanium dioxide (E171), Iron oxide yellow (E172), Sunset yellow FCF Al Lake (E110), Carnauba wax.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

زريديكس منه أعراض: أعراض صفراء، مستديرة، مطبلة.
زريديكس ٣٠٠ ملء حبسولات: حبسولات صفراء، مطبلة، مع خط تسميم في جانب واحد.

احجام العبرات المصاصق عليها: ١٠، ٣٠، ٢٠، ١٠٠ أعراض/
حبسولات. قد لا تكون جميع أحجام العبرات مسموقة.

زريديكس ١٥٠ ملء أعراض: حبسولات صفراء، مطبلة، مع خط تسميم في جانب واحد.

زريديكس ٣٠٠ ملء حبسولات: حبسولات صفراء، مطبلة، مع خط تسميم في جانب واحد.

رق تسيج الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: زريديكس ١٥٠ ملء أعراض: ٩٢٧٧٠٠٠.
زريديكس ٣٠٠ ملء حبسولات: ١٩٤٥٢٩٢٧٠٠

لتتبسيط وتسهيل القراءة، ثبت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.
لأن المعلومات في النشرة والدواء مخصوصان لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: دكسيل م.ض.
شارع دكسل ١، أور-عكفا، ٣٦٠٠٠، إسرائيل

إذا افترطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع طفل من الدواء بالخطأ، توجه فروّالى إلى الطبيب أو إلى عرقه المطرى في المستشفى مصطبخ بيرة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. يجب فرقة؛ تناول الجرعة الثانية في الوقت المعتاد واستشارة الطبيب.

يجب المحافظة على العلاج الموسي به من قبل الطبيب، لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

يمكن التخلص عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط www.health.gov.il، وللوقت لا يعتمد على تاريخ التسجيل الموجود في الموقع الإلكتروني للتخلص عن اعراض جانبية، او عن طريق الدخول الرابط: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence.aspx?formType=AdverseEffectMedic@mhov.gov.il>

إذا نسيت عن تناول الدواء، قد يعود الألم وعدم الراحة.
لا يجوز تناول الدواء في الطعام إن حقق من المصلحة ومن الجرعة المائية التي من المفترض تناول فيها دواء، يجب وضع النظارات الطبية إذا كانت لديك أسلمة إضافية حول استعمال الدواء، استشارة الطبيب أو الصيدلي.

٧. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يحصل زريديكس على إعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تتفق في قرابة قاتمة الأعراض الجانبية لدى من الممكن أن لا تصاب بالآثار التالية:

• يجب إيقاف الاستعمال والتوجه إلى الطبيب فوراً عند ظهور:
○ تفاعلات أرجي التي قد تجلي بالآعراض التالية:
○ تغير إثناء التبول أو مفعوم في التنسف، ضيق تنفس، ضيق الصدر أو ضغط في الصدر.
○ تورم الجفنون، الوجه، الشفرين، الفم، السنان أو أجزاء أخرى من الجسم.
○ طفح الجلد، نزف، حكة أو شرى (hives) على الجلد.
○ سخونة مهولة بسبب شعور بالإعماق خاصة بالانتقال من وضعية الاستيقاظ أو الطوطي إلى الماء في النشرة.
• مشكل في الكلى، الذي قد تجلي بآلام في البطن، سخونة، آلام اثناء التبول، دم في البول ونبضات حمراء على الجلد.
• أم شديدة في البطن (من الممكن أن يكون موشرًا للتهاب التكثير).

• نظم قلب ضيق، سريري أو مرتقي.

• يجب التوجه للطبيب بسرعة وقت ممكن عند ظهور:
○ اعراض جانبية غير شائعة: ١٠٠ شخص.

• تغيرات يمكنها إحداث الماء في الدم والتي قد تجلي بـ: إرهاق، غير انتهي، ضيق تنفس، حمى إلى الکمامات أو التلوّث.

• اكتئاب، ارتجاع، طفح جلدي، تورم المفاصل، مشكل في الكلى،

• تورم العضلات أو المفاصل أو عدم القرحة على ضبط حرارتها التي قد تجلي في العدة.

• ا懋ار أو علامات على الجلد، تورم المفاصل، مشكل في الكلى،

• ا懋ار أو علامات على الجلد، تورم المفاصل، مشكل في الكلى،

• ا懋ار أو علامات على الجلد، تورم المفاصل، مشكل في الكلى،

• ا懋ار أو علامات على الجلد، تورم المفاصل، مشكل في الكلى،

• ا懋ار أو علامات على الجلد، تورم المفاصل، مشكل في الكلى،

• ا懋ار أو علامات على الجلد، تورم المفاصل، مشكل في الكلى،