

## بيكاكو ٥٠٠٪، جل للاستعمال الخارجي لجل الجسم والأطراف

يحتوي الجل على المادة الفعالة:

Ingenol mebutate 500 mcg/g (٥٠٠٪ ميكروغرام/غرام).

مواد غير فعالة: أنتر بند ٤ (معلومات إضافية).

إقرأ الشريحة يماعن حتى تهابتها قبل أن تستعمل الداء، إذا كانت لديك استهلاك الشريحة على موقع مخالقة عن الداء، إذا، كانت لديك آسفة.

اضافية، توجة إلى الصيدلي إذا.

هذا الداء وصف العلاج مرضك. لا تتعطه إلى آخر. فهو قد يسبب

الضرر لهم حتى إذا ذلك من مرضهم مثال.

### لأى غرض يخص الدواء؟

بيكاكو خصص لعلاج موضعى (خارجي على الجلد) لتشعر actinic keratosis، keratosis، القرفان السعفي هو نخشى منافق في العلاج منطبق على طرف الأصابع.

عن تعمر أكثر مما يعني الشعف حال العلاج. يبكيتو ٥٪.

خصص العلاج القرفان السعفي في جلد الجسم، الأذرع، اليدين

والرقبة.

الفصيلة العلاجية:

مضادات حيوية، مواد معالجة كيميائية لاستخدام جلدي، مواد معالجة كيميائية أخرى.

### قبل استعمال الداء

لا يجوز استعمال الداء إذا:

١. كنت حساساً (ارجح) المادة الفعالة أو أي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الداء (أنتر بند ٦ معلومات إضافية).

### تحذيرات خاصة متغيرة باستعمال الدواء

٢. قبل استخدام الماء إذا:

٣. يجب تحفظ التوب جيداً كل استعمال بيكانو، ق بزال الماء عن الأنابيب قبل الاستعمال.

٤. يجب تحفظ الجرة الموس بها.

٥. لا الاستعمال الخارجي فقط.

٦. تعليمات الاستعمال:

٧. يجب تحفظ التوب جيداً كل استعمال بيكانو، ق بزال الماء عن الأنابيب قبل الاستعمال.

٨. اضطط على الأنابيب لإخراج الجل على طرف الأصابع.

٩. ادوك (علي سبيل المثال ٥ س × ٥ سم).

١٠. اترك الماء في منطقة العلاج فقط.

١١. لا تصلف الماء بعد دفعه بعد الداء، ٦ ساعات على الأقل.

١٢. بعد الدهن، يجب تغيير النشريف فوراً بعد دفعه بعد الداء، ٦ ساعات على الأقل.

١٣. لا تنسى تسمح شخص آخر أو لحومنا ليف، بأن يلمس الماء الماء في منطقة العلاج لمدة ٦ ساعات بعد دفعه.

١٤. لا يجوز تعطية المنطقة المعالجة بضمادات التي تجحب الماء

والماء بعد دفعه بيكانو.

١٥. يمكن تغير النشريف الكامل بيكانو بعد ما يقارب ٨ أيام من العلاج.



١٦. إذا تواجدت أكثر من نصف مساحة منطقة العلاج في القسم العلوى من الرقبة، يجب تحفظ بيكانو ١٥٪ (الجل الوجه وفروة الرأس).

١٧. إذا تواجدت أكثر من نصف مساحة منطقة العلاج في القسم السفلى من الرقبة:

١٨. إذا تواجدت في الأونة الأخيرة، إذا كنت تخاطل لأحد أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأصناف تغذية،

١٩. آخر الطبيب قبل بدء العلاج، إذا استعملت في الماضي بيكانو أو أدوية مشابهة.

٢٠. يجب استثارة الطبيب قبل استعمال هذا الداء، إذا كنت مرضعة، إذا كنت تعتقدين بذلك قد تكوني حاملة، تخططن للحمل.

٢١. إذا كنت مرضعة، تجنبي ملasse الطفل لمنطقة العلاج لمدة ٦ ساعات بعد دفعه.

٢٢. الاستعمال لدى الأطفال والمرأة، لا يجوز استعمال هذا الداء

القرفان السعفي لا يظهر لدى الأطفال، لا يجوز استعمال هذا الداء

### ٤. الأعراض الجانبية

كاي دوام، قد يسبب استعمال بيكانو أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تزغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

يجب التوجه للطبيب فوراً إذا كنت تعاني من رد فعل تسمى الذي قد يتضمن نفخة الدم، اللسان أو الحلق، عند استعمال هذا الداء. هذا العرض الجانبى غير شائع.

بعد استعمال هذا الداء على ما يدور سوف يحمر الجلد في المنطقة المعالجة ويتغير وتكتل ظهير هذه الأعراض غالباً كثلاً يوم واحد من بدء الاستعمال إلى اليوم، وقد تتفاقم حتى أسبوع واحد نهائياً.

قد يحدث تآكل الجلد في المنطقة المعالجة (تم التبلق عنه) عرض جانبى شائع الذي قد يظهر لدى ١٠١ مستخدمين من بين ١٠٠، ١٠٪.

٢٣. العرض جانبى عادةً هو عرض الوجه وفروة الرأس.

٢٤. لاحظ القرفان السعفي في الجسم، في الأذرع، في اليوم بعد يومين ميكروغرام.

٢٥. لا يزيد عن ٥٪ على جلد الوجه، فإذا يحوي على البيفين.

٢٦. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه لأكثر من أسبوع واحد بعد نهاية العلاج، أو إذا يوجد إفراز قيح، قد يكون لديك ثلث وعاء واستشارة الطبيب.

٢٧. إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقم أحد الأعراض التي تظهر لدى أكثر من عيادة من عيادة، قد يتضمن الارتفاع في المنطقة المعالجة في الوجه أو فروة الرأس إلى منطقة العين.

٢٨. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه لـ ٦ أيام، قد يتضمن التهاب العين، تهاب العين، أو عيادة من عيادة.

٢٩. حوصلات جلدية قد تتأكل (تأكل).

٣٠. حوصلات جلدية قد تتأكل (تأكل).

٣١. أحمر باللون الأرجوانى بعد ما يقارب ٨ أيام من العلاج.

٣٢. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٣٣. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٣٤. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٣٥. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٣٦. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٣٧. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٣٨. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٣٩. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٤٠. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٤١. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٤٢. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٤٣. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٤٤. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٤٥. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٤٦. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٤٧. إذا تفاقمت الأعراض المذكورة أعلاه، قد يزداد الارتفاع في العلاج.

٤٨. في منطقة العلاج:

- تبليج حكة (pruritus) (٥٪)،

- تبليج أو عدم احساس (٦٪)،

- جرح، تشقق (قرحة)،

- تغير في لون الجلد (تضئيع)،

- شعور بالحرارة،

- آلام جانبية، اضافية،

- تهيج، تهيج في سطح العين (قرنية، ملتحمة)، نتيجة للتعريض عن طريق الخطأ.

- تهيج، تهيج في العلاج،

صاحب الإمتياز: دكسل م.ض.

شارع دكسل ١، أور عكيفاً، ٣٠٦٠٠، إسرائيل