

תוכן עלון זה עודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך: נובמבר 2017

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

קורסודיל שטיפת פה

חומר פעיל: כלורהקסידין דיגלוקונאט (chlorhexidine digluconate) 0.2% w/v

רשימת החומרים הנוספים מפורטת בסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת לשימוש במטופלים מעל לגיל 12 שנה. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא לפני השימוש. עליך להשתמש בתכשיר בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

- לעיכוב היווצרות פלאק
- כעזר לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים (ג'ינג'יביטיס)
- כעזר בשמירה על הגיינת הפה
- לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים
- לשימוש בכיבים, בדלקות בעקבות שיניים תותבות ובפטרות בפה

קבוצה תרפויטית: אנטיספטי

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש אם הייתה לך תגובה אלרגית לכלורהקסידין דיגלוקונאט או לאחד ממרכיבי התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 12 שנים אלא בהמלצת רופא.
- אין להשתמש בכל מקום אחר למעט הפה שלך. אין לבלוע. שטוף ביסודיות במים אם נכנס משהו לתוך העיניים או האוזניים שלך.
- במקרה של תגובה אלרגית קשה, עליך להפסיק השימוש ולגשת מיד לקבלת עזרה. ראה 'תופעות לוואי'.
- אין להשתמש מיד לאחר צחצוח השיניים שלך. ראה 'כיצד תשתמש בתרופה' למידע נוסף.
- אין להלבין בדים שהיו במגע עם שטיפת הפה.
- עלולה להופיע הכתמה זמנית של השיניים והלשון. ראה 'תופעות לוואי'.
- ייתכן ויחול שינוי בתחושת הטעם, או שתורגש תחושת צריבה. ראה 'תופעות לוואי'.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

ניתן להשתמש בתרופה אם את בהיריון או מניקה.

מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה

מקרוגולגליצרול הידרוקסיסטארט עלול לגרום לתגובות בעור.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

השתמש רק אם הסוגר על הפקק נמצא ובשלמותו לפני הפתיחה.
אין לעבור על המנה המומלצת.
אין לבלוע

משחות שיניים עלולות לפגום בפעילות של שטיפת הפה. לאחר צחצוח השיניים שלך, שטוף את פיך ביסודיות עם מים והמתן 5 דקות לפני השימוש בקורסודיל לשטיפת הפה. לחילופין, אתה יכול להשתמש בשטיפת הפה גם בזמן אחר של היום.

המינון המקובל הוא:

השתמש פעמיים ביום. מלא את הפקק עד לקו 10 מ"ל. שטוף את הפה ביסודיות למשך דקה אחת ולאחר מכן תירק. דלקת חניכיים: מומלץ להשתמש במשך חודש. כיבים בפה ופטרת פה: המשך להשתמש במשך 2 ימים לאחר החלמה. דלקות פה בעקבות שיניים תותבות: נקה והשרה את התותבות שלך בשטיפת הפה למשך 15 דקות פעמיים ביום. לאחר ניתוחים דנטליים: לשטוף לפי הוראות רופא השיניים שלך.

אם התסמינים שלך נמשכים, פנה לרופא.

אין לקחת תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקורסודיל שטיפת פה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. הפסק להשתמש בשטיפת הפה ופנה מיד לעזרה רפואית אם מופיעה אצלך פריחה, נפיחות בפה או בפנים או אם יש לך קשיי נשימה. תופעות אלה עלולות להיות תסמינים של תגובה אלרגית חמורה שהיא נדירה מאוד. הפסק להשתמש בשטיפת הפה ופנה לרופא אם מופיע אצלך גירוי בפה, כאב או נפיחות של פנים-הלחיים. תופעות לוואי אחרות שיכולות להתרחש: הכתמה זמנית של הלשון. זו נעלמת עם הפסקת הטיפול. הכתמה זמנית של השיניים. זו בדרך כלל ניתנת להסרה על ידי צחצוח. אתה יכול למנוע הכתמה באמצעות המנעות משתיית תה, קפה או יין אדום - במיוחד שעה לאחר השימוש, ועל ידי צחצוח יומיומי במשחת שיניים (ראה 'כיצד תשתמש בתרופה'). אם הכתמה נותרת היא ניתנת להסרה באמצעות ניקוי וליטוש אצל רופא השיניים או השיננית. אתה יכול לנקות את התותבות שלך באמצעות חומר לניקוי תותבות. יתכן שתבחין בשינוי בחוש הטעם, בתחושת צריבה, נימול, או דקירה בלשון כאשר אתה משתמש בשטיפת הפה לראשונה. זה בדרך כלל חולף עם המשך הטיפול. אם התופעות ממשיכות- יש לפנות לרופא. אם מתרחש קילוף של העור בתוך הפה, דלל את שטיפת הפה עם כמות שווה של מים.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא, רופא השיניים או הרוקח.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן מתחת ל- 25°C. לשימוש עד 6 חודשים מהפתיחה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם –

Purified water, Sorbitol, Glycerol, macrogolglycerol hydroxystearate and Optamint 291616 flavour.

Cor MW PT

v6_\\PTKDSNTV001\ISR_PTK_CH_Novartis_General\ISR_PTK_CH_Novartis_Regulatory\Products\CH Products\Corsodyl Mouthwash\Leaflets Update\Ongoing\Corsodyl MW Alcohol

Free_October 2017\04_Leaflet Proposal\Corsodyl-Mouthwash-PT_NOV2017_Website.Docx

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה – תמיסה שקופה, צלולה עד מעט עכורה, בריח מנטה. בקבוק של 300 מ"ל
עם פקק מתברג.
בעל הרישום:
ג'י.אס קיי קונסיומר הלת'קר ישראל בע"מ, ת.ד. 3256, פתח תקווה

יצרן: פורנה פארמציוטיקלס, פורס, בלגיה.
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות ב: יוני 2014
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 029-96-21599-00
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Cor MW PT v6