

פונגיטרים אבקה

חומרים פעילים ורכיבים ביחידת מינון:
אבעץ אונדצילנט 20%
אונדסילניב אcid 2%

לחומרים בלתי פעילים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ולתינוקות מתחת לגיל שנתיים אלא בהוראת רפואי ותוך השגחתו. עליר להשתמש בצוורה נכונה.

היוועץ ברוקח אם הנר זקוק למידע נוסף. עליר לפנות אל הרופא אם מצב מחמיר או אם משתפר לאחר 4 שבועות.

1. **למה מיועדת התרופה?**
על פניהם מיועדת למיניהם ולטיפול ב齊hommis הנגרמים על ידי פטריות כבוצה רפואי: אנטיפטריטי (Athlete's Foot).

2. **לפני שימוש בתרופה**
אין להשתמש באבקה כמינית בחרוף. במרקם של זיהום רפואי, על החוללה לשמר על תנאי הגינה מתאים כמו רוחצה לפחות פעמיים ביום במשך 4 שבועות.

3. **אין להשתמש בתרופה אם:**
• אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה.
• העור פצע.

4. **אין להשתמש בתרופה אם:**
• אם הנר רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליר להודיע על כך.

ה קישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (il.gov) המפנה לטופס המופיע לדיווח על תופעות לוואי.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים /או תינוקות ועל ידיך תמנע הרעללה. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (Exp. date) המופיע על גבי האריזה/תוויות תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- סגור היטב את המיכל ומגע חידרת אויר ורטיבות.
- יש לאחסן במקום קרייר ויבש, מתחת ל- 25°C.

6. **מידע נוסף:**
נוספף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
Talc, Colloidal silicon Dioxide, Terpineole
כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה?
מיכל פלסטיק המכיל 80 גרם אבקה עצבע לבן בעלת ריח טרפיניאול.

בעל הרישום והיצור: רקח תעשייה פרמצטטיבית בע"מ, רח' המלכה 30 חולון
עבור: תרימה חברה למסחר (1961) בע"מ, מעברות 40230000 ישראל.
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות ביוני 2017
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות
00-35250-158-59-59

לשם הפניות ולהקלת הקירה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעלILD מילן התchapfa:
• פונה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה
איתך.

• בילעה של התכשיר עשויה לגרום לתסמיים הבאים: בחילה, הקאות
והפרעות אחרות במערכות הגוף.
• אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?
לחות מעודדת את צמיחת הפטריות. לכן יש לשמר על יושב במקום הנגוע
יש לרוחץ את האזור הנגוע לפני כל שימוש בתרופה.
אם הטיפול ברגליים - יש להקפיד על רוחיצה יסודית ויבש במיוחד בין
הבהונות. רצוי להשתמש בגarbims מוכתנה, יש להימנע מללבוש גרבים
מצמר או מחגורים סינטטיים. רצוי להחליפה מספר פעמים ביום (לפי
כמות הזיהה).

בעונת המתאימות מומלץ לנערו סנדלים ללא גרבים.
אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנר נועל
תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.
4. **תופעות לוואי:**

כמו בכל תרופה, השימוש בפונגיטרים עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק
ההמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסובל
מאף אחת מהן.

יש לפנות לרופא אם מתפתחות התופעות הבאות:
גירוי מקומי, דלקת או פריחה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חממייה, או כאשר
אתה סובל מהתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליר להתייעץ עם הרופא.
דיווח על תופעות לוואי:
ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על

לרופא לפני נטילת התרופה.
• המגע מגע עם העיניים ומשאית החומר.
לפני הטיפול בפונגיטרים ספר לרופא אם:

• הנר סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד כלי הדם.
• הנר סובל מסוכרת.

אם אתה לוקח, או אם לךחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח תכשיר אחר
לשימוש מקומי על אותו אזור בעור.

הריון והנקה:
אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש,
מכיוון שאין מידע לגבי בטיחות השימוש בזמן הנקה או הריון.

3. **כיצד תשמש בתרופה?**
עליר לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח לגבי השימוש.
המיועץ ברוקח הוא: פעמיים ביום לשימוש בין אכבעות הרגליים,
ובגרבים ובנעליים. לפני השימוש יש לנקות את האזור הנגוע ומסביבו
וליבשו היטב. יש להמשיך ולפדר את הרגליים גם לאחר הריפוי במשך
שבועיים ימיים על מנת למנוע הופעה חוזרת של הבעיות הפטריות. כמו
כך ניתן להשתמש באבקה כאמצעי מניעתי בחרוף.

במרקם של זיהום רפואי, על החוללה לשמר על תנאי הגינה מתאים
כמו רוחצה לפחות פעמיים ביום במשך 4 שבועות.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ולתינוקות מתחת לגיל שנתיים
אליה בהוראת רפואי ותוך השגחתו. אם לא חל שיפור במצבך תוך 4
שבועות יש לפנות לרופא.
אין לעبور על המנה המומלצת.
אין לבלועו, לשימוש חיצוני בלבד.
תכשיר זה אינן יעיל בשימוש על הקרקפת או הציופוריים.