

הודעה על החומרה (מידע בטיחות) בעלון לרופא
(מעודכן 05.2013)

תאריך : 29/11/2017

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום : Eumovate Cream (043-34-23785)

שם בעל הרישום : GlaxoSmithKline (ISRAEL) Ltd

טופס זה מיועד לפרוט החומרות בלבד !

התחומרות המבוקשות		
טקסט חדש	טקסט נוכחי	פרק בעלון
<p>Paediatric population <u>Children are more likely to develop local and systemic adverse reactions of topical corticosteroids and, in general, require shorter courses and less potent agents than adults.</u> <u>Use in children under 12 years should be on the advice of a doctor.</u></p> <p>Care should be taken when using clobetasone to ensure the amount applied and duration of treatment is the minimum that provides therapeutic benefit.</p> <p>Duration of treatment for children and Infants <u>When clobetasone is used in the treatment of dermatoses in children, extreme caution is required and treatment should not normally exceed 7 days.</u> If the condition worsens or does not improve within 7 days, treatment should be withdrawn and the child re-evaluated/reviewed. Once the condition has been controlled, the frequency of application should</p>	<p>Paediatric population Children are more likely to develop local and systemic adverse reactions of topical corticosteroids and, in general, require shorter courses and less potent agents than adults</p> <p>Care should be taken when using clobetasone to ensure the amount applied is the minimum that provides therapeutic benefit</p> <p>Duration of treatment for children and Infants If the condition worsens or does not improve within 7 days, treatment should be withdrawn and the child re-evaluated.</p> <p>Once the condition has been controlled, the frequency of application should be reduced to the lowest effective dose for the shortest time possible.</p>	Posology and Method of Administration

be reduced to the lowest effective dose for the shortest time possible.

Continuous daily treatment for longer than four weeks is not recommended in children.

Paediatric population

When clobetasone is used in the treatment of dermatoses in children, extreme caution is required and treatment should not normally exceed seven days; shorter courses of treatment and less potent agents than those used for adults are required.

Children are more likely to develop local and systemic adverse reactions due to the use of local corticosteroids because of their higher surface area to body mass ratio and, in general, require a shorter treatment.

Particularly, in infants and toddlers the diaper can be considered as an occlusive dressing and therefore can enhance absorption

In infants and children under 12 years of age, long-term continuous topical corticosteroid therapy should be avoided where possible, as adrenal and growth suppression is more likely to occur

[...]

Visual disturbance

Visual disturbance may be reported with systemic and topical corticosteroid use. If a patient presents with symptoms such as blurred vision or other visual disturbances, the patient should be considered for referral to an ophthalmologist for evaluation of possible causes which may include cataract, glaucoma or rare diseases such as central serous chorioretinopathy (CSCR) which have been

Continuous daily treatment for longer than four weeks is not recommended

Paediatric population

When clobetasone is used in the treatment of dermatoses in children, extreme caution is required and treatment should not normally exceed seven days; shorter courses of treatment and less potent agents than those used for adults are required.

In infants and children under 12 years of age, long-term continuous topical corticosteroid therapy should be avoided where possible, as adrenal suppression is more likely to occur

[...]

Special Warnings and Precautions for Use

reported after use of systemic and topical corticosteroids.

[...]

Eye disorders

Not known Vision, blurred

[...]

[...]

[...]

Undesirable effects

מצ"ב העלון, שבו מסומנות החומרות המבוקשות **על רקע צחוב**. (טקסט שהתווסף מסומן בכו תחתו).
שינויים שאינם בגדר החומרות סומנו (בעלו) בצבע שונה. יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום הטקסט.

הועבר בדואר אלקטרוני בתאריך 29/11/2017

כל השינויים עולים בקנה אחד עם תנאי הרישום (תעודת הרישום, תעודה האיכות וטופס פרטי התכשיר העדכני).
 כל הכתוב בהצעת העalon, توأم את תנאי הרישום.
 קיים עלון לצרכן והוא מעודכן בהתאם.

אישור הניל אושר על ידי רשות הבריאות ב- UK.
אישור המומונה של חברת: GSK מצהיר bahwa כי אין שינויים נוספים, מלבד אלה שסומנו בהצעת העalon.

אני מצהירה כי השינויים אינם יוצרים סתירה פנימית במידע בעלו.
עלון זה לא מטופל במקביל במסגרת אחרת (כגון: עדכון עלון במסגרתבקשת לתוספת התוויה, החמורה וכו'). במידה וקיים טיפול מקביל במסגרת אחרת- יש לציין זאת.

חתימת הרוקחת המומונה (שם וחתיימה) שרית רוזן

שרית רוזן
רוקחת ממונה
מ.ר. 3-109223
GlaxoSmithKline (Israel) Ltd

הודעה על החומרה (מידע בטיחות) בעלון לצרכן

(מעודכן 05.2013)

תאריך: 29/11/2017

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום: Eumovate Cream (043-34-23785)

שם בעל הרישום: GlaxoSmithKline (ISRAEL) Ltd

טופס זה מיועד לפרט החומרות בלבד!

התחומרות המבוקשות

פרק בעלון	טקסט נוכחי	טקסט חדש
ازהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה	<ul style="list-style-type: none">היתה לך בעבר תגובה אלרגית לסטראיד אחר.אתה משתמש ביומובט קرم לכיב כרוני ברגל מאחר אתה עלול להיות בסיכון מגבר לתגובה אלרגית מקומית או זיהום.קיבלת הוראה מהרופא שלך להשתמש בתרופה זו מתחת לחבישה אוטומה (כולל חיתול של יד). יש לוודא כי העור נקי לפני חבישה חדשה על מנת למנוע זיהומים.חייבת הוראה מהרופא שלך לשלב ספיגת הרכיב הפעיל דרך העור. כך אתה עלול להשתמש בטעות לשימוש במינון גבוה מדי.אתה מורה על עורך דק כמו הפנים, היות והעור דק יותר ועלול לספגג כמויות גדולות יותר. אין להשתמש בתחבותות או רטיות על גבי הפנים במקומות שבкарם גמרת.אתה מורה על הפנים במשך תקופה ארוכה של זמן מסוים וזה עלול לגרום לדילול הידקקות העור.אתה מורה את הקرم תחת חבישה אוטומה, כולל חיתול של ידיהם. חבישות אלה מקלות על הרכיב הפעיל לעبور דרך בכמות גבוהה מדי של קרטן.	<ul style="list-style-type: none">דבר עם הרופא או הרוקח שלך לפני השימוש ביומובט קرم אם:היתה לך בעבר תגובה אלרגית לסטראיד אחר.אתה משתמש ביומובט קرم לכיב כרוני ברגל מאחר ואתה עלול להיות בסיכון מגבר לתגובה אלרגית מקומית או זיהום.אתה מורה את הקرم תחת חבישה אוטומה, כולל חיתול של ילדים. חבישות אלה מקלות על הרכיב הפעיל לעبور דרך העור. כך אתה עלול להשתמש בטעות בכמות גבוהה מדי של קרטן.יש לך פסורי-אזיס (ספחתי), הרופא שלך ירצה לראות אותך לעיתים קרובות יותר.אתה מורה את הקرم על עור סדק או בתוך קפל העור.אתה מורה ליד העיניים או על העפעפיים, מאחר וקטרקט או גלאוקומה עלולים להיווצר אם הקرم נכנס לעין שוב ושוב.אם בלעת בטעות, שטוף את הפה עם הרבה מים ופנה מיד לרופא או לרוקח לקבלת ייעוץ.

- יש לך פסוריADS (ספחתי), הרופא שלך ירצה לראות אותך לעיתים קרובות יותר.
 - אתה מורה את הקرم על עור סדוק או בתוך קפל העור.
 - אתה מורה ליד העיניים או על העפעפים, לאחר וקטרקט או גלאוקומה עלולים להיווצר אם הקرم נכנס לעין שוב ושוב.
 - אתה מורה על עור דק כפו הפנים או על ילדים-אף על הסpag-מארם דק יותר מאשר של מבוגרים וכטשאה מכר עלול לסתוג כמושת גדלות יותר.
 - אין להשתמש בתחבושים או רטיזות על ילדים-או על הפנים במקום שבו הקرم נמרת.
 - אתה מורה על הפנים במשך תקופה זמן אורך כיוון שההעלול לגרום להידקהות העור.
 - השימוש בילדים צריך להיות מוגבל ל 7 ימים.
 - אם בלעת בטיעות כמות גדולה של יומבט קרכט, שטוף את הפה עם הרבה מים ופנה מיד לרופא או לרוקח לקבלת יועץ.
 - אם מתפתח ziehom (ראה סעיף 4, טופעות לווא).
- במידה שיש פגעה כליתית או כבדית: במקורה של חסיפה סיסטמית (כאשר המריחה מתבצעת על משטחי גוף גדולים למשך תקופות ממושכות) יתכן והפינוי של התרופות ירד; וכן, יש למרוח את הכמות המינימלית, למשך זמן קצר על מנת להשיג תועלות קליביות.**

צור קשר עם הרופא שלך אם אתה חוווה ראייה מוטשטשת או הפרעות ראייה אחרות

- טיפול בילדים מתחת לגיל 12 לא אמרו למשך מעל 7 ימים בדרך כלל.
- טיפול يوم יומי ממושך בילדים עלול להשפיע על הגידילה שלהם. טיפול يوم יומי չציף למשך זמן אחר יותר מ- 4 שבועות אין מומלץ.

ילדים

[...]

- **במידה שיש פגעה כליתית או כבדית: במקורה של חסיפה סיסטמית (כאשר המריחה מתבצעת על משטחי גוף גדולים למשך תקופות ממושכות) יתכן והפינוי של התרופות ירד; וכן, יש לנחיות למליחת הקرم**

[...]

הנחיות למליחת הקرم

[...]

<p>הנחיות לمراجعة הקרט</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • אין לשימוש ילדים מתחת לגיל 12 אלא אם קיבלת הוראה מהרופא. • אם המצב מחייב או שאין משתפר תוך 7 ימים, יש להיעזץ ברופא. • לאחר שה מצב משתפר, יש להקטין הן את הכמות הנדרשת, והן את תדירות המריחה עד למינימום הכרחי להגלת התסמיינות. • אל תשמש כל יום במשך יותר מ- 4 שבועות בכל פעם. 		
<p>תופעות לוואי שתדיירותן אינה ידועה</p> <p>- ראייה מוטשטשת</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>----</p> <p>[...]</p>	<p>תופעות</p> <p>לוואי</p>

מצ"ב העלון, שבו מסומנות **ההכרחות המבוקשות על רקע צהוב**. (טקסט שהתווסף מסומן בקו תחתון) שינויים שאינם בוגר ההכרחות סומנו **(עלון)** בצבע שונה. יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום הטקסט.

הועבר בדואר אלקטרוני בתאריך 29/11/2017

כל השינויים עולים בקנה אחד עם תנאי הרישום (תעודת הרישום, תעודה האיכות וטופס פרטי התכשיר העדכני).
 כל כתוב בהצעת העלון, תואם את תנאי הרישום.

קיימים עלון לצרכך והוא מעודכן בהתאם.


אישורת האסמכתא מצ"ב: UK SPC v.6 (approved from 13/10/2017); UK PIL v.6 (approved from 13/10/2017).

השינוי הנ"ל אושר על ידי רשות הבריאות ב- UK.

אני, הרוקחת הממונה של חברת: GSK מצהיר בזו כי אין שינויים נוספים, מלבד אלה שסומנו בהצעת העלון.
 אני מצהירה כי השינויים אינם יוצרים סטרורה פנימית במידע עלון.

עלון זה לא מטופל במקביל במסגרת אחרת (כגון: עדכון עלון במסגרת בקשה לתוספת התוויה, החמרה וכו'). במידה וקיים טיפול במקביל במסגרת אחרת- יש לציין זאת.

חתימות הרוקחת הממונה (שם וחתימה) שרית רוזן

 דוחצת ממונה
 3-109223
GlaxoSmithKline (Israel) 
29/11/17