

سينوكيلير أقراص مطليّة

معلومات للسكريين: قرص مطلي واحد من سينوكيلير يحتوي بالمعدل ما يقارب ٢٠ غرام كربوهيدرات.
الدواء سينوكيلير لا يحتوي على جلوتين.

٣. كيفية استعمال الدواء؟
عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.
الجرعة المتبعة عادة في البالغين والأطفال فوق جيل ١٢ سنة: قرص مطلي واحد من سينوكيلير،
٣ مرات في اليوم. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة استعمال الدواء سينوكيلير: يجب تناول قرص مطلي واحد من سينوكيلير ٣ مرات في اليوم (صباح، ظهر ومساء). يجب تناول القرص المطلي مع سائل للشرب (مثلاً كأس ماء).

سحق/شطر/مضغ: لا يجوز سحق أو مضغ أو شطر القرص المطلي.

مدة العلاج بالدواء سينوكيلير: في غياب تعليمات أخرى من الطبيب، مدة استعمال الدواء هي ٧ حتى ١٤ يوماً.
يجب التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد ٤-٧ أيام.
من استعمال الدواء أو في حال عادت وتكررت أعراض المرض.

إذا أفرطت بالخطأ بتناول الجرعة عليك اعلام طبيبك. سيقرر هو إذا كان هناك حاجة للقيام بأي عمل.
إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.
في حالة الإفراط في الجرعة، من الممكن أن تكون الأعراض الجانبية نتيجة استعمال الدواء أشد.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المخصص، لا بجور تناول جرعة مضاعفة.
خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الصيدلي أو الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء: إيقاف العلاج عادة غير مصحوب بأعراض فطام أو أعراض خاصة.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أي أسلنة إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٢. قبل استعمال الدواء: ☒ لا يجوز استعمال الدواء:

إذا كنت حساساً (أرجي) لواحد أو أكثر من أنواع النباتات التالية: فيريينا (Verbena), جينتيان (Gentian), حميض (Common Sorrel), البيلسان (Elder), زهرة الربيع (Primula) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.
قائمة المركبات الإضافية مفصلة في بند ٦.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء:
!
إذا توجه إلى الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد ٤-٧ يوماً من استعمال الدواء أو في حال تعاود وتكرر أعراض المرض.

الأطفال والمراهقين: لا يجوز استعمال الدواء سينوكيلير في الأطفال تحت جيل ١٢ سنة ذلك لأنه لا توجد معلومات كافية بخصوص استعمال الدواء في هذه الأعمار.

!
إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. غير معروف حتى الآن عن تفاعلات بين سينوكيلير وأدوية أخرى.

استعمال الدواء والغذاء: يمكن تناول الدواء سينوكيلير مع الغذاء، مع الشراب، أو بدون أي صلة بالغذاء.
إذا كانت لديك حساسية معروفة في جهاز الهضم، يوصى بتناول الدواء سينوكيلير بعد الوجبات.

الحمل والإرضاع: إذا كنت حامل أو مرضعة يجب استشارة الصيدلي أو الطبيب قبل استعمال الدواء سينوكيلير.
كما في أدوية أخرى، استعمال سينوكيلير أثناء الحمل أو الإرضاع يتم بعد تقدير الخطير مقارنة بالفائدة من قبل الطبيب المعالج.

السيادة وتشغيل الماكينات: لا توجد تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء سينوكيلير أثناء السيادة أو تشغيل الماكينات.
معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء:
الدواء سينوكيلير يحتوي على جلوكونز، لاكتوز، سوكروز وسوربيتول.
عليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء سينوكيلير إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة.

المواد الفعالة وكميتها في وحدة جرعة:

Each coated tablet contains:

Verbena herb, powdered 36 mg; Gentian root, powdered 12 mg; Common Sorrel herb, powdered 36 mg; Elder flower, powdered 36 mg; Primula flower with calyx, powdered 36 mg.

كل قرص مطلي يحتوي على:
مسحوق نبتة فيريينا ٣٦ ملغم، مسحوق جذر جينتيان ١٢ ملغم، مسحوق نبتة الحميض ٣٦ ملغم، مسحوق زهور البيلسان ٣٦ ملغم، مسحوق زهرة الربيع ٣٦ ملغم.

للمعلومات هامة عن جزء من مركبات الدواء – انظر بند ٦.
للمعلومات هامة عن جزء من مركبات الدواء – انظر بند ٢.

اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسلنة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

الدواء سينوكيلير مخصص للبالغين وللأطفال فوق جيل ١٢ سنة.
عليك تناول الدواء حسب التعليمات في بند الجرعة من هذه النشرة.
يستشير الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.
علىك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد ٤-٧ أيام.
من استعمال الدواء أو في حال تعاود وتكرر أعراض المرض.

١. لأى غرض مخصوص الدواء؟

الدواء سينوكيلير مخصوص لتخفيف الأعراض في الأنف والجيوب الأنفية المصحوبة بالرشح، في البالغين وفي الأطفال فوق جيل ١٢ سنة.
تشمل هذه الأعراض: احتقان في الأنف، رشح الأنف، ألم رأس وألم في الوجه في منطقة الجيوب الأنفية.
الفئة العلاجية: دواء نباتي لعلاج الرشح.

٤. الأعراض الجانبية:

كل أي دواء، قد يسبب استعمال سينوكلير أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تنزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

الأعراض الجانبية التي تتطلب انتباه خاص:

يجب إيقاف استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ عند ظهور أول علامة لرد فعل أرجي شديد الذي يتميز بانفاس الشفتين، انفاس في اللسان، انتفاخ في الحلق وأو البلعوم المصحوب بتضيق في مجرى التنفس (وذمة وعانية)، ضيق تنفس وانفاس الوجه. شيوخ هذه الأعراض الجانبية نادر.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) التي تظهر لدى ١٠٠١ مستخدمي الدواء من بين ١,٠٠٠ قلة راحة في جهاز الهضم (الم بطن، غثيان).

أعراض جانبية نادرة (rare): التي تظهر لدى ١٠٠١ مستخدمي الدواء من بين ١٠,٠٠٠ أعراض حساسية في الجلد مثل طفح أحمرار وحكة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود

في صفحة البيت في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الموجه للاستماراة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

٥. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع وبذلك تمنع التسمم.

لا تنسى التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة وأو الواجهة.

تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
شروط التخزين: لا يجوز التخزين بدرجة حرارة التي تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.

٦. معلومات إضافية

إضافة للمواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على المواد الغير فعالة التالية: Sucrose, talc, lactose monohydrate, calcium carbonate, potato starch, maize starch, dextrin, silica (colloidal anhydrous), stearic acid, titanium dioxide, liquid glucose, gelatin, shellac, light magnesium oxide, sorbitol, basic butylated methacrylate copolymer, montan glycol wax. Riboflavin (E101), indigo carmine (E132), aluminium hydroxide, cuprum chlorophylline (E141), castor oil (refined).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: يبدو الدواء سينوكلير كقرص مطلي أخضر، مدور ومحدب أملس وبدون خط تنcliffe. الأثيراصل المطلية مغلفة بلوبيات بلاستيك ("بليستر"), التي تم تغليفها بعبوات كرتون. **حجم العبوة:** الدواء سينوكلير يزود بعلبة كرتون تحتوي لوبيحة بلاستيك وبها ٢٠ قرص مطلي.

صاحب الإمتياز والمستورد: دكتور سموئيلوف استيراد وتسويقه م.ض., شركة خصوصية ٥١٢٦٠٩٤٤، ص.ب. ٢٤٨٦، رعنانا ٤٣٦٥٠٧، هاتف: .info@drsamuelov.co.il

المُنْتَج: بيونوريكا SE، نوماركت ٩٢٣١٨، ألمانيا.

فحصت هذه النشرة وتم المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في أيار ٢٠١٧.
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

١٥٨٠٥٧٣٤٦٨٢٠٠ من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.