

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال لدى الحيوانات فقط

الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى إستمارة خاصة معدّة للتبليغ عن
الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

٦. الحيوانات المستهدفة القطط

٧. طريقة الإعطاء والجرعة للحيوانات المستهدفة جرعة مفردة: تُعطى عن طريق الفم.

مقدار الجرعات الموصى بها هي: ٢٠ ملغ/كغم بيرانتيل (مساوي بالقيمة لـ ٥٧,٥ ملغ/كغم بيرانتيل
إمبونات) و- ٥ ملغ/كغم پرازيكوانتيل. هذا مساوي بالقيمة لقرص واحد لـ ٤ كغم وزن جسم.

قائمة جرعات:

أقراص	وزن جسم (كغم)
٢/١	١,٠ - ٢,٠
١	٢,١ - ٤,٠
٢/١ ١	٤,١ - ٦,٠
٢	٦,١ - ٨,٠

يجب إعطاء الأقراص للقط بصورة مباشرة، لكن إذا لزم الأمر يمكن دمجها مع الطعام.

٨. طريقة استعمال المستحضر

من أجل ضمان إعطاء جرعة ملائمة، يجب تحديد وزن الجسم بدقة قدر الإمكان.

٩. مدة الانتظار لا ينطبق.

١٠. تحذيرات

- تحذيرات خاصة تتعلق بالاستعمال على الحيوان المستهدف
بإمكان الطفيليات تطوير مقاومة لمجموعة معينة من الأدوية المضادة للديدان نتيجة
استعمال متكرر ومتوال بالدواء المضاد للديدان من مجموعة هذه الأدوية.

١. اسم الدواء البيطري، شكله وقوته پرازيتيل بيطري أقراص للقطط

٢. المادّة الفعّالة

كل قرص يحتوي على:

پرازيكوانتيل (Praziquantel) ٢٠ ملغ، بيرانتيل إمبونات (Pyrantel Embonate) ٢٣٠ ملغ.

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية: أنظر البند ١٣ "معلومات إضافية".

٣. لم أعدّ الدواء؟

لعلاج الديدان الشريطية (الوحيدة) والديدان المدوّرة لدى القطط.

المجموعة العلاجية:

أدوية مضادة للديدان.

٤. موانع الاستعمال

يُمنع استعمال المستحضر سوياً مع مستحضرات تحتوي على پيپرازين (piperazine).

يُمنع الاستعمال على القطيطات التي عمرها أقل من ستة أسابيع.

يُمنع استعمال المستحضر لعلاج الحيوانات التي معروف بأنها تعاني من حساسية للمركبات
الفعّالة أو لكل واحد من المركبات الغير فعّالة.

يُمنع استعمال هذا المستحضر أثناء الحمل.

٥. الأعراض الجانبية

غير معروف.

إذا لاحظت أي أعراض جانبية خطيرة، يجب تبليغ الطبيب البيطري.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ
عن أعراض جانبية نتيجة علاج بالأدوية" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة

١٢. تعليمات بخصوص إبادة المستحضر / بقايا المستحضر عند الانتهاء من الاستعمال

تخلص فوراً من الأقرص المقسومة الى نصفين التي لم تستعملها.

كل مستحضر طبيّ بييطري لم يتم استعماله أو نفايات مصدرها من مستحضرات طبيّة بييطرية كهذه، يجب التخلص منها بموجب التعليمات والإجراءات المحلية.

يُمنع إلقاء أدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت.

اسأل طبيبك البييطريّ بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد هناك حاجة إليها. إنّ ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

١٣. معلومات إضافية

• بالإضافة إلى المواد الفعّالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Maize starch, Microcrystalline Cellulose, Crospovidone, Magnesium Stearate, Colloidal Anhydrous Silica, Opadry complete film coating System 03F28415 White, Grilled meat flavor.

• كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

أقرص مطليّة بلون أبيض - كريم، مستديرة مع خط للشطر من جهة، وملساء من الجهة الأخرى. يتم التسويق في عبوة من ١٠٤ أقرص.

صاحب التسجيل: إي.إل. ميدي - ماركت م.ض.، شارع هخدر ١٨، نتانيا ٤٢١٣٨.

اسم المنتج:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co.Galway, Ireland.

تم فحص هذه النشرة والتصديق عليها من قِبل وزارة الصحة في تاريخ: شباط ٢٠١٧.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحة: ٠٠ - ٣٤٥٢٢ - ٩٨ - ١٥٧.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

تُستخدم البراغيث كمستضيفات وسط لنوع منتشر من الديدان الشريطية - *Dipylidium caninum*). احتمال الإصابة بالعدوى مرة أخرى بالديدان الشريطية هو أمر حتمي إذا لم يتم العمل ضد مستضيفات الوسط، مثل البراغيث، الفئران وغيرها.

• تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص الذي يُقدم العلاج بالمستحضر
في حال البلع عن طريق الخطأ، توجه للحصول على مساعدة طبيّة واعرض على الطبيب النشرة الموجودة داخل العبوة.

من أجل الحفاظ على نظافة ملائمة، الأشخاص الذين يعطون الأقرص للقط بصورة مباشرة، أو الذين يضيفونها لطعام القط، يجب عليهم غسل أيديهم بعد ذلك.

لعلاج الحيوانات فقط.

• الحمل والإرضاع

يُمنع استعمال هذا المستحضر أثناء الحمل لكن يمكن استعماله في فترة الإرضاع.

• ردود فعل مع أدوية أخرى وأنواع أخرى من التفاعلات
لا تستعمل المستحضر سوياً مع مستحضرات تحتوي على مركبات پيپرازين (piperazine).

• فرط الجرعة

بعد تناول جرعة حجمها أكبر بخمس أضعاف من الجرعة الموصى بها، ظهرت أعراض عدم التحمل مثل التقيؤ.

١١. تعليمات التخزين

• تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن تناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم.

• يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير في نفس الشهر.

• يُمنع الخزن فوق الـ ٢٥°C.

• يُمنع إخراج الأقرص من العبوة حتى استعمالها.