

كانت حملات بدء الشهر الثالث (يُفضل أيضاً الانتعاش عن استعمال إينالبري في بداية الحمل، انظري الفصل 2 "الحمل والرضاعة") من ذلك الدواء ينبغي توخه أثناء الحمل والتمتع بالصحة في وقت لاحق من الحمل. كما ينبغي تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على الكحول أو غيرها من المواد التي قد تتداخل مع العلاج. يجب تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على الكحول أو غيرها من المواد التي قد تتداخل مع العلاج. يجب تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على الكحول أو غيرها من المواد التي قد تتداخل مع العلاج.

2. قبل استعمال الدواء:
 قبل استعمال الدواء يجب تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على الكحول أو غيرها من المواد التي قد تتداخل مع العلاج. يجب تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على الكحول أو غيرها من المواد التي قد تتداخل مع العلاج.

1. لأي عرض محدد هذا الدواء:
 إذا تعرضت لأي عرض محدد من أعراض الحمل، يجب إبلاغ الطبيب فوراً. يجب تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على الكحول أو غيرها من المواد التي قد تتداخل مع العلاج. يجب تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على الكحول أو غيرها من المواد التي قد تتداخل مع العلاج.

هذا الدواء ينبغي توخه أثناء الحمل والتمتع بالصحة في وقت لاحق من الحمل. كما ينبغي تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على الكحول أو غيرها من المواد التي قد تتداخل مع العلاج. يجب تجنب تناول الأدوية التي تحتوي على الكحول أو غيرها من المواد التي قد تتداخل مع العلاج.

Enalapril Maleate 5 mg
 كل قرص إينالبري 5 ملغ يحتوي على إينالبريل مالميت 5 ملغ -
Enalapril Maleate 10 mg
 كل قرص إينالبري 10 ملغ يحتوي على إينالبريل مالميت 10 ملغ -
Enalapril Maleate 20 mg
 كل قرص إينالبري 20 ملغ يحتوي على إينالبريل مالميت 20 ملغ -
Enalapril Maleate 30 mg
 كل قرص إينالبري 30 ملغ يحتوي على إينالبريل مالميت 30 ملغ -

إينالبري 5، 10، 20، 30 ملغ
 أقراص:
 التركيبة:
 كل قرص إينالبري 5 ملغ يحتوي على إينالبريل مالميت 5 ملغ -
Enalapril Maleate 5 mg
 كل قرص إينالبري 10 ملغ يحتوي على إينالبريل مالميت 10 ملغ -
Enalapril Maleate 10 mg
 كل قرص إينالبري 20 ملغ يحتوي على إينالبريل مالميت 20 ملغ -
Enalapril Maleate 20 mg
 كل قرص إينالبري 30 ملغ يحتوي على إينالبريل مالميت 30 ملغ -
 لقائمة المواد غير الفعالة، راجع الفصل 6 - معلومات إضافية

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) 1986
 تم تحديث محتوى هذه النشرة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة في تاريخ: تشرين الثاني 2017

لا يجوز استعمال الدواء إذا تطبقت إحدى الحالات الموصوفة أعلاه، إذا لم تكن متأكدًا، فاستشر الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

- **تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:**
- قبل علاج إينالبري وخلاله، يجب إخبار الطبيب إذا:
 - كان لديك ضغط دم منخفض (قد يتمثل بالضعف، الإغماء أو الدوار خاصة عند الانتقال إلى وضعية الوقوف).
 - كانت لديك مشاكل في الأوعية الدموية في الدماغ.
 - كنت تعاني من تضيق صمام في القلب (تضيق الصمام التثالي الشرف) أو تضيق الشريان الأبهر أو إذا كنت تعاني من مشكلة في القلب (مرض تضخم عضلة القلب). هذه الحالات تقل من جودة جريان الدم من القلب.
 - كانت لديك مشاكل في الكلية (بما في ذلك تضيق الشريان الكلوي أو أنك قد خضعت لزراعة الكلية) لأن العلاج بالدواء قد يسبب مستوى مرتفعاً لليوسيوم في الدم، قد يكون خطيراً. قد يضطر الطبيب لمعالجة مستوى اليوسيوم في دمك وتغيير الجرعة الدوائية لإينالبري وفقاً لذلك.
 - كنت تستعمل أحد الأدوية التالية لعلاج فرط ضغط الدم:
 - أدوية من فصيلة حاليجات مستقبل الأجنوتيسين II (ARBs) مثل فالسارتان، تلميسارتان، إيريسارتان، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلىتين تتعلق بالسكري.
 - ليسكوبين.
 - كانت لديك مشكلة في الجهاز الهضمي مثل: مستوى منخفض أو انعدام لخلايا الدم البيضاء (نوتروپينيا - قلة العوزلات)، الجرثونوسيزيس - ندر - مستوى منخفض (التهابات)، مستوى منخفض لصفائح الدم (نزومونوسيتينا - قلة الصفائح)، مستوى منخفض لخلايا الدم الحمراء (الانيميا - فقر الدم). عانيت ذات مرة من رد فعل تحسسي (وخمة وعائية). تشمل الأعراض: الحكمة، العلامات الحمراء على اللسان، القدمين والحجر، والتخاق في الوجه، حرق العينين، في الشفتين، واللسان أو الحنجرة، مع صعوبات في البلع أو التنفس. انتبه إلى أن مقلبي العلاج ذوي البشرة السمراء معرضون أكثر من غيرهم لحظ الأصبغة ببرد الفعل هنا، عند العلاج بميثيلات الإيزيم المحول للأجنوتيسين.
 - كنت تخضع لعلاجات الدياليزا (غسيل الكلى)، تستعمل أدوية مزدة للبول أو تتعجب حمية غذائية قليلة الأملاح أو عانيت من تقيؤات أو حالات إسهال عينية.
 - كنت تعاني من السكري. يجب عليك مراقبة مستوى السكر المنخفضة في الدم، خاصة خلال الشهر الأول للعلاج. قد يكون هناك أيضاً ارتفاع في مستوى اليوسيوم في الدم.
 - كنت تستعمل إصفاة لليوسيوم، مدرات البول المخدرة لليوسيوم أو بدائل الملح التي تحتوي على اليوسيوم.
 - كنت حاملاً أو مرضعاً، تطبين أنك قد تكونين حاملاً أو تحظنين للحمل. لا يوصى باستعمال الدواء في بداية فترة الحمل. لا يجوز استعمال الدواء بعد الشهر الثالث للحمل، لأن استعمال الدواء في هذه المرحلة قد يسبب ضرراً طفيفاً لنشيداً للطفل الرضيع (النظري البدن 2 "الحمل والرضاعة" والبند "لا يجوز استعمال الدواء إذا").
 - كنت فوق سن الـ 70.
 - كنت تعاني من مرض الكلىين في الأوعية الدموية مثل: بويوس (التنبية الحامية)، التهاب الفصائل الروماتويدي، الفصائل الجاندي (سكتير ويدرما)، كنت تستعمل أدوية لتثبيث جهاز المناعة، كنت تستعمل الدواء الوبوريفول أو بروفكينايدو أو كليهما معاً.
 - كنت حسياساً لغذاء ما أو لدواء ما.
 - كان مستوى الصوديوم في دمك منخفضاً.
 - كنت تعاني أو عانيت مؤخراً من تبول متزايد.
 - قد يقوم طبيبك بمعالجة وطرف الكلىتين، ضغط الدم ومستويات الأملاح (مثل البوتاسيوم) في دمك بشكل دوري. انظر أيضاً البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا".
 - انتبه إلى أن الدواء يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل أقل نجاعة عند متلقي العلاج ذوي البشرة السمراء والمعالجة مع من تلقى العلاج الأخرين.
 - إذا لم تكن واثقاً من أن الحالات أعلاه تنطبق عليك، فاستشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء. يجب إخبار الطبيب المعالج باستعمال هذا الدواء قبل الإجراءات التالية: عملية جراحية (بما في ذلك جراحات الأسنان) - كل علة - ترطب والتخدير، علاج كل طرد الكوليسترول من الدم (صادة - LDL - pherisis (LDL) أو علاج للتخلص من لفضل الحمض على إسهال الخلد في السبيل.
 - إذا تطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، فاستشر الطبيب أو طبيب الأسنان قبل الإجراء.
 - **إذا كنت تستعمل الدواء أو كنت تستعمله مؤخراً، أخبره أي بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فاعط الطبيب أو الصيدلي بذلك، لأن إينالبري قد يؤثر على فعالية بعض الأدوية، وبعض الأدوية قد تؤثر على فعالية إينالبري.**
 - الحامض أو الحامض، خاصة إذا كنت تستعمل:
 - أدوية تحتوي على اليوسيوم، وإصفاة لليوسيوم (بما في ذلك بدائل الملح).
 - مدرات البول المخدرة لليوسيوم مثل سيرونو لاكتون، إيلوبريفون، تريامفترين أو أميلوريدي. استعمال هذه الأدوية بالتزامن مع إينالبري قد يسبب ارتفاع في مستوى اليوسيوم في الدم.
 - أدوية أخرى تستعمل كحافض لضغط الدم مثل: حجابات بيتا، حجابات مستقبل الأجنوتيسين، مدرات البول (مثل التيازيدات، فروسيميد، فوسيتاميد)، الدواء اليسكوبين أو أدوية لعلاج الأوفي الصدر (التخدير الصدري) مثل النترات. استعمال هذه الأدوية بالتزامن مع إينالبري قد يؤدي إلى ضغط دم منخفض.
 - قد يغير الطبيب الجرعة الدوائية لإينالبري أو يتخذ بعض الخطوات الوقائية الأخرى إذا كنت تستعمل دواء من فصيلة حاليجات مستقبل الأجنوتيسين II (ARBs) أو الدواء اليسكوبين. انظر أيضاً البند 2

- "لا يجوز استعمال الدواء إذا" و"تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء".
- الشيويم (لعوم أنواع معينة من الأمراض التنفسية).
- الأدوية لثابتة للحلقات لعلاج الكولاب، أدوية مصددة للدهان، أدوية للتخدير، مواد مخدرة ناركوتية مثل المورفين (المستعملة منذ تسنكين الآلا الشيدية). استعمال هذه الأدوية بالتزامن مع إينالبري قد يؤدي إلى ضغط دم منخفض.
- أدوية لعلاج الصلابة والتهاب المتعلقين بحالات الأم، خاصة تلك التي تؤثر على العضلات، العظام والمفاصل.
- مضادات الالتهاب الستيرويدية - NSAIDs، بما في ذلك مثبطات COX-2 (المستعملة لتخفيف التهاب والمساهمة في تسكين الألم).
- العلاج بملح الذهب، الذي قد يؤدي إلى احمرار الوجه، الغثيان، التقيؤات وضغط الدم المنخفض (إذا أُعطى بالتزامن مع إينالبري).
- الأيسبرين (حمض الأستينيل ساميليك).
 أدوية حلة الخدرات الموية.
 أدوية مصددة للسل والركم أو أدوية لتخفيف الوزن، تحتوي على مادة من الحمايكات الوئبة.
 أدوية لعلاج السكري (بما في ذلك الأدوية المعطية عن طريق الفم والإسولين). قد يؤدي إينالبري إلى انخفاض حد في مستويات السكر في الدم إذا استعمال بالتزامن مع هذه الأدوية، خاصة في الأسابيع الأولى من العلاج وعند تغيير العلاج. ينبغي توخ من مشاكل في الكلية. يجب عليك الحرص على متابعة مستويات السكر في دمك خلال الشهر الأول من العلاج بإينالبري.
- الكحول.

إذا لم تكن متأكدًا، فاستشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.
 إذا كنت على وشك تلقي مادة مخدرة (قبل عملية جراحية)، فإخبار الطبيب أو طبيب الأسنان بذلك يستعمل إينالبري.

1. استعمال الدواء واستهلاك الكحول:
 يجب الامتناع عن الاستهلاك المتزايد للمشروبات الروحية في فترة العلاج بهذا الدواء لأن شرب الكحول في فترة العلاج بإينالبري قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم وإلى شعور بالدوار أو الغثاء.

2. الحمل والرضاعة:
 أخبري الطبيب إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، تطبين أنك قد تكونين حاملاً أو تحظنين للحمل. يستحيل الطبيب عادة بيلقاء استعمال الدواء قبل أن تحملي أو فورا عند اكتشاف أنك حاملاً، ويستعمل دواء آخر بدلاً من إينالبري. لا يوصى باستعمال الدواء في مراحل الحمل المبكرة ولا يجوز استعماله بعد الشهر الثالث للحمل لأنه قد يسبب ضرراً طفيفاً لشيداً للطفل الرضيع (النظري البدن 2 "الحمل والرضاعة" والبند "لا يجوز استعمال الدواء إذا").

استشر الطبيب إذا كنت مرضعاً أو تحظنين لإرضاع لا يوصى بإرضاع المولود الأمومي بعد الـ (أد)، خاصة الخنج، خلال فترة استعمال الدواء. في الحالات التي يكون فيها الطفل الرضيع أكبر سناً، فيتم ذلك الطبيب المشورة بالنسبة لأفضليات ومخاطر استعمال إينالبري. في فترة الرضاعة والتأكد من مراقبة مع خيرات علاجية جيدة.

3. الصبغة واستعمال المكنت:
 استعمال هذا الدواء قد يسبب التعب، الدوار أو الميل إلى النوم. إذا شرعت بهذه الأعراض، فامتنع عن سيقاة الصبغة، تتشغل المكنت الخطرة أو كل فعالية تتطلب اليقظة.

4. معلومات هامة عن جزء من مركبات الدواء:
 يحتوي هذا الدواء على الكلتور، وإذا أخدك طبيب في الماضي بذلك تعاني من عدم تحمل سكرات معينة، فراجع الطبيب قبل البدء بالعلاج بهذا الدواء.

5. كيف تستعمل الدواء:
 كل قرص من الأوص الـ 5 ملغ يحتوي على ما يقارب 36.75 ملغ لكتور.
 كل قرص من الأوص الـ 10 ملغ يحتوي على ما يقارب 73.5 ملغ لكتور.
 كل قرص من الأوص الـ 20 ملغ يحتوي على ما يقارب 147 ملغ لكتور.

6. كيف تستعمل الدواء:
 يجب استعمال دواء وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.
الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سوحدهما الطبيب فقط، وفقاً لوضعك الطبي والأدوية الأخرى التي تستعملها. يجب استعمال هذا الدواء في أوقات منتظمة، كما تحدد من قبل الطبيب المعالج.
 يجب على الدواء مع الماء، يمكن تناول الدواء مع أو بدون الطعام.
 لا يجوز المضغ، الأوص مخصص للبلع. يمكن نظير الفوص. لا تتوفر معلومات بخصوص جرس سحق الفوص.

في بداية فترة العلاج بالدواء، قد يكون الانخفاض في ضغط الدم ملحوظاً أكثر مما سيكون عليه فيما بعد. عند البدء بالعلاج بالدواء قد تشعر بالدوار. الانتعاش أو يساهمك على الشعور بالتحسن. تقل راحة هذه الأعراض في الجرات القادمة. إذا كنت قلقاً، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

سيصفص الطبيب استجابته لإينالبري بواسطة قياس ضغط الدم وإجراء فحوص معينة للدم.
متوقف العلاج الذين يعانون من مشاكل الكلية:
 إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلية، فيتم تغيير الطبيب الجرعة الدوائية لإينالبري وفقاً للأداء الوظيفي الكلوي. إذا كنت تخضع لعلاجات غسيل الكلى (الدياليزا)، فقد تتغير الجرعة الدوائية يوماً بيووم. سيرشك الطبيب إلى الجرعة الدوائية الصحيحة.

متوقف العلاج المسنون:
 سيحدد الطبيب الجرعة الدوائية التي تتناسب مع الأداء الوظيفي الكلوي الخاص بك.

تجرية استعمال هذا الدواء عند الأولاد الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع محدودة. لا توجد أي تجربة استعمال عند الأولاد الذين يخضعن لدواعي الاستعمال الأخرى.

يتم تحديث بعض دواعي استعمال الأوص الأخرى.
 يتم تحديث الجرعة الدوائية من الأوص الأخرى مع الطبيب بحسب وزن الولد وتغير ضغط الدم لديه عند استعمال إينالبري. لا يوصى باستعمال الدواء عند الأطفال الرضع والأولاد الذين يعانون من مشاكل في الكلية.
 لا يوصى باستعمال الدواء عند الأطفال الرضع حديثي الولادة (في الأسابيع الأولى بعد الولادة).
يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
الفحوص والمتابعة:
 قد يقوم الطبيب بمعالجة وطرف الكلىتين، ضغط الدم ومستويات الكهارل (مثل البوتاسيوم) في دمك بشكل دوري. انظر أيضاً البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا".
 إينالبري قد يؤثر على جزء من نتائج فحوص الدم، بما في ذلك: خلايا الدم ومركبات أخرى في الدم،

