

ميفورتيك أقراص مطالية ٣٦٠ ملغ

يحتوى كل قرص مطلي على:

ميفورتيك ١٨٠ ملغ:

١٨٠ ملغ حمض ميكوفينوليك (ما يعادل ١٩٢.٤ ملغ ميكوفينولات الصوديوم)

180 mg Mycophenolic acid (equivalent to 192.4 mg Mycophenolate sodium)

ميفورتيك ٣٦٠ ملغ:

٣٦٠ ملغ حمض ميكوفينوليك (ما يعادل ٣٨٤.٨ ملغ ميكوفينولات الصوديوم)

360 mg Mycophenolic acid (equivalent to 384.8 mg Mycophenolate sodium)

المواد غير الفعالة: انظر الفقرة ١ «معلومات إضافية».

إن النشرة تتبع حتى نهايةها قبل إستعمالك للدواء وذلك لأن النشرة تحتوى على معلومات هامة بالنسبة لك.

احفظ النشرة. من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.

إذا توفر لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

إذا كانت لديك أي اعراض جانبية، راجع الطبيب أو الصيدلي. هذا يشمل أعراض جانبية متحركة التي لم تذكر في هذه النشرة (انظر الفقرة ٤ «الأعراض الجانبية»).

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمرأهفين.

معلومات هامة إقرأها بتمعن

تحذير: قد يؤدي ميكوفينولات لحدوث إجهادات وعيوب خلقية. إذا كنت إمراة قادرة على الحمل، فيتوجب عليك أن تجاري فحص حمل شأن طبيبك أن يقوم بإجراء فحوص الدم وفحص أعراض هذه الأمراض. إذا كنت تشعر بأي عرض (اصفار الجلد أو العينين، غثيان، فقدان الشهية للطعام، بول داكن) فعليك إعلام طبيبك في الحال.

إذا كنت تتعاني من سعال متواصل أو تشعر بضيق التنفس، خاصة خلال فترة تناول مثبطة جهاز المناعة الأخرى فإلاع طبيبك في الحال.

من شأن طبيبك أن يقوم بفحص نسب الأضداد بدمك خلال فترة العلاج بـ ميفورتيك وأن يرشدك حول مواعيدها. ألم في الحنجرة، كدمات، أو نزف غير متوقعة، توجه في الحال إلى الطبيب.

من شأن طبيبك أن يقوم بفحص نسب كريات الدم البيضاء لديك خلال فترة العلاج بـ ميفورتيك وأن يرشدك حول مواعيدها. بـ ميفورتيك.

المادة الفعالة بالدواء المسماة «حمض ميكوفينوليك» لا تشبه المادة في الأدوية الأخرى ذات الاسم المشابه، مثل «ميكوفينولات موفيتيل».

لا تقم بالتبديل بين الأدوية بدون تعليمات من الطبيب.

٢) قبل إستعمال الدواء

يوصى لك ميفورتيك فقط من قبل طبيب لديه خبرة بأدوية زرع الأعضاء.

٢.١ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (لديك حساسية زائدة) لـ حمض ميكوفينوليك.

• ميكوفينولات الصوديوم أو لـ ميكوفينولات موفيتيل أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، المفصلة في الفقرة ١ «معلومات إضافية» من هذه النشرة.

• كنت امراة في سن الخصوبة ولم تجاري فحص حمل سلبي قبل تناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون

وصفة طبية وإضافات غذائية، أخذ لطبيبك أو الصيدلي عن ذلك.

• يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالآخر إذا كنت تتناول حامل.

• كنت امراة في سن الخصوبة ولا تستعملين وسيلة ناجعة لمنع الحمل (معلومات إضافية، انظر فقرة «الحمل، الإرضا

ع من دون تناول الدواء).

• إذا تناولت علىك إحدى الحالات التي فصلت سابقاً، بلغ طبيبك المعالج عن ذلك ولا تتناول الدواء.

٢.٢ تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

• راجع الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول ميفورتيك:

• إذا كنت تعاني أو كان لديك في الماضي إضطراب جدي في الجهاز الهضمي مثل فرحة معوية.

• إذا كنت تعاني من نقص وراثي نادر بازيزم hypoxanthine-guanine phosphoribosyl-transferase (HPGRT) (HGPRT) أو كيلي Kelley-Seegmiller Lesch-Nyhan.

• يتوجب عليك أيضاً انتبه للأمور التالية:

• يضعف هذا الدواء من آلية دفاع جلد الجسم من الشمس. لذلك، فهو يزيد من خطورة الإصابة بسرطان الجلد. عليك الحذر من تعرضك للشمس والأشعة UV وذلك بتغطية الجلد المكشوف ما أمكن ودهن واقيات أشعة ذات عامل وقائي مرتفع. إستشر الطبيب بخصوص الحماية من الشمس.

• إذا عانيت في الماضي من إلتهاب الكبد من نوع B أو C، فإن إستعمال ميفورتيك يمكن أن يزيد من خطورة ظهور هذه الأمراض من جديد. من شأن طبيبك أن يقوم بإجراء فحوص الدم وفحص أعراض هذه الأمراض. إذا كنت تشعر بأي عرض (اصفار الجلد أو العينين، غثيان، فقدان الشهية للطعام، بول داكن) فعليك إعلام طبيبك في الحال.

• إذا كنت تعاني من سعال متواصل أو تشعر بضيق التنفس، خاصة خلال فترة تناول مثبطة جهاز المناعة الأخرى فإلاع طبيبك في الحال.

• من شأن طبيبك أن يقوم بفحص نسب الأضداد بدمك خلال فترة العلاج بـ ميفورتيك وأن يرشدك حول مواعيدها. ألم في الحنجرة، كدمات، عند وجود تلوثات متكررة وأنت تتناول أيضاً مثبطة مناعية أخرى.

• إذا كنت تشعر بأعراض تلوث (مثل سخونة، ألم في الحنجرة)، كدمات، أو نزف غير متوقعة، توجه في الحال إلى الطبيب.

• من شأن طبيبك أن يقوم بفحص نسب كريات الدم البيضاء لديك خلال فترة العلاج بـ ميفورتيك وأن يرشدك حول مواعيدها. بـ ميفورتيك.

• المادة الفعالة بالدواء المسماة «حمض ميكوفينوليك» لا تشبه المادة في الأدوية الأخرى ذات الاسم المشابه، مثل «ميكوفينولات موفيتيل».

• مثبطة جهاز المناعة تقلل إستجابة الجسم لـ شيء يتم تشخيصه على أنه «غريب». بما في ذلك الأعضاء المزروعة.

الأتبوب الذي يربط الحنجرة بالمعدة)، في الكلى والجهاز العصبي (متلاً أثراً أيضاً على المعدة الفقري - عدم تطور عظام العمود الفقري كما ينبعى).

ربسيع قد يصاب بواحد أو أكثر من تلك العيوب.

إذا كنت امراة في سن الخصوبة لا يجوز بدء العلاج بـ ميفورتيك من دون فحص حمل سلبي قبل بدء العلاج. يجب التقىد بالإرشادات لمنع الحمل التي أعطيت لك من قبل الطبيب المعالج يمكن أن يطلب الطبيب أكثر من فحص حمل واحد وذلك لضمان عدم كونك حامل قبل بدء العلاج.

الإرضاع لا يجوز إستعمال ميفورتيك إذا كنت مرضعة. وذلك لأن كميات ضئيلة من الدواء قد تنتقل إلى حليب الأم.

منع الحمل لدى النساء اللواتي تتناولن ميفورتيك إذا كنت امراة في سن الخصوبة فيتوجب عليك دائمًا إستعمال طريقتين

ناجعتين لمنع الحمل خلال الفترات التالية: • قبل بدء العلاج بـ ميفورتيك.

• خلال طيبة فترة العلاج بـ ميفورتيك.

يجب إستثناء الطبيب المعالج حول الوسائل الأكثر ملائمة بالنسبة لك لمعلم الحمل، بعد وسائل منع الحمل هذه يحصل حالتك.

يجب التوجيه إلى الطبيب بـ درجة سرعة ما يمكن إذا كنت تعتقدين بأن وسيلة منع الحمل لم تكن جائعة أو إذا سعيت تناول فرق لمنع الحمل.

إذا كنت تستوفين أحد المعايير التالية، فمن غير المفترض أن تحمل: • كنت إمراة في فترة سن اليأس، أي عمرك ٥٠ سنة على الأقل وتلقيت

الطمث الأخير قبل أكثر من سنة (في حال توقفك عن تلقي الطمث جراء معالجة السرطان، فلا يزال هناك إحتمال أن تحمل).

إجتنز عملية جراحية لإستئصال البوقين والمبيضين (salpingo-oophorectomy).

إجتنز عملية جراحية لاستئصال الرحم (hysterectomy).

• مبيضين لا يعملان (فشل مبيضي مبكر الذي تم تشخيصه من قبل طبيب نساء متخصص).

• ولدت لديك واحد من الحالات النادرة التالية، التي لا تتمكنك من الحمل:

نمط جيني XY (XY genotype) (متلازمة تيرنر Turner's syndrome) أو عدم تطور الرحم (Uterine agenesis).

• كنت طفلة أو مراهقة، لم تبدأ بتلقي الطمث.

منع الحمل لدى زوجات الرجال الذين تتناولون ميفورتيك إذا كنت تخطط للحمل مع زوجتك، يتحدث معك الطبيب حول المخاطر والعالجات البديلة التي يمكنك تناولها من أجل منع رفض العضو المزروع.

٣) السيادة وإستعمال الماكنت

من غير المفترض أن يؤثر ميفورتيك على القدرة على السيادة أو إستعمال الماكنت.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء المستحضر يحوي لكتور. انظر أيضًا الفقرة ١ «معلومات إضافية».

إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة (بما في ذلك لكتور جاككتوز أو جلوكوز)، إستشر الطبيب قبل تناول ميفورتيك.

٤) كيفية إستعمال الدواء

يجب الإستياضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا.

عليك الإستياضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا.

إن إستعمال ميفورتيك خلال فترة الحمل قد يلحق الضرر بالجنين (أنظر أيضًا الحمل، الإرضاع ومنع الحمل) وأن يزيد من خطورة فقد الحمل (إجهاض طبيعى).

لدى معالجين الذين يخططون للحمل، يجب دراسة علاج بأدوية بديلة مشططة للجهاز المناعي، ذات خطورة أقل تنسحب تسمم لدى الجنين.

يجب مناشة الطبيب بخصوص الخطورة مقابل الفائدة من العلاج. لا يجوز التبرع بالدم خلال فترة العلاج بـ ميفورتيك وحتى ٦ أسابيع بعد إنهاء العلاج على الأقل.

• ميفورتيك والأدوية الأخرى إذا كنت تتناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون صفة طيبة وإضافات غذائية، اخذ لطبيبك أو الصيدلي عن ذلك.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالآخر إذا كنت تتناول حامل.

• أدوية أخرى التي تنشط جهاز المناعة مثل آزابوبرين أو تاكروليموس.

• الأدوية المستعملة لعلاج النسبة المرتفعة من الكوليسترول بالدم مثل كوليستيرامين.

• الفحص الفعال وسائل منع الحمل التي تساعد على ملائمة المعاشر.

• الأدوية المضادة للحموضة الاحادية على مغذيزوم وألومينوم.

• الأدوية المستعملة لمعالجة التلوث الفيروسي مثل أسيكلوفير أو جانسيكلاوفير.

عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تخطط لتلقي أي لقاحات.

• استعمال الدواء والطعام.

علىك اختيار بين تناول الأدواء مع الطعام أو من دون طعام وحينها تناولها بنفس الشكل كل يوم، وذلك للتأكد من إمتصاص نفس كمية الدواء بجسمك كل يوم.

• المستمنون

المسنون (عمر ١٥ سنة وما فوق) يمكنهم إستعمال ميفورتيك بدون حاجة لملائمة المقدار الدوائية.

• الأطفال والمراهقون

لا يوصى بإستعمال ميفورتيك لدى الأطفال والمراهقين نظرًا لعدم توفر

الإمكان تناول الماء والطعام.

إذا كنت في فترة الحمل أو مرحلة منع الحمل، تحدث معك الطبيب حول المخاطر للحمل، إستثنيه على الأقل قبل تناول الدواء. يتحدث معك الطبيب في حال حصول حمل وعن العالجات البديلة لمنع رفض العضو المزروع.

إذا أصبحت حاملًا خلال فترة العلاج بـ ميفورتيك، يجب إعلام الطبيب في الحال.

إذا أصبحت حاملًا خلال فترة العلاج بـ ميفورتيك حتى لفائدتك مع الطبيب.

الحمل

لم تلتقي طمثًا أو تعتقدين بأنك لم تلتقي طمث، لديك نزف شمسي مختلف عن المعتاد، أو إذا كنت تظبين بأنك حامل.

أقمت علاقات جنسية من دون إستعمال وسائل منع الحمل.

إذا أصبحت حاملًا خلال فترة العلاج بـ ميفورتيك، يجب إعلام الطبيب في الحال.

خطيرة (٧٢٪) لدى الجنين.

العيوب الخلقية التي يبلغ عنها، تشمل: عيوب في الأذنين، في العينين، الوجه (شفة مشقوقة/حنك مشقوقة)، بتطور الأصابع، القلب، المريء

(exp. date) لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا يجوز تخزين بدرجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية. يجب حمايته من الرطوبة.

يجب الحفظ في العلبة الأصلية.

لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت لاحظت أن العلبة معطوبة أو عليها علامات تلف.

١) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا:

Lactose anhydrous, crospovidone, povidone, maize starch, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate.

مكونات طلاء القرص:

ميفورتيك ١٨٠ ملغم

Hypromellose phthalate, titanium dioxide, iron oxide yellow, indigotine

ميفورتيك ٣٦٠ ملغم

Hypromellose phthalate, titanium dioxide, iron oxide yellow, iron oxide red

يحتوي كل قرص من ميفورتيك ١٨٠ ملغم على ٤٥ ملغم لكتوز لامائي و ١٣ ملغم صوديوم.

يحتوي كل قرص من ميفورتيك ٣٦٠ ملغم على ٩٠ ملغم لكتوز لامائي و ١٦ ملغم صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
ميفورتيك ١٨٠ ملغم: أعراض مطالية، مستديرة، لونها أحمر ليموني، ذات أطراف مائلة مطبوع عليها "C" من جانب واحد للقرص.

ميفورتيك ٣٦٠ ملغم: أعراض مطالية، مطاولة، لونها أحمر/برتقالي شاحب، مطبوع عليها الطباعة "CT" من جانب واحد للقرص.

صاحب الامتياز وعنوانه: نوفاريس إسرائيل، م.ض.. شارع شاحام ٣٦، بيتح - تلخا.

إسم المنتج وعنوانه:
نوفاريس فارما شطابين اي بي جي، شطابين، سويسرا

من أجل نوفاريس فارما اي بي جي، بازل، سويسرا أو نوفاريس فارما برووكشنز H, GmbH.

في، ألمانيا من أجل نوفاريس فارما اي بي جي، بازل، سويسرا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتوها فحص ورخص في تاريخ: آذار ٢٠١٧

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
ميفورتيك ١٨٠ ملغم: ٣٧١٥-٣٧١٥

ميفورتيك ٣٦٠ ملغم: ٣٧١٣-٣٧١٣

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

• أصوات تنفس تشبه الصفير (wheezing).

• تتجشّأ رائحة سينية من الفم، إنسداد الأمعاء، تقرحات في الشفة، حرقان، تغير لون اللسان، جفاف الفم، إنهاك اللثة، إنهاك البكرياس الذي يسبب ألم شديد في أعلى البطن، إنسداد الغدد الليمفاوية، إنهاك جدار جوف البطن (peritonitis).

• تلوث في العظام، الدم وفي الجلد.

• بول دموي، تضرر الكلية، ألم وصعوبة في التبول.

• تساقط الشعر، كدمات في الجلد.

• إنهاك المفاصل (arthritis). ألم في الظهر، تقلصات عضلية.

• فقدان الشهية للطعام، ارتفاع نسبة شحوم الدم (فرط شحوم الدم)، السكر (داء السكري)، الكوليستيرون (ارتفاع الكوليستيرون في الدم) أو إنخفاض نسبة الفوسفات (الفوسفور) في الدم.

• أمراض إنهاك إنهاك (مثل: إهاق، قشعريرة، ألم في الحنجرة، ألم في المفاصل أو العضلات)، ارتفاع الكالسيون واحتياطي القدمين، ألم، رجفان.

• ضعف الشعور بالعطش.

• ألم حاد غريب، أشكار باطلة.

• عدم القدرة على تحقيق أو الحفاظ على إنصاب العضو التناسلي.

• سعال، صعوبات في التنفس، ألم أثناء التنفس (أعراض محتملة لمرض رئوي خلالي).

أعراض جانبية ذات شبيوه غير معروفة (ليس بالإمكان تقدير الشبيوه من المعلومات المتوفرة):

• طفح.

• سخونة، ألم في الحنجرة، تلوثات متكررة (أعراض محتملة لقلة الخلايا البيضاء في الدم [فقد المحببات]).

أعراض جانبية إضافية التي يبلغ عنها جراء إستعمال الأدوية التي تنتهي لنفس مجموعة الأدوية التي ينتمي إليها الدواء المقترن:

أعراض جانبية إضافية بلغ عنها جراء إستعمال أدوية تنتهي لنفس مجموعة أدوية ميفورتيك: إنهاك الغولون، إنهاك جدار الأمعاء الذي يتخلص من فيروس شديدة في البطن مع احتمال حدوت نزف، تقرحات في المعدة أو الاثني عشر، تناقص عدد خلايا دم بيضاء معينة أو كافية خلايا الدم، تلوثات جدية (مثل: تلوث في القلب وصمامات القلب، تلوث في النسيج الذي يغلف الدماغ والجبل الشوكي)، ضيق تنفس، سعال الذي يمكن أن يحدث نتيجة توسيع القصبات bronchiectasis).

أعراض جانبية إضافية بلغ عنها جراء إستعمال أدوية تنتهي لنفس مجموعة الأدوية التي ينتمي إليها الدواء المقترن:

راجع الطبيب إذا ظهر لديك سعال متواصل أو ضيق تنفس.

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تتعانى من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان تبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية تقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو تتصفح الرابط التالي:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسخين: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيد عن متناول أيدي ومجاه رؤية الأطفال وأو الرضيع، وذلك لتفادي إصابةهم بالتسخين.

لا تسبّب التقيّي بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

شيئاً في الكلى، المثانة البولية والمسالك التنفسية العليا/السفلى.

• كنت تعاني من تقيّيات دموية، براز أسود أو دموي، فرحة في المعدة أو الأمعاء.

• لديك تلوث في الغدد، أورام جلدية جديدة أو تضخم في الأورام الحالية، أو تغير في الشمامات الحالية، بالمشابه لما قد يحدث لدى المرضى المعالجين بأدوية لتشريح جهاز المناعة، فإن عدد قليل جداً من المرضى المعالجين بـ ميفورتيك تظهر لديهم سرطان في الجلد أو في العقد الليمفاوية.

أعراض جانبية أخرى: (من شأنها أن تؤثر على أكثر من ١ من كل ١٠ معالجين):

• إنخفاض نسبة خلايا الدم البيضاء.

• تناقص نسبة الكالسيوم في الدم (hypocalcaemia).

• تناقص نسبة البوتاسيوم في الدم (hypokalemia).

• إنفاغ نسبة حمض البول في الدم (hyperuricemia).

• إنفاغ ضغط الدم.

• فتق.

• إسهال.

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على أقل من ١ من كل ١٠ معالجين):

• إنخفاض نسبة خلايا الدم الحمراء الذي قد يسبب إهاق، ضيق تنفس وشحوب (فردوم).

• إنخفاض نسبة الصفيحات الدموية الذي قد يسبب نزف وظهور كدمات (قلة الصفيحات الدموية) غير متوقعة.

• إنفاغ نسبة البوتاسيوم (hyperkalemia).

• إنخفاض نسبة المغنيسيوم (hypomagnesemia).

• دوران.

• صداع.

• سعال.

• ضغط دم منخفض.

• ضيق تنفس.

• ألم في البطن أو المعدة، إنهاك جدار المعدة، نفحة في البطن، إمساك، صعوبات في الهضم، غازات، براز لين، غثيان، تقيّيات.

• إهاق، سخونة.

• عدم سلام نتائج فحوص وظائف الكبد أو الكلية.

• تلوث في الطرق التنفسية.

• حب الشباب.

• ضعف (وهن).

• ألم عضلي (myalgia).

• إنفاغ راحتي البدين، الكالحين أو الرجلين (أعراض محتملة لوذمة محيطية).

• حكة.

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على أقل من ١ من كل ١٠ معالج):

• ضربات قلب سريعة أو نظم غير منظم لضربات القلب، إحتقان في الرئة.

• كيسة تحتوى على سائل لمفي.

• رجفان، صعوبات في النوم.

• إحمار وإنفاغ العينين (إنهاك الملتحمة)، تشوش الرؤية.

المقدار الدوائي وطريقة الإعطاء المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

متى وكيفية تناول ميفورتيك

يجب بلع القرص بشكله الكامل مع كأس من الماء.

منمنع مضخ كسر أو سحق الأقراص. لا يجوز بلع قرص مكسور أو مشطط.

فترة العلاج بـ ميفورتيك

تم مواصلة العلاج لطالما أنت بحاجة لتشريح جهاز المناعة وذلك لمنع رفض الكلية المزروعة.

إذا تناولت بالخطأ مقدار دوائي أكبر

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه في الحال إلى الطبيب أو لفرق الطوارئ في المستشفى وأخذ معك علىة الدواء.

الجائز أن يتناول الأمر لعلاج طبي.خذ معك الأقراص وأيتها للطبيب أو للطاطق الطبي في المستشفى، إذا نفذت الأقراص.خذ معك العلبة الفارغة.

إذا نسبت تناول المواد

إذا نسبت تناول الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول جرعة حال تذكرك.

إلا إذا افترض موعد تناول جرعة القادمة. واصل تناول الدواء في الأوقات المحددة. يجب إستشارة الطبيب.

لا يجوز تناول جرعة مضاعفة لتجنب عن الجرعة المنسية

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى به الطبيب.

في حال توقف عن تناول الدواء، لا تلقيمات من الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء، إلا تلقيمات من الطبيب، غير متوقعة عن العلاج بـ ميفورتيك من شأنه أن يزيد من خطورة رفض الكلية المزروعة لديك.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة، يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ميفورتيك قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تتعانى أي منها

قد يعاني المعالجون المستحسنون من أعراض جانبية أكثر بسبب مثبطات جهاز المناعة.

مثبطات جهاز المناعة، بما فيها ميفورتيك، تقلل من آليات الدفاع بجسمك.

وذلك لمنعك من رفض المجزء المزروع. نتيجة لذلك، فإن قدرة جسمك على محاربة التلوثات تكون أضعف من المعتاد. لذلك، فأنت قد تعاني من تلوثات أكثر من المعتاد. تلوثات الدماغ، الجلد، الفم، المعدة والأمعاء، الرئتين والممسالك البولية.

يجري لك الطبيب فحوص مد منتظمة وذلك لمراقبة التغيرات بعد خلايا الدم أو بحسب مواد أخرى في الدم مثل السكر، الشحوم والكوليستيرون.

بعض الأعراض الجانبية يمكن أن تكون خطيرة.

لديك أعراض تلوث تشمل سخونة، قشعريرة، تعرق، الشعور بالبرد.

ناعس، أو قلة الحيوانية. إذا كنت تعانى تعلق بـ ميفورتيك، فأنت قد تكون حساساً أكثر من الععاد للتلوقات الفيروسية، الجرثومية والفتيرية.

من شأن هذا الأمر أن يؤثر على أجهزة مختلفة من الجسم، حيث أن أكثرها