

אפיקואם**קצף לטיפול מקומי**

חומרם פעיל:

הידרוקורטיזון אצטט 1% Pramoxine Hydrochloride 1%

פרומוקין הידרכורטיזון אצטט - ראה סעיף 'מידע נוספים'.

לשימוש חמורים בלבד פטיילים.

קרא בעיון את העילון עד סופו בטרים תשמש בתורופה. עלון זה מכיל מיעוד תמצית על התורופה. אם יש לך שאלות נוספת נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תורופה זו נרשות לטיפול במחלות. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

למה מייעצת התורופה?

אפיקואם הוא וטיר גומי ומלוח מקומי, להקלת מוקנית בתופעות דלקתיות ובגירויים הנגרמים ממלוקות המגיבות לטיפול בקורטיקוסטרואידים.

קובעה תרפייטית:

הידרוקורטיזון אצטט - קורטיקוסטרואידים לטיפול מקומי. פרומוקין הידרכורטיזון - מלוח מקומי.

לפני השימוש בתורופה:

אין להشمיש בתורופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) גםו עבר רגישות לחומרים הפעילים או לכל אחד מהרכבים הננספים אשר מכילה התורופה (אלא ראה סעיף 'מידע נוספים').

اذירות מינימALES לשימוש בתורופה:

לפני הטיפול באפיקואם, ספר לרופא:

- אם הירך ברוני או מנוקה.
- במקרה של זיהום בקטריאלי, ויראלי או פטריטי, יש להיזעץ ברופא.
- יתכן כי היה צריך לטפל בתופעות אנטיבקטריאליות, אנטיביראיות או אנטי-פריטרייטיות נוספת.

- התכשיר מיועד לשימוש חיצוני בלבד. אין לחתך לתכשיר לבוא במגע עם העיניים.

- אין להבוח או לכוסות את האוזן המטופל, אלא אם נאמר לך במנור על ידי רופא.

- בטיפול ילדים קטנים המטופלים באוזן החיתולים, יש להימנע שימוש בחיתולים הדוקים או במכנסים מנילון, על מנת לא לẤטם את האוזן הנטוש.

- אם הירך מושך לאפיקואם לתקוף מהשכחת.

- לróפָא לפני השימוש בכיסר.

- בטיפול עם אפיקואם, במיוחד אם קיימים כאבים פתוחים, קיימת פרושרת לסוגה סוטנטית של דיסקו-טוטזין.

בחיל הקמתה של סטראידיים מוקמיים עשויה לרם דלכי היפיגומנטיצה, היפריגומנטיצה, היפריגומנטיס-וירתת המוח-וירתת הכליה (HPA), תסמנת קושינג, היפרגלמייה והפרשת גלקוז בשתן. שימוש מושך בקורטיקוסטרואידים או שימוש על שטח נרחב וחבישה אטומת מהגרים בסוגה סוטנטית. על ידי הרופא ניתן להזכיר תסמנת קושינג וירתת המוח ופער גונדייג' גירוי ACTH (הרומן המיצץ על ידי בളוטת יותרת הכליה לירוי השחרור של הורמוני קורטיקוסטרואידים בבלוטת יותרת הכליה).

אם אתה לוקח או אם לך תחונה תרופה אחרת כולל תורופה ללא מרשם ותוספי תחזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הירין והנקה אם הירך בהריון, חושבת שאת בהריון, מתכנתה להיכנס להריון או מינקי, יש להיזעץ ברופא לפני השימוש באפיקואם.

כיצד תשמש בתורופה?

תמיד יש להشمיש לפני הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אכן טיפול יקבע על ידי הרופא בלבד. המינון המקבול בדר

כל הוא: שלחרכך כבבה דקה של אפיקואם על האוזן הנגע 3-4 פעמים ביום, שהאטחן לחומרה המצב.

אין לעור על מגנה החומרה.

אין בלולו על מגנה החומרה בלבד.

ידים: יש להאגי את המינון ושילוף המינון ואופן הטיפול בילדים לכמות הקטנה בויריא שטטפק מתעלת בטיפול. המינון והטיפול יקבע על ידי הרופא בלבד.

אופן השימוש בתורופה:

אפיקואם משוחק בשני חלקים:

1. מל אלומינום

2. מכסה לחץ פלסטיק - אותו יש להרכיב על המכל.

יש לשער בחוקה את מכל האפיקואם לשערן לפני כל שימוש.

יש להרכיב את מכסה הפלסטי על מכל האלומינום.

בעודך מחזק את המכל יש, כאשר הפיה פונה כלפי מעלה, יש ללווח בעדינות על מכסה המכל מספר פעמיים עד להופעת הקצף.

יש לרחוץ מחותן קטנה של כל אפיקואם בילדים 3-4 פעמים ביום או לחילוף לפחות מעת קצף על פד והנחייה של האוזן והגונע.

לאחר שימוש יש להפריך את המכסה מהמכל ולשוטף את שניות היבש במים חמימים.

שים לב: אין להזכיר את המכל לתוך הנרתיק (אגינה) או פי הטבעת!

בדיקות ומיעקב
בקשות טיפול מושכת בתכשיר זה או בטיפול במינונים גבויים, יש לבצע בדיקה מקופתית למדידת רמות הקורטיזול החופשי בשתן. בדיקת גירוי ACTH.

אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר או אם בטיעות בעליל מן התורופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי מין של בית חולים ואירוע התורופה איתך.

אם שכחתי ליטול תרופה זו בזמן הדבר, אין ליטולמנה כפולה. רק את המהoba בחזרה יישלח תמיד בטיפול כפי שהוחלט על ידי הרופא.

אין ליטול תרופה בחושך בדק התווית והמנה **בכל פעם** שהירק נטול תרופה. הרוכב משקיפים אם הירק דקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתורופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

תופעת לוואי:

כמו בכל תרופה בחושך בדק התווית והמנה **בכל פעם** שהירק נטול ממההמשמשם. אל תבהיר למקרה ראשית תופעת הלוואי. יתכן ולא תסבול מכך אחות מהה.

יש פונת מידי לדופא:

אם הופעה אדומניות בעור, כאב, גירוי או נפיחות שניים חולפים, הפסיק את השימוש בחיסכון ונונה מיד לרופא.

תופעות הלוואי המקומיות הבאות, דוחו ככל שחייב בעת שימוש בקורטיקוסטרואידים מוקומיים, אך עליה להופיע בשיכוח גבוהה יותר נעת שימוש בתחום אוטומטי. תופעות לוואי אלו מופיעות ממההמשמשם. בסדר יורדי לפי שכיחות המערכת:

- תחושים צבירה

- גירוד

- גירוי

- יובש

- דלקת של זקיקי השיער בעור (פוליקוליטיס)

- מחלת גנטית המתחבאת במחלה שיער באופן בלתי מרווח בכל

- החליק הגוף (תסמנות איש החаб)

- התרכזיות אנטה

- אובדן צבע של העור (היפוגומנטציה)

- דלקת עור סבב הפה

- דלקת עור אלרגית כתצתה מגאגע

- התרכזות של העור

- זיהום שנינו

- דילול של השכבות העולימות בעור (אטרופיה של העור)

- סמיון מיתחנה בעור

- פגיעה כתזואה מידה

יש להפסיק את השימוש בתרופה אם מצבך חמיר, או אם מופתחה גירוי.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אתה מטופת הלוואי מחייב או כאשר אתה סובל מטופת הלוואי שלא צינה בעילון, עירק להיזעץ ברופא.

דיווח על תופעת לוואי:

יתן לדוח על תופעות לוואי, לא לחשך הרבריאות בנסיבות לחיצה על הגוף "דיווח על תופעות לוואי" או תינוקות וילדיים / ואן תמן הרעליה. ה קישור "דיווח על תופעות לוואי" עוקב לטיפול רפואי (www.health.gov.il) והפנה לטופוף המקוון לדיווח על תופעת לוואי, או על ידי כיסיה לקשר:

<https://forms.gov.il/globedata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

לשם הפשטה והקלת הקיראה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התורופה מייעצת לבני המינים.