



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
مستحضرات - ١٩٨٦
 يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

ستافيدرم كريم

المادة الفعالة وتركيزها: Fusidic Acid 2%

المواد غير الفعالة: أنظر فقرة ٦ «معلومات إضافية»

اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

ستافيدرم كريم هو مستحضر مضاد حيوي للعلاج الموضعي، ومخصص لعلاج تلوثات الجلد الجرثومية الحساسة للمستحضر.

عليك ملاحظة الحصول تحسن بعد عدة أيام من إستعمال ستافيدرم. إذا لم يحصل تحسن بعد سبعة أيام، يجب التوقف عن إستعمال المستحضر ومراجعة الطبيب. فترة إستعمال هذا المستحضر تكون عادة حتى أسبوعين، يجب إستشارة الطبيب بخصوص إستعمال الدواء لفترة أطول، لأن إستعمال الكريم لفترة طويلة أو بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب مقاومة الجراثيم للعلاج، كذلك زيادة الخطورة لتفاقم الأعراض الجانبية، وزيادة حساسية الجلد للدواء.

إذا أشار لك الطبيب بإستعمال ستافيدرم على جلد الوجه، يجب الامتناع عن تماس الدواء بالعينين.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

ستافيدرم كريم هو مستحضر مضاد حيوي للعلاج الموضعي، ومخصص لعلاج تلوثات الجلد الجرثومية الحساسة للمستحضر.

٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال المستحضر إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.

(أنظر الفقرة ٦).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

• لا يجوز إستعمال الدواء دون إستشارة الطبيب مقدماً إذا كنت في فترة الحمل، تظنين بأنك حامل أو إذا كنت مرضعة.

• إذا كنت حساساً لأي طعام أو دواء، خاصة لمضادات حيوية، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إستعمال الدواء.

• إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي خاصة إذا كنت تستعمل مستحضر/ات آخر / أخرى للإستعمال الخارجي.

• الحمل والإرضاع: لا يجوز إستعمال الدواء دون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت في فترة الحمل، تظنين بأنك حامل أو إذا كنت مرضعة.

• السيادة واستعمال الماكنتات: هذا الدواء لا يؤثر عادة على القدرة على السيادة أو تشغيل ماكنتات. مع هذا، إذا كنت تشعر بأعراض جانبية يمكن أن تخل بالقدرة على السيادة أو تشغيل ماكنتات، عليك إستشارة الطبيب.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا.

عليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً من طريقة الإستعمال.

• المقادير الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

• يجب تنظيف المنطقة المعالجة قبل الإستعمال. يجب تدليك الكريم بيدين نظيفتين داخل المكان المصايب ٤-٣ مرات في اليوم لفترة لا تزيد عن أسبوعين. يجب شطف اليدين بعد الإستعمال (إلا إذا كان المكان المعالج هو اليدين).

• إذا أوصى الطبيب بتحميسد المكان المصايب، فإن وترة الإستعمال اليومي تكون أقل.

• عليك ملاحظة الحصول تحسن بعد عدة أيام من إستعمال ستافيدرم. فترة إستعمال هذا المستحضر تكون عادة حتى أسبوعين، يجب إستشارة الطبيب بخصوص إستعمال الدواء لفترة أطول. الإستعمال المتواصل يمكن أن يولد مقاومة الجراثيم للمستحضر.

• إذا أشار لك الطبيب بإستعمال ستافيدرم على جلد الوجه، يجب الامتناع عن تماس الدواء بالعينين. إذا لامس المستحضر العينين بالخطأ، يجب شطفهما حالاً بالماء البارد وبعد ذلك، إذا أمكن، يجب شطفهما بمحلول لشفط العينين. من الجائز أن تحصل حرقـة في العين. إذا كنت تشعر بألم أو مشكلة في الرؤية راجع الطبيب حالاً.

• لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

• لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

إذا تناولت مفرطة أو إذا بلع طفل من الدواء بالخطأ، عليك التوجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى مصطحبـاً عبوة الدواء.

إذا نسيت دهن هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب دمه حال تذكره وبعد ذلك استمر بإستعمال الدواء في الزمن المحدد الإعتيادي.

- كيف يمكن أن تساعد على إنجاح العلاج؟
 - بحسب المراقبة على العلاج حسب توصيات الطبيب.
 - لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
 - إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال أسبوع يجب مراجعة الطبيب ثانية.
 - لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب فحص طابع الدواء والتاكيد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.
 - ضع نظارات طبية إذا لزم الأمر ذلك.
 - إذا توفرت لديك أسلحة إضافية بخصوص إستعمال الدواء، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، فإن إستعمال ستافيدرين يمكن أن يسبب أعراض جانبية لدى قسم من المستعملين. لا تنداش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز الاتّعاني أيًّا منها.

يجب التوقف عن العلاج بالدواء ومراجعة الطبيب حالًا إذا تطور رد فعل تحسسي لأعراضه:

صعوبات في التنفس، وخذ أو إنفاس في الشفتين والفم، في الوجه أو الحنجرة، طفح شديد في الجلد.

أعراض جانبية إضافية:

 - أعراض جانبية تظهر في أحياناً متقاربة هي ردود فعل جلدية، خاصة في منطقة دهن الكريم:
 - طفح
 - حكة
 - التهاب الجلد نتيجة اللمس (طفح أحمر حاک في الجلد يترافق بالشعور بسخونة وإنفاس في منطقة دهن الكريم)
 - الشعور بألم
 - وخذ، حرقة و / أو إحمرار في منطقة دهن المستحضر
 - أعراض جانبية تظهر في أحياناً متباعدة:
 - حكة أو تدمع العينين
 - التهاب ملتحمة العين (conjunctivitis)
 - أعراض جانبية ذات شبيوه غير معروفة:
 - إكزما
 - إحمرار الجلد
 - شرى
 - إنفاس الجفنين أو أجزاء أخرى في الجسم.

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، يجب استشارة الطبيب.
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffe ctMedic@moh.gov.il>

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تحب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- بعد الفتح للمرة الأولى بإمكان الاستعمال لمدة شهر واحد.
- يجب التخزين بدرجة تقل عن ٢٥ درجة مئوية.

٦) معلمات اضافية:

• يحتوى الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً مواد غير فعالة: Liquid paraffin, cetostearyl alcohol, white soft paraffin, macrogol cetostearyl ether, sodium dihydrogen - phosphate dihydrate, chlorocresol, sodium hydroxide, purified water.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟
- تحتوي العبوة على أنيبولة ذات ١٥ غرام / ٣٠ غرام كريم بلون أبيض - زبدى.
- مكان الانتاج: بن شمعون فلوريش م.ض، بارك الصناعة مسچاف ٢٠١٧٤ من أجل المنتج وصاحب الامتياز: تريبا، منتجات طبية إسرائيلية معيروت م.ض، معبروت ٤٠٢٣٠٠٠.
- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتهاها فحص ورخص في تاريخ: كانون الأول ٢٠١٢ رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٠٠٢٢٢٨٩٧١٤٨.
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

١٢١٧C
معبروت، م.ض.
منتجات طبية إسرائيلية
٤٠٢٣٠٠ معبروت

106358110

