

צפויט 250 כמוסות

צפויט פורטה 500 כמוסות

החומר הפעיל וכמותו:

צפויט 250: כל כמוסה מכילה:

צפלקסין (מונוהידראט) 250 מ"ג

Cephalexin (as monohydrate) 250mg

צפויט פורטה 500: כל כמוסה מכילה:

צפלקסין (מונוהידראט) 500 מ"ג

Cephalexin (as monohydrate) 500mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6 - "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

חשוב לסיים את הטיפול כפי שהומלץ ע"י הרופא, גם אם הסימפטומים חלפו. הפסקת הטיפול לפני הזמן, עלולה לגרום להתפתחות של עמידות חיידקים לתרופה ולחזרת הזיהום.

1. למה מיועדת התרופה?

אנטיביוטיקה לטיפול במחלות הנגרמות על-ידי חיידקים הרגישים לצפלקסין.

קבוצה תרפויטית: צפלוספורינים דור ראשון.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, ראה סעיף 6 - מידע נוסף.
- אתה רגיש (אלרגי). לצפלקסין, או לאנטיביוטיקות אחרות ממשפחת הצפלוספורינים או הפניצילינים. תגובה אלרגית יכולה לכלול: פריחה, גרד, קשיי נשימה, או נפיחות בפנים, בשפתיים, בגרון או בלשון.
- אתה סובל מפורפיריה - מחלה מטאבולית תורשתית.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בצפויט 250/צפויט פורטה 500, ספר לרופא אם:

• אתה סובל או סבלת בעבר מתגובה אלרגית לצפלקסין, או אנטיביוטיקות ממשפחת הצפלוספורינים או הפניצילינים, או תרופות אחרות.

• הינך סובל מליקוי בתפקוד הכליות (ייתכן ותצטרך מינון נמוך).

• אתה מפתח שלשולים. זה יכול להוות תסמין לדלקת במעי הגס. תסמינים נוספים כוללים כאב וחום.

ספר לרופא שלך אם אתה עומד לעבור בדיקות דם או שתן. צפויט 250/צפויט פורטה 500 עלול להפריע לבדיקות האלו.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח

• אנטיביוטיקות אחרות, במיוחד: אמפותריצין, קאפראומיצין, ואנקומיצין, גנטמיצין או ניאומיצין.

• תרופות משתנות כמו פורוסאמיד, בומטאניד.

• פרובנציד לטיפול בשגדון.

• מטפורמין לטיפול בסכרת.

• תרופות לטיפול בלויקמיה.

גם אם אתה לוקח את התרופות לעיל עדיין ייתכן שהטיפול בצפויט הוא הטיפול המתאים עבורך על פי החלטת הרופא המטפל.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול צפויט 250/צפויט פורטה 500 עם או ללא מזון.

הריון והנקה

אם הינך בהריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכננת להיכנס להריון יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

נהיגה ושימוש במכוונות

התרופה לא צפויה להשפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכוונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. אם אינך בטוח באשר לאופן השימוש עליך להתייעץ עם הרופא או הרוקח.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בד"כ הוא:

למבוגרים ולילדים מעל גיל 12:

המינון היומי הוא 1-4 גרם, במנות מחולקות (2-8 כמוסות של 500 מ"ג או 4-16 כמוסות של 250 מ"ג), בהתאם לסוג וחומרת הזיהום.

מינון לילדים:

הרופא יחשב את המינון המדויק לילדך לפי משקל הגוף. המינון המקובל הוא 25-50 מ"ג/ק"ג משקל גוף ליום, במנות מחולקות כל 8 או 12 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש בתרופה: אין ללעוס!

ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון. יש לבלוע את התרופה עם מים

אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא שנית. יש להשתמש בתרופה בזמנים קצובים, כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעת לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בצפויט 250/צפויט פורטה 500 עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם הינך סובל מ:

- פריחה.
- חום.
- גירוי בעור.
- התנפחות של השפתיים, עפעפיים, לשון.
- קשיי נשימה או צפצופים פתאומיים בזמן הנשימה.

כל התופעות הללו מהוות סימנים לתגובה אלרגית. יש להפסיק להשתמש בתרופה מיד.

תופעות לוואי מסוכנות:

- תופעות הלוואי הבאות הן מסוכנות. יש להפסיק את השימוש בתרופה וליצור קשר עם הרופא מיד:
- קילוף נרחב או שלפוחיות על העור.
- שלשול חריף.

תופעות לוואי נוספות:

- שלשול, כאבי בטן, צרבת, בעיות עיכול.
- כאבים בבטן התחתונה, דלקת במעי הגס (קוליטיס), שלשול חריף המכיל ריר ודם.
- בחילות או הקאות.
- פריחה דמוית חצבת.
- גירוד.
- חבורות אדומות על העור (אורטיקריה).
- מוגלה בעיניים.
- שלפוחיות באף או בפה.
- פריחה עם כאבים נרחבים במפרקים ו/או נוקשות פרקים, נפיחות בלוטות הלימפה, חום, וגם ייתכן עכירות בשתן.
- שינויים בספירת תאי הדם, שיכולה לבוא לידי ביטוי כחבורות על העור או תחושת עייפות. יש צורך בבדיקות דם על מנת לוודא זאת.
- פגיעה בכבד או בכליות. ניתן לגלות זאת על ידי בדיקת דם ו/או בדיקת שתן.
- הצהבה של העור והעיניים (צהבת).
- חולשה, התעלפות.
- תחושת בלבול או עצבנות, שמיעה או ראייה של דברים שאינם קיימים (הלוצינציות), חוסר מנוחה קיצוני.
- סחרחורת, עייפות, כאב ראש, בעיות שינה, מתיחות.
- גירוי סביב פי הטבעת או איברי המין, התנפחות בנרתיק, הפרשות מהנרתיק הנגרמות כתוצאה מפטרת (הנגרמת מקנדידה).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון זה, עליך להתייעץ עם הרופא שלך.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקום יבש מתחת ל-25°C.
- אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף:

• נוסף על החומר הפעיל צפויט 250/צפויט פורטה 500 מכיל גם: Starch, Talc, Magnesium Stearate, Gelatine, Titanium Dioxide (E-171), Quinoline Yellow (E-104).

הרכב הדיו:

Shellac, Propylene glycol, Strong ammonia sol., Pot. Hydroxide, Black iron oxide.

כמות הדיו: 150 מק"ג לקפסולה.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
צפויט 250: כמוסה בצבע צהוב, עליה מופיע כיתוב בשחור CEFOVIT VITAMED
צפויט פורטה 500: כמוסה בצבע צהוב, עליה מופיע בשחור CEFOVIT FORTE VITAMED הכיתוב



שם היצרן וכתובתו: ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ויטאמד ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 08.2017 מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

צפויט 250 268425145

צפויט פורטה 500 268525146

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת התרופה מיועדת לבני שני המינים.