

## سيفوقيت فورته معلق

المادة الفعالة وكميتها:

كل 5 مل تحوي: Cephalixin (as monohydrate) 250mg

لقائمة المواد غير الفعالة: انظر الفقرة 6 - "معلومات اضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك الدواء. تحوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. اذا كانت لديك اسئلة اخرى، توجه الى الطبيب او الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم، حتى لو ظننت ان وضعهم الصحي شبيه بوضعك.

من المهم انهاء العلاج كما وُصف من قبل الطبيب، حتى لو اختفت الاعراض. قد يؤدي ايقاف العلاج قبل الوقت الى تطور مقاومة الجراثيم للدواء وعودة التلوث.

يجب تحضير المعلق وفقاً لتعليمات التحضير الظاهرة على ملصق العبوة، يجب خضه جيداً قبل كل استعمال.

### 1. لماذا هذا الدواء؟

مضاد حيوي لعلاج الامراض الناجمة عن الجراثيم الحساسة للسيفالوكسين. المجموعة العلاجية: الجيل الأول للسيفالوسبورين.

### 2. قبل استعمال الدواء:

يُمنع استعمال الدواء اذا كنت:

- لديك حساسية للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الاخرى التي يحويها الدواء (انظر فقرة 6 - معلومات اضافية).
- لديك حساسية لزابليكسين، أو المضادات الحيوية الأخرى من عائلة زيفالوسبورين أو البنسلين. قد تتضمن اثار الحساسية ب: طفح جلدي، حكة، صعوبة في التنفس، أو تورم في الوجه، الشفاه، الحلق أو اللسان.
- تعاني من البورفيريا - وهو مرض وراثي وراثي.

تحذيرات خاصة تخص استعمال الدواء:

قبل العلاج بسيفوقيت فورته معلق، اخبر الطبيب اذا:

• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من حساسية للزابليكسين، مضادات حيوية من مجموعة السيفالوسبورين أو البنسلين، أو أدوية أخرى.

• كنت تعاني من خلل في وظيفة الكلى (قد تحتاج إلى جرعة منخفضة).

• تطور الإسهال. هذا يمكن أن يكون أحد أعراض الالتهاب في القولون. وتشمل الأعراض الأخرى الألم والحمى.

أخبر طبيبك إذا كنت على وشك الخضوع لفحوصات الدم أو البول. يمكن أن يشوش سيفوقيت فورته معلق على هذه الفحوصات.

اذا كنت تتناول، او اذا تناولت مؤخراً، دواء آخر بما في ذلك ادوية بدون وصفة ومكملات الغذاء، ابلغ ذلك للطبيب او الصيدلي. خاصة اذا كنت تتناول:

• المضادات الحيوية الأخرى، خاصة: أمفيتريسين، كابروميسين، و أنكوميسين، جنتاميسين أو نيوميسين.

• مدرات البول مثل بروساميد، بوميتانيد.

• بروفنزيد لعلاج النقرس.

• ميتفورمين لعلاج مرض السكري.

• أدوية لعلاج سرطان الدم.

حتى إذا كنت تتناول الأدوية المذكورة أعلاه، قد يكون العلاج بسيفوقيت هو العلاج المناسب لك حسب قرار الطبيب المعالج.

استعمال الدواء والغذاء:

يُمكن تناول سيفوقيت فورته معلق مع او بدون غذاء

الحمل والرضاعة:

اذا كنت حاملاً او مرضعة، تنظنين انك قد تكونين حاملاً او تخططين للحمل فيجب استشارة الطبيب او الصيدلي قبل استعمال الدواء.

السواقة واستعمال الماكينات:

هذا الدواء لا يؤثر على قابلية السواقة او استخدام الآلات.

معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء

انتبه! 5 مل من سيفوقيت فورته معلق تحوي 2573 ملغ سكروز، 4.2 ملغ صوديوم. يحوي المستحضر سكروز. اذا كانت لديك حساسية لانواع معينة من السكر، فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استخدام الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب. اذا لم تكن متأكدًا من كيفية استعمال الدواء، فيجب عليك استشارة الطبيب او الصيدلي.

الجرعة وطريقة العلاج تحدد بواسطة الطبيب فقط.

الجرعة الموصى بها عادة هي:

الكبار والاولاد فوق سن 12 سنة:

1-4 غم لليوم، بجرعات مقسمة ، (2-8 جرعات نوع 500 ملغ او 4-16 جرعات نوع 250 ملغ) ، حسب نوع وشدة التلوث.

الجرعة للاولاد:

يقوم الطبيب بحساب الجرعة الدقيقة لابنك حسب وزن الجسم. الجرعة الموصى بها هي 25-50 ملغ/كغم وزن جسم لليوم، بجرعات مقسمة كل 8 او 12 ساعة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة استعمال الدواء:

يجب خض القنينة جيداً قبل كل استعمال.

يجب الحرص على قياس جرعة المعلق بكأس القياس.

يُمكن تناول الدواء مع او بدون طعام.

اذا لم يحدث تحسن في صحتك خلال عدة ايام فيجب التوجه للطبيب ثانية. يجب تناول الدواء في فترات محددة، كما حددها الطبيب المعالج.

اذا تناولت جرعة زائدة او اذا بلع ولد بالخطأ من الدواء، توجه فوراً للطبيب او للطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد فقم باستعماله فور تذكرك؛ ولكن يُمنع بأي شكل تناول جرعتين معاً!

#### إذا قمت بإيقاف العلاج بالدواء

حتى إذا حدث تحسن على حالتك الصحية، فيُمنع إيقاف العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

لا تتناول ادوية في العتمة: يجب تشخيص طابع الدواء والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا كان لديك أسئلة أخرى تخص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، فإن استعمال سيفوفثيت فورته معلق قد يؤدي إلى أعراض جانبية لدى قسم من متناولي الدواء. لا تنصدم عند قراءتك الأعراض الجانبية، قد لا تشكو من أي منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه الى الطبيب فوراً إذا عانيت من:

- طفح جلدي.
- الحرارة.
- تهيج في الجلد.
- تورم في الشفتين، الجفون، اللسان.
- صعوبة في التنفس أو صفير مفاجئ أثناء التنفس.
- كل هذه الأعراض هي علامات على حساسية. توقف عن إستعمال الدواء فوراً.

أعراض جانبية خطيرة:

الاعراض الجانبية التالية خطيرة. يجب التوقف عن استخدام هذا الدواء والاتصال بطبيبك فوراً:

- تقشير واسع النطاق أو بثور على الجلد.
- إسهال حاد.

#### الأعراض الجانبية الأخرى:

- إسهال، آلام في البطن، حرقة، مشاكل هضمية.
- ألم في أسفل البطن، التهاب القولون، إسهال حاد مع مخاط ودم.
- غثيان أو قيء.
- طفح جلدي يشبه الحصبه.
- حكة.
- كدمات حمراء على الجلد (الشرى).
- صديد في العينين.
- بثور في الأنف أو الفم.
- طفح جلدي مع ألم واسع في المفاصل و/أو تصلب المفاصل، تورم في الغدد الليمفاوية، الحمى، وقد يكون تعكر في البول.
- تغيرات في تعداد خلايا الدم، والتي يمكن تمييزها بكدمات على الجلد أو الشعور بالتعب. هناك حاجة إلى إجراء فحوصات دم لتأكيد ذلك.
- تلف في الكبد أو في الكلى. يمكن الكشف عن ذلك عن طريق فحص الدم و/أو فحص البول.
- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).
- ضعف، إغماء.
- الشعور بالخلط أو عصبية، سمع أو رؤية أشياء لا وجود لها (الهلوسة)، وأرق شديد.

- دوخة، تعب، صداع، مشاكل النوم، توتر.

- تهيج حول فتحة الشرج أو الأعضاء التناسلية، تورم في المهبل، إفرازات مهبلية ناجمة عن الفطريات (الناجمة عن المبيضات).

إذا ظهر عرض جانبي، أو إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من أعراض جانبية لم تذكر في النشرة، فيجب عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية بواسطة الضغط على الرابط: "إبلاغ عن أعراض جانبية بسبب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يصلك

باستمارة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو بواسطة الدخول للرابط: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

#### 5. كيف تخزن الدواء؟

- امنع التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال و/او الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا تتسبب بالتقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد انقضاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العبوة. تاريخ انقضاء الصلاحية يُظهر اليوم الاخير لنفس الشهر.
- يجب حفظ المسحوق في مكان جاف وبدرجة حرارة تحت 25°C.
- يجب حفظ المعلق الجاهز في الثلاجة واستعماله خلال 14 يوماً.
- يُمنع القاء الادوية للمجاري أو للقمامة. اسأل الصيدلي كيف يمكن التخلص من الادوية الغير مستعملة. هذه الطرق تساعد في الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات اخرى:

- بالإضافة الى المواد الفعالة سيفوفثيت فورته معلق يحتوي كذلك في كل ملعقة (5 مل):

Sucrose 2.57g, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Strawberry flavor, Simethicone, Citric Acid, Yellow Iron Oxide (E-172), Banana Flavour, Peach Flavour, EDTA Sodium.

- كيف يبدو الدواء وماذا يوجد بداخل العبوة:

قنينة تحوي مسحوق برتقالي.

سيفوفثيت فورته معلق بعد إضافة الماء المقطر:

سائل باللون الأبيض إلى الأصفر الفاتح برائحة الفاكهة.

المنتج وعنوانه: فيتاميد لصناعة الادوية م.ص.

ص.ب. 114، بنيامينا 3055002، اسرائيل.

فحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة وزارة الصحة في تاريخ 2017/08.

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في وزارة الصحة: 268325148

من اجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتبت هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، هذا الدواء مخصص للجنسين.