

موكسينيت فورته 250 معلق

المادة الفعالة وكميتها: تحوي كل ملعة (5 مل):

Amoxycillin 250 mg (as trihydrate)

للمزيد من المعلومات اضافية انظر الفقرة 6 - معلومات اضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك الدواء. تحوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. اذا كانت لديك اسئلة اخرى، توجه الى الطبيب او الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين. قد يضرهم، حتى لو ظننت ان وضعهم الصحي شبيه بوضعك.

من المهم انهاء العلاج كما وُصف من قبل الطبيب، حتى لو اختفت الاعراض. قد يؤدي ايقاف العلاج قبل الوقت الى تطور مقاومة الجراثيم للدواء وعودة التلوث.

يجب تحضير المعلق حسب تعليمات التحضير الظاهرة على ملصق العبوة وخطها جيداً قبل كل استعمال.

1. لماذا هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصص لمعالجة الامراض التي تسببها الجراثيم الحساسة للأموکسيلين.

المجموعة العلاجية: مضادات حيوية من مجموعة البنسلينات شبه الاصطناعية.

2. قبل البدء باستعمال الدواء

منع استعمال الدواء إذا:

- لديك حساسية للأموکسيلين أو لأي من المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء.
- لديك لحساسية لأدوية أخرى من مجموعة السيفالوسبورين أو البنسلين.
- إذا كنت تعاني من الحمى الغدية (كريات الدم البيضاء)..

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- يجب ابلاغ الطبيب عن اي حساسية لديك لطعام او عقاقير قبل استعمالك للدواء.

يجب ابلاغ الطبيب اذا كنت تعاني من اي نوع من امراض الحساسية.
في حالة العلاج الطويل يجب اجراء فحوصات دورية لاداء الكلى، الكبد والدم.
إذا كنت تأخذ هذا الدواء، فعليك ابلاغ الطبيب قبل اجراء فحص السكر في الدم او البول وذلك لأن هذا الدواء قد يسبب نتيجة ايجابية كاذبة لهذه الفحوصات.

قبل العلاج بموكسينيت فورته 250 معلق اخبر الطبيب اذا:

- إذا كنت حاملاً او مرضعة.
- اذا كنت تعاني او عانيت في الماضي من خلل في وظيفة:

• الكلى.

• الكبد.

• الهضم (مثل التهاب الأمعاء).

• جهاز الدم (مثل تجلط الدم، وما شابه).

• إذا كنت تأخذ علاج لمشكلة في الكلى.

• إذا كنت لا تدر البول بشكل طبيعي.

إذا كنت تعاني من ندرة في التبول ولا تستهلك كميات كافية من السوائل.

إذا كنت قد تعرضت في الماضي لحساسية لأى مضاد حيوي.

إذا كنت تعاني من مرض mononucleosis "عدد كريات الدم البيضاء" (الحمى الغدية)، ومن اعراضه الحمى على خلفية التهاب في الغدد.

إذا كنت تتعاطى دواء إضافياً او إذا أنهيت مؤخراً العلاج بأدوية اخرى، بما في ذلك ادوية بدون وصفة طبيب ومكممات الغذاء، فيجب اعلام الطبيب او الصيدلي. يجب اعلام الطبيب اذا كنت تتناول:

- مضادات حيوية من المجموعات: تتراسكلينات، كلورامفينيكولات، اريثروميسين، سولفوناميد.
- البروبينسید او الوببوريونول (المرض النقرس).

حبوب منع الحمل - أموکسيلين قد يقلل من فعالية حبوب منع الحمل لذلك فمن المستحسن استخدام وسائل منع اضافية في فترة العلاج، مثل استخدام الواقي الذكري او غشاء الذي يحتوي على مبيد النطاف.

ادوية مضادة لتخثر الدم التي تعطى عن طريق الفم (مثل الوارفارين).

تناول الدواء والغذاء:

يمكن تناول موكسينيت فورته 250 معلق مع او بدون طعام.

الحمل والرضاعة:

يجب استشارة الطبيب اذا كنت حاملاً او مرضعة.

السوقة واستعمال الماكنات:

لا يوجد توقعات من تأثير الدواء على إمكانية السوقة او تشغيل الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مكونات الدواء:

تحوي كل 5 مل من المعلق 1.939 غرام سكر و 5.6 ملغرام صوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً الاستعمال حسب تعليمات الطبيب. إذا لم تكن متأكداً من كيفية استعمال الدواء، فافحص الأمر مع الطبيب أو الصيدلي.

تعليمات تحضير المعلق:

لعلبة 60 مل: يضيف الصيدلي 41 مل ماء مقطر للقنبينة ويؤخذها جيداً للحصول على معلق متوازن.

لعلبة 100 مل: يضيف الصيدلي 70 مل ماء مقطر للقنبينة ويؤخذها جيداً للحصول على معلق متوازن.

الجرعة وطريقة العلاج تحدد بواسطة الطبيب فقط.

يحدد الطبيب المعالج جرعة الدواء المطلوبة والفترقة الزمنية التي يجب بها تناول الدواء وفقاً لنوع التلوث الذي تعاني منه ودرجة خطورته.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة استعمال الدواء:

يجب خصم العبوة جيداً قبل الاستعمال.

يجب الحرص على قياس جرعة المعلق بكأس القياس.

يمكن تناول الدواء مع او بدون طعام.

إذا تناولت جرعة مفرطة او إذا تناول طفل هذا الدواء خطأ، فتتوجه فوراً الى الطبيب او لغرفة الطوارئ في المستشفى مصطحبًا عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد - فيجب تناولها فور تذكرك والعودة الى قائمة الاوقات الاعتيادية، ولكن يُمنع تناول جرعتين معاً في اي حال من الاحوال من اجل تعويض الجرعة التي نسيتها.

يجب الاستمرار بالعلاج كما وُصف من قبل الطبيب.

إذا قمت بایقاف العلاج بالدواء

حتى اذا حدث تحسن على حالي الصحية، فيُمنع ايقاف العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب او الصيدلي.

لا تتناول ادوية في العتمة: يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية اذا لزم الأمر ذلك.

إذا كان لديك اسئلة اخرى تخص استعمال الدواء، استشر الطبيب او الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، فإن استعمال موكسينيت فورته 250 معلق قد يؤدي إلى اعراض

اعراض جانبية نادرة جداً (تظهر منتشرة لدى اقل من 1 من 1000 مريض):

- حساسية شديدة والتي تشمل طفح جلدي أو حكة، تورم في الوجه، الشفتين، اللسان، الجسم، صعوبة التنفس. هذه الظاهرة خطيرة وأدت في بعض الأحيان إلى حالات وفاة.
- حساسية التهاب الأوعية الدموية وتشمل، أعراض، الطفح الحدبي، أو

- قد تحدث حساسية في وقت لاحق من 7-12 يوم بعد تناول الدواء، وقد تشمل الاعراض الطفح الجلدي، الحمى، آلام المفاصل، تضخم الغدد الليمفاوية (خاصة مفاصل ومشاكل في الكلى).

- حساسية من نوع حمامي عديدة الأشكال والتي تشمل علامات بقع على الجلد وحكة باللون البنفسجي والأحمر، خاصة على كف اليدين والقدمين، آفات جلدية بارزة، حساسية في الفم، العينين وفي أجزاء أخرى من الجسم، حمى وتعب.

- التهاب القولون مصحوب بالإسهال، وأحياناً مع دم في البراز، ألم وحمى.
- اعراض خطيرة تتعلق بالكبد، التي تحدث عادة عندما يستمر العلاج لفترة طويلة، لدى الرجال او المسنين. هذه الاعراض تكون عادة انعكاسية. يجب استشارة الطبيب فوراً إذا:
 - إسهال شديد مع نزيف.
 - بشرقة، احمرار، أو علامات اصابة حادّة.

- بول غامق أو براز شاحب.
- اصفرار الجلد أو العينين (يرقان). (قد يظهر هذا العرض أيضاً كعرض لفقر الدم. انظر أدناه).
- قد تحدث هذه الاعراض أثناء العلاج أو بعد عدة أسابيع بعد الانتهاء من العلاج.

أعراض جانبية أخرى:

أعراض جانبية شائعة

(أعراض تظهر في 1 - 10 من أصل 100 مستخدمين):

- إسهال أو ألم في البطن، غثيان.

- صفح جلدي.
- اعراض جانبية غير شائعة
- (اعراض تظهر في 1 - 10 مستخدمين من 1000):
- قيء.
- طفح مع حكة.

- فطر في الفم، في المهبل أو في الجلد.
- تغير لون الأسنان: (مؤقت).

- تشنجات - خاصة لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو إذا دخلوا في حركة مفبركة للعضلات (فرط الحراك).
- دوخة.

- التهاب الكبد أو اليرقان على خلفية الاعاقة.
- بلورات في البول - يبدو البول عكر أو صعوبية أو عدم الراحة في التبول. يجب تناولوا جرعة عالية.
- التهاب في الكلى.
- اضطراب فرط النشاط.

- تغير لون اللسان الى الأصفر، البني أو الاسود، وقد تظهر طبقة من الكسوة على اللسان.
- فرق الاسماء، وتشمل الأعماق، التعرس، العبراء، غبة التنفس، الدوخة، الشعور

- قعر الدم - ويسمنه اهـ عراضـ المـعـبـ، المصـدـعـ، صـيـقـ الـتـنـفـسـ، الدـوـحـ، اـسـحـوبـ، اـصـفـارـ الجـلـدـ وـالـعـيـنـينـ.
- قد يطـولـ الـوقـتـ لـتـخـثـرـ الدـمـ (فيـ حالـاتـ نـزـيفـ منـ الانـفـ أوـ الإـصـابـةـ بـجـرـحـ). فيـ حالـ ظـهـورـ ايـ مـنـ الـاعـراضـ الـجـانـبـيـةـ اوـ تـسـوـعـ، اوـ إـذـاـ شـعـرـتـ باـعـراضـ جـانـبـيـةـ غـيرـ مـذـكـورـةـ فـيـ النـشـرـةـ فـيـجبـ عـلـيـكـ اـسـتـشـارـةـ الطـبـيبـ.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية بواسطة الضغط على الرابط: "ابلاغ عن اعراض جانبية بسبب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يصلك باستماراة للتبلغ عن اعراض جانبية.

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء اخر، في مكان مغلق، بعيدا عن متناول أيدي الاطفال وأيادي الاطفال وهكذا تتجنب التسمم. من دون تعليمات واضحة من الطبيب يمكن التسبب بالتفيق.
- منوع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على

- يجب تخزين المسحوق في علبة الكرتون، محمي من الضوء في مكان جاف وبدرجة حرارة تحت 25°C .
- يحتفظ المعلقة الجاهزة في درجة حرارة الغرفة استعماله خلال 14 يوماً.

- يُمنع القاء الأدوية للمجاري أو للقمامة. أسأل الصيدلي كيف يمكن التخلص من الأدوية الغير مستعملة. هذه الطرق تساعد في الحفاظ على البيئة.

كل 5 مل تحوي: Sucrose (1.939 gr), Sodium Benzoate, Strawberry Flavor, Xanthan Gum, Sodium Citrate, Simethicone, Banana Flavor, EDTA Sodium, (sodium content 5.6 mg).
كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة: قننة تحوى مسحوق ابيض.

**موكسيفيت فورته 250 معلق بعد اضافة الماء المقطر:
سائل باللون الابيض حتى الاصفر الفاتح مع رائحة فاكهة.**

المنتج وصاحب الامتياز:
فيتاميد لصناعة الأدوية مرض. ص.ب. 114، بنيامينا 3055002، اسرائيل.
قد تساعدك هذه الأدواء في قائمة الأدواء في وزارة الصحة:

فُحصت هذه النشرة وصودقت ب بواسطة وزارة الصحة في تاريخ 10/10/2015
موكسيفيت فورته 250 معلق: 452226064
رسم سبليت مساواة هي المسئولة في وزارة الصحة.

من ذلك، هذا الدواء مخصص للـ