

أموكسي كير فورته 250 معلق

المادة الفعالة وكميتها: تحوي كل ملعقة (5 مل):
Amoxycillin 250 mg (as trihydrate)

لقائمة المواد غير الفعالة: انظر الفقرة 6 - معلومات اضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك الدواء. تحوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. اذا كانت لديك اسئلة اخرى، توجه الى الطبيب او الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم، حتى لو ظننت ان وضعهم الصحي شبيه بوضعك.

من المهم انهاء العلاج كما وُصف من قبل الطبيب، حتى لو اختفت الاعراض. قد يؤدي ايقاف العلاج قبل الوقت الى تطور مقاومة الجراثيم للدواء وعودة التلوث.

يجب تحضير المعلق حسب تعليمات التحضير الظاهرة على ملصق العبوة وخضها جيداً قبل كل استعمال.

1. لماذا هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصص لمعالجة الامراض التي تسببها الجراثيم الحساسة للأموكسيلين.

المجموعة العلاجية: مضادات حيوية من مجموعة البنسلينات شبه الاصطناعية.

2. قبل البدء باستعمال الدواء

لا ممنوع استعمال الدواء إذا:

- لديك حساسية للأموكسيسيلين أو لأي من المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء.
- لديك لحساسية لأدوية أخرى من مجموعة السيفالوسبورين أو البنسلين.
- إذا كنت تعاني من الحمى الغدية (كريات الدم البيضاء)..

⚠ تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

• يجب ابلاغ الطبيب عن اي حساسية لديك لطعام او عقاقير قبل استعمالك للدواء.

• يجب ابلاغ الطبيب اذا كنت تعاني من اي نوع من امراض الحساسية.

• في حالة العلاج الطويل يجب اجراء فحوصات دورية لأداء الكلى، الكبد والدم.

• إذا كنت تأخذ هذا الدواء، فعليك ابلاغ الطبيب قبل اجراء فحص السكر في الدم أو البول وذلك لان هذا الدواء قد يسبب نتيجة إيجابية كاذبة لهذه الفحوصات.

⚠ قبل العلاج أموكسي كير فورته 250 معلق اخبر الطبيب اذا:

• إذا كنت حاملاً او مرضعة.

• إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة:

• الكلى.

• الكبد.

• الهضم (مثل التهاب الأمعاء).

• جهاز الدم (مثل تجلط الدم، وما شابه).

• إذا كنت تأخذ علاج لمشكلة في الكلى.

• إذا كنت لا تدر البول بشكل طبيعي.

• إذا كنت تعاني من ندرة في التبول ولا تستهلك كميات كافية من السوائل.

• إذا كنت قد تعرضت في الماضي لحساسية لأي مضاد حيوي.

• إذا كنت تعاني من مرض mononucleosis "عدد كريات الدم البيضاء" (الحمى الغدية)، ومن أعراضه الحمى على خلفية التهاب في الغدد.

⚠ اذا كنت تتعاطى دواءً إضافياً أو إذا أنهيت مؤخراً العلاج بأدوية اخرى، بما في ذلك ادوية بدون وصفة طبيب ومكملات الغذاء، فيجب اعلام الطبيب او الصيدلي. يجب اعلام الطبيب اذا كنت تتناول:

• مضادات حيوية من المجموعات: تتراسكلينات، كلورامفينيكولات، اريثروميسين، سولفوناميد.

• البروبيينسيد أو الوبورينول (لمرض النقرس).

• حبوب منع الحمل - أموكسيسيلين قد يقلل من فعالية حبوب منع الحمل لذلك فمن المستحسن استخدام وسائل منع اضافية في فترة العلاج، مثل استخدام الواقي الذكري أو غشاء الذي يحتوي على مبيد النطاف.

• ادوية مضادة لتخثر الدم التي تعطى عن طريق الفم (مثل الوارفارين).

⚠ تناول الدواء والغذاء:

يُمكن تناول أموكسي كير فورته 250 معلق مع او بدون طعام.

⚠ الحمل والرضاعة

يجب استشارة الطبيب اذا كنت حاملاً او مرضعة.

⚠ السواقة واستعمال الماكينات:

لا يوجد توقعات من تأثير الدواء على إمكانية السواقة او تشغيل الماكينات.

⚠ معلومات هامة عن بعض مكونات الدواء:

تحوي كل 5 مل من المعلق 1.939 غرام سكر و 5.6 ملغرام صوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً الاستعمال حسب تعليمات الطبيب. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية استعمال الدواء، فافحص الأمر مع الطبيب أو الصيدلي.

تعليمات تحضير المعلق:

لعبوة 60 مل: يضيف الصيدلي 41 مل ماء مقطر للقنينة ويخضها جيداً للحصول على معلق متجانس.

لعبوة 100 مل: يضيف الصيدلي 70 مل ماء مقطر للقنينة ويخضها جيداً للحصول على معلق متجانس.

الجرعة وطريقة العلاج تحدد بواسطة الطبيب فقط.

يحدد الطبيب المعالج جرعة الدواء المطلوبة والفترة الزمنية التي يجب بها تناول الدواء وفقاً لنوع التلوث الذي تعاني منه ودرجة خطورته.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة استعمال الدواء:

يجب خض العبوة جيداً قبل الاستعمال.

يجب الحرص على قياس جرعة المعلق بكأس القياس.

يُمكن تناول الدواء مع او بدون طعام.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا تناول طفل هذا الدواء خطأً، فتوجه فوراً الى الطبيب او لغرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد - فيجب تناولها فور تذكرك والعودة الى قائمة الاوقات الاعتيادية، ولكن يُمنع تناول جرعتين معاً في اي حال من الاحوال من اجل تعويض الجرعة التي نسيتها.

يجب الاستمرار بالعلاج كما وُصف من قبل الطبيب.

إذا قمت بايقاف العلاج بالدواء

حتى اذا حدث تحسن على حالتك الصحية، فيُمنع ايقاف العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب او الصيدلي.

لا تتناول ادوية في العتمة: يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية اذا لزم الأمر ذلك.

اذا كان لديك اسئلة اخرى تخص استعمال الدواء، استشر الطبيب او الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، فإن استعمال أموكسي كير فورته 250 معلق قد يؤدي إلى

أعراض جانبية لدى قسم من متناولي الدواء. لا تنصدم عند قراءة تلك الأعراض الجانبية، قد لا تشكو من أي منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه الى الطبيب فوراً في الحالات التالية:
اعراض جانبية نادرة جداً (تظهر منتشرة لدى اقل من مريض 1 من 10,000 مريض):

- حساسية شديدة والتي تشمل طفح جلدي أو حكة، تورم في الوجه، الشفتين، اللسان، الجسم، صعوبة التنفس. هذه الظاهرة خطيرة وأدت في بعض الأحيان الى حالات وفاة.
- حساسية التي تسبب التهاب الأوعية الدموية وتشمل أعراض الطفح الجلدي أو بقع حمراء تحت الجلد أو علامات كدمات على الجلد. قد يرافق هذا العرض بآلام مفاصل ومشاكل في الكلى.
- قد تحدث حساسية في وقت لاحق من 7-12 يوم بعد تناول الدواء. وقد تشمل الاعراض الطفح الجلدي، الحمى، آلام المفاصل، تضخم الغدة الليمفاوية (خاصة تحت الاذرع).
- حساسية من نوع حمامي عديدة الأشكال والتي تشمل علامات بقع على الجلد وحكة باللون البنفسجي والأحمر، خاصة على كف اليدين والقدمين، آفات جلدية بارزة، حساسية في الفم، العينين وفي أجزاء أخرى من الجسم، حمى وتعب.
- اعراض جلدية شديدة اخرى، والتي تشمل: تغير في لون الجلد، نتوءات في الجلد، حكة، جلد حشفي، تقشير، بثور، احمرار، الم، المصحوبة أحياناً بالحمى، الم رأس وآلام في الجسم.
- حمى، قشعريرة، الم الحلق وعلامات التهابات اخرى، علامات اصابة (كدمات) التي تحدث بسهولة. قد تشير هذه العلامات الى مشكلة في خلايا الدم.
- التهاب القولون مصحوب بالإسهال، وأحياناً مع دم في البراز، ألم وحمى.
- اعراض خطيرة تتعلق بالكبد، التي تحدث عادة عندما يستمر العلاج لفترة طويلة، لدى الرجال او المسنين. هذه الاعراض تكون عادة انعكاسية. يجب استشارة الطبيب فوراً إذا:
 - إسهال شديد مع نزيف.
 - بثور، احمرار أو علامات إصابة جلدية.
 - بول غامق أو براز شاحب.
 - اصفرار الجلد أو العينين (يرقان). (قد يظهر هذا العرض أيضا كعرض لفقر الدم. انظر أدناه).

قد تحدث هذه الاعراض أثناء العلاج أو بعد عدة أسابيع بعد الانتهاء من العلاج.

أعراض جانبية أخرى:

- أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر في 1 - 10 من أصل 100 مستخدمين):
 - إسهال أو ألم في البطن، غثيان.
 - طفح جلدي.
- أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر في 1 - 10 مستخدمين من 1000):
 - قيء.
 - طفح مع حكة.
- أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى اقل من مريض 1 من 10,000 مريض):
 - فطر في الفم، في المهبل أو في الجلد.
 - تغيير لون الأسنان (مؤقت).
 - حركة مفرطة للعضلات (فرط الحراك).
 - دوخة.
 - تشنجات - خاصة لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو اذا تناولوا جرعة عالية.
 - التهاب في الكلى.
 - اضطراب فرط النشاط.
 - التهاب الكبد أو اليرقان على خلفية الاعاقة.
 - بلورات في البول - يبدو البول عكر أو صعوبة أو عدم الراحة في التبول. يجب الحرص على تناول السوائل بكثرة لتفادي هذا العرض.
 - تغير لون اللسان الى الأصفر، البني أو الأسود، وقد تظهر طبقة من الكسوة على اللسان.
 - فقر الدم - وتشمل الأعراض التعب، الصداع، ضيق التنفس، الدوخة، الشحوب، اصفرار الجلد والعيون.
 - قد يطول الوقت لتخثر الدم (في حالات نزيف من الانف أو الإصابة بجرح).
- في حال ظهور اي من الاعراض الجانبية او تسوء، أو إذا شعرت بأعراض جانبية غير مذكورة في النشرة فيجب عليك استشارة الطبيب.
- يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية بواسطة الضغط على الرابط: "إبلاغ عن أعراض جانبية بسبب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يصلك باستمراراً للتبليغ عن أعراض جانبية.

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء اخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال وهكذا تتجنب التسمم. من دون تعليمات واضحة من الطبيب يمنع التسبب بالتقيؤ.
- ممنوع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير في الشهر.
- يجب تخزين المسحوق في علبة الكرتون، محمي من الضوء في مكان جاف وبدرجة حرارة تحت 25°C.
- يجب حفظ المعلق الجاهز في درجة حرارة الغرفة واستعماله خلال 14 يوماً.
- يُمنع القاء الادوية للمجاري أو للقمامة. اسأل الصيدلي كيف يمكن التخلص من الادوية الغير مستعملة. هذه الطرق تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات اضافية

بالإضافة الى المادة الفعالة يحتوي هذا الدواء كذلك على:
Sucrose (1.939 gr), Sodium Benzoate, Strawberry Flavor, Xanthan Gum, Sodium Citrate, Simethicone, Banana Flavor, EDTA Sodium, (sodium content 5.6 mg).
كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة: قنينة تحوي مسحوق ابيض.
أموكسي كير فورته 250 معلق بعد اضافة الماء المقطر:
سائل باللون الابيض حتى الاصفر الفاتح مع رائحة فاكهة.

المنتج وصاحب الامتياز:

فيتاميد لصناعة الادوية م.ض.ص.ب. 114، بنيامين 3055002، اسرائيل.
رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في وزارة الصحة:
أموكسي كير فورته 250 معلق: 1551734692
فحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة وزارة الصحة في تاريخ 2015/12
من اجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتبت هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، هذا الدواء مخصص للجنسين.