

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في تشرين الثاني 2016

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

CAPD 17 محلول للدياليزا الصفاقية

CAPD 18 محلول للدياليزا الصفاقية

CAPD 19 محلول للدياليزا الصفاقية

المواد الفعالة وكميتها/ تركيزها:

كل ليتر واحد من المحلول يحتوي على:

	CAPD 17	CAPD 18	CAPD 19
Sodium chloride	كلوريد الصوديوم	5.786 g	5.786 g
Sodium lactate = Sodium lactate solution 50%	لاكتات الصوديوم = محلول لكتات الصوديوم 50%	3.925 g = 7.85 g	3.925 g = 7.85 g
Calcium chloride	كلوريد الكالسيوم	0.1838 g	0.1838 g
Magnesium chloride	كلوريد المغنيزيوم	0.1017 g	0.1017 g
Glucose (as monohydrate)	جلوكوز (ك مونوهيدرات)	16.5 g	46.75 g

لقائمة المواد غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة 6.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الممرضة.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن غاية الإستعمال مشابهة.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لِلإستعمال لدى المرضى الذين يعانون من قصور كلوي مزمن المتعالجين بالديلزة الصفاقية.

الفصيلة العلاجية: محلول للديلزة الصفاقية.

2) قبل إستعمال الدواء:

لا يجوز إستعمال الدواء إذا: - كنت حساساً (أليرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. - وجدت لديك نسب منخفضة جداً من البوتاسيوم في الدم. - وجدت لديك نسب منخفضة جداً من الكالسيوم في الدم. - كنت تعاني من إضطرابات في إستقلاب اللاكتات (حمض اللبن). - وجدت لديك إضطرابات في إستقلاب الفركتوز (عدم تحمل وراثي للفركتوز). يجب نفي وجود عدم تحمل وراثي غير مشخص للفركتوز، قبل بدء العلاج لدى الرضع والأطفال الصغار. - كان حجم السوائل في جسمك منخفض جداً (بخصوص CAPD و- 19 فقط). - لديك إنخفاض في ضغط الدم (بخصوص CAPD 18 و- 19 فقط).
--

لا يجوز بدء العلاج بالديلزة الصفاقية في الحالات التالية:

- إذا وجدت لديك تغيرات في منطقة البطن، مثل:
 - إصابات، أو بعد عملية جراحية
 - سابقة لعمليات جراحية في البطن مع إلتصاقات
 - حروق خطيرة
 - إنتقاب داخل البطن
 - ردود فعل جلدية إلتهابية واسعة (إلتهاب الجلد)
 - إلتهاب في الصفاق (peritoneum)
 - ناسور بطني خارجي أو داخلي
 - جروح نازة، لا تشفى
 - فتق سرري، أربي، حجابي أو فتق آخر في البطن
 - ورم داخل البطن
 - تقرحات
- إذا كنت تعاني من أمراض معوية إلتهابية (مرض كرون، إتهاب القولون التقرحي، إلتهاب الرتج [diverticulitis])
- إذا كنت تعاني من إنسداد في الأمعاء
- إذا كنت تعاني من مرض رئوي خاصة إلتهاب الرئتين
- إذا كنت تعاني من تسمم الدم الناتج عن الإرترايم (إنتان الدم)
- إذا كنت تعاني من نسب مرتفعة جداً من الشحميات في الدم
- إذا كنت تعاني من تسمم نادر ناجم عن نواتج البول في الدم (uremia) الذي لا يمكن علاجه بواسطة تنقية الدم (الديلزة الصفاقية)
- إذا كنت تعاني من سوء تغذية خطير الذي يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية وفقدان الوزن، خاصة إذا لم تكن هنالك إمكانية لإستهلاك كمية كافية من الغذاء الحاروي على بروتينات
- لدى المرضى الذين لا يستطيعون من ناحية جسدية أو عقلية إجراء الديلزة الصفاقية بحسب تعليمات الطبيب

إذا تطورت لديك إحدى تلك الإضطرابات خلال العلاج بالديلزة، يجب التوجه إلى الطبيب ليتخذ قرار حول مواصلة العلاج.

لدى المرضى الذين لا يستطيعون من ناحية جسدية أو عقلية إجراء الديلزة الصفاقية بحسب تعليمات الطبيب

إذا كنت تعاني من سوء تغذية خطير الذي يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية وفقدان الوزن، خاصة إذا لم تكن هنالك إمكانية لإستهلاك كمية كافية من الغذاء الحاروي على بروتينات

لدى المرضى الذين لا يستطيعون من ناحية جسدية أو عقلية إجراء الديلزة الصفاقية بحسب تعليمات الطبيب

إذا تطورت لديك إحدى تلك الإضطرابات خلال العلاج بالديلزة، يجب التوجه إلى الطبيب ليتخذ قرار حول مواصلة العلاج.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

يجب إبلاغ الطبيب حالاً إذا:

- كنت تعاني من **فقدان خطير للشوارد الكهربائية (أملاح)** نتيجة تقيؤات و/ أو إسهالات (من الجائز أن يحتاج الأمر إجراء تغيير مؤقت بمحلول الديلزة الصفاقية الحاوي على بوتاسيوم).
- كنت تعاني من **فرط نشاط الغدة نظيرة الدرقية** أو من **إنخفاض نسبة الكالسيوم في الدم**، من الجائز أن يحتاج الأمر أن تتناول بالإضافة رابطات الفوسفات الحاوية على كالسيوم و/ أو فيتامين D. إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب إستعمال محلول ديلزة صفاقية ذو تركيز مرتفع أكثر من الكالسيوم.
- إذا كنت تعاني من **إلتهاب في الصفاق**، الذي يمكن تشخيصه من خلال وجود تعكر في السائل المتبقي في نهاية الديلزة أو تناقص في حجمه، ألم في البطن، سخونة، الشعور بوعكة أو في أحيان نادرة جدا تسمم الدم (إنتان الدم). يجب أن ترى الطبيب الكيس الحاوي على سائل الديلزة المُصرف.

- إن تنقية الدم يمكن أن تؤدي إلى **فقدان بروتينات وفيتامينات ذوابة في الماء**. يوصى بحمية مناسبة أو بإضافات غذائية لتجنب حالة من النقص.
- يجب إستعمال محاليل ديلزة ذات تركيز مرتفع من الجلوكوز (CAPD 18 و- 19) بحذر - لتجنب التجفاف والحد من إستهلاك الجلوكوز.
- إن المرضى المسنين معرضون لخطورة أكبر لحدوث فتق.

❗ فحوص ومتابعة:

يجري الطبيب متابعة دائمة لـ:

- وزنك وحالة التغذية لديك
- توازن الشوارد الكهربائية (الأملاح) لديك - الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيزيوم، الفوسفور، التوازن الحمضي القلوي
- بروتينات في الدم
- كرياتينين والبولة في الدم
- السكر في الدم
- هورمونات الغدة نظيرة الدرقية ومؤشرات أخرى لإستقلاب العظم
- تعداد الدم
- وظائف الكلى

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

- يحتوي محلول **CAPD 17** على 15 غرام جلوكوز وحتى 0.75 غرام فركتوز في 1000 ملل محلول. أي يزود الجسم بحتى 30 غرام من الجلوكوز بكل كيس ذو 2000 ملل.
- يحتوي محلول **CAPD 18** على 42.5 غرام جلوكوز وحتى 2.1 غرام فركتوز في 1000 ملل محلول. أي يزود الجسم بحتى 85 غرام من الجلوكوز بكل كيس ذو 2000 ملل.
- يحتوي محلول **CAPD 19** على 22.73 غرام جلوكوز وحتى 1.1 غرام فركتوز في 1000 ملل محلول. أي يزود الجسم بحتى 45 غرام من الجلوكوز بكل كيس ذو 2000 ملل.

لدى مرضى السكري يجب الأخذ بعين الإعتبار معطيات كمية الجلوكوز التي يمتصها الجسم، وملاءمة المقدار الدوائي لأدوية علاج السكري بما يتناسب (أنظر معلومات إضافية في الفقرة التالية بخصوص أدوية السكري).

❗ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول أدوية من المجموعات التالية لأن إستعمال محلول للديلزة الصفاقية قد يؤثر على نجاعة أدوية أخرى ومن الجائز أن يحتاج الأمر إجراء ملاءمة للمقدار الدوائي:

- أدوية لقصور القلب،** مثل ديجوكسين، يفحص الطبيب نسبة البوتاسيوم في دمك ويتخذ الإجراءات الملائمة بحسب الحاجة
- الأدوية التي تؤثر على نسبة الكالسيوم،** مثل تلك التي تحوي كالسيوم أو فيتامين D
- أدوية مدرة للبول،** مثل هيدروكلوريتايزيد
- أدوية للسكري** التي يتم تناولها عن طريق الفم أو إنسولين، يجب قياس نسبة السكر في الدم بشكل دائم. لدى مرضى السكري يجب ملاءمة المقدار الدوائي من الإنسولين أو المقدار الدوائي لأدوية السكري التي يتم تناولها عبر الفم وفقا لإستيعاب الجلوكوز لدى مرضى الديلزة (أنظر الفقرة " معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء ")

❗ الحمل والإرضاع:

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة فيجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الادوية.

لا يتوفر ما يكفي من المعلومات حول إستعمال المستحضر خلال فترة الحمل والإرضاع.

❗ السياقة وإستعمال الماكنتا

عند إستعمال الدواء بحسب التعليمات، فإن CAPD لا يؤثر على قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكنتا.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب الإستعمال دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.
- يحدد الطبيب طريقة، مدة وتيرة الإستعمال، حجم المحلول المطلوب وفترة البقاء في جوف البطن.
- بعد تلقي الإرشاد الملائم بالإمكان إجراء الديلزة ذاتياً في البيت. يجب متابعة التعليمات التي قدمت في الإرشاد بالضبط.**

يجب الحرص على شروط النظافة عند تبديل الأكياس لتقليل خطورة حدوث تلوثات.

لِلإستعمال في التجويف الصفاقي فقط (إستعمال داخل الصفاق فقط).

لا يجوز إستعمال محلول الديلزة الصفاقية للتسريب الوريدي.

يجب إستعمال محلول CAPD فقط إذا كان المحلول رافقاً والكيس ليس معطوباً.

إذا تشكل شد في منطقة البطن، فيجب تقليل الحجم.

يجب إستعمال كل كيس مرة واحدة فقط، ويجب رمي بقايا المحلول.

دائماً افحص فيما إذا كان محلول الديلزة المُصرف عكراً. أنظر الفقرة 2 " تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء ".

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

الديلزة الصفاقية المستمرة المتقطعة (CAPD):

- الكبار والمسنون:** 2000 – 3000 ملل محلول 4 مرات في اليوم كامر متعلق بوزن الجسم والأداء الوظيفي للكلى. يتم إدخال المقدار الدوائي الملائم إلى جوف البطن بواسطة قنطر لمدة 5 – 20 دقيقة. بعد فترة بقاء ذات 2 – 10 ساعات بموجب تعليمات الطبيب، يجب تصريف المحلول.
- الأطفال والمراهقون حتى عمر 18 سنة:** يحدد الطبيب حجم محلول الديلزة المطلوب بحسب العمر، الطول ووزن الطفل. المقدار الدوائي الموصى به هو 30 – 40 مل/ كلغ من وزن الجسم.

الديلزة الصفاقية الآلية (APD):

يتم السيطرة على إستبدال الأكياس بشكل آلي بواسطة الماكنة خلال الليل. لأجل ذلك يتم إستعمال منظومة الـ سليپ - سيف (sleep-safe).

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة الإستعمال:

منظومة الـ ستبي سيف (Stay-safe) للديلزة الصفاقية المستمرة المتقطعة (CAPD) - أنظر الرسم التوضيحي

أولاً يجب تسخين المحلول ليليل درجة حرارة الجسم. يجب القيام بذلك بواسطة إستعمال صينية تسخين ملائمة. فترة التسخين لكيس ذو 2000 ملل بدرجة حرارة ابتدائية ذات 22 درجة مئوية هي 120 دقيقة تقريباً.


بالإمكان الحصول على معلومات مفصلة أكثر في تعليمات تشغيل مُسخن الأكياس.

لا يجوز إستعمال الميكرويف لتسخين المحلول لخطورة حدوث تسخين مفرط موضعي.

بعد تسخين المحلول، بالإمكان البدء في إستبدال الأكياس.


- إفحص كيس المحلول (للمصقة، تاريخ إنتهاء الصلاحية، صفاء المحلول وعدم وجود عطب في الكيس والغلاف).
- إنزع الغلاف الخارجي وعبوة غطاء التعقيم.
- اغسل يديك بواسطة صابون مضاد للجراثيم.

- 3) يجب وضع الديسك (DISC) داخل المنظم (يجب تعليق كيس المحلول من الثقب العلوي لعمود التسريب - يجب تسوية أنابيب كيس المحلول - ["solution bag-DISC"] - يجب وضع الديسك [DISC] داخل المنظم - بعد ذلك يجب وضع كيس التصريف على المثبت السفلي لعمود التسريب).
- 4) يجب وضع موصل القنطر داخل المنظم.
- 5) عقم يدك وإزّرع الغطاء الواقي للديسك (DISC).
- 6) أوصل موصل القنطر للديسك (DISC).
- 7) افتح ختم القنطر - حالة "●●" تبين أن مسيرة التصريف تعمل.
- 8) حالة غسل "●●●" تبين أن شطف مواد الديلزة الطازجة لكيس التصريف قيد التنفيذ (تقريباً 5 ثواني).
- 9) حالة التدفق "○○●●" تبين وجود وصل بين كيس المحلول والقنطر.
- 10) حالة إيقاف للأمان "●●●●●" - إغلاق آلي لموصل القنطر بواسطة الديوس (PIN).
- 11) فصل الوصل (يجب نزع موصل القنطر من فتحة الديسك) - عليك لولية موصل القنطر لغطاء تعقيم جديد.
- 12) أغلق الديسك. يجب إغلاق الديسك بواسطة الجانب المفتوح لغطاء الواقي لغطاء التعقيم المستعمل (الموجود في الثقب الأيمن للمنظم).
- 13) يجب فحص مواد الديلزة المُصرّفة والتخلص منها.



منظومة الـ سليپ - سيف (Sleep-safe) للديلزة الصفافية الآلية (APD) - انظر الرسم التوضيحي

- يجب قراءة تعليمات تشغيل منظومة الـ سليپ - سيف (sleep-safe) بإمعان.
- خلال الديلزة الصفافية الآلية، يتم تسخين المحلول أتماتيكيا في الماكنة.
- 1) تحضير المحلول
- إفحص كيس المحلول (المصنعة، تاريخ إنتهاء الصلاحية، صفاء المحلول وعدم وجود عطب في الكيس والغلاف).
 - ضع الكيس على سطح ثابت.
 - إنزع الغلاف الخارجي للكيس.
 - اغسل يديك بالصابون المضاد للجراثيم.
 - تأكد من أن المحلول رائق ومن عدم وجود تسريب من الكيس.
- 2) يجب تسوية أنابيب الكيس (١).
- 3) يجب نزع الغطاء الواقي.
- 4) أدخل الموصل إلى الفتحة الشاغرة لصينية الـ سليپ - سيف (sleep-safe).
- 5) الآن أصبح الكيس جاهزاً للإستعمال مع منظومة الـ سليپ - سيف (sleep-safe).



إذا إستعملت بالخطا مقداراً دوائياً أكبر

إذا سمحت لأكثر مما ينبغي من المحلول بأن يتدفق إلى جوف البطن، فبالإمكان تصريف الفائض. إذا إستعملت أكثر مما ينبغي من الأكياس، فيجب التوجه إلى الطبيب لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم توازن في الشوارد الكهربائية و/أو السوائل. إذا إستعملت مقدار دوائي مفرط، فإن العرض الأكثر شيوعاً هو التجفاف.

إذا بلغ طفل بالخطا من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبلة الدواء معك.

إذا نسيت إستعمال هذا الدواء في الوقت المطلوب، لتجنب خطورة التأثيرات المحتملة التي قد تشكل خطراً على الحياة، يجب التوجه للطبيب.

إن التوقف عن إستعمال الدواء، إستعمال مقدار دوائي منخفض أكثر مما ينبغي أو حدوث خلل خلال العلاج قد تؤدي إلى حالات تشكل خطراً على الحياة مثل فائض من السوائل في الجسم يتراقد بوزمة محيطية وقصور القلب و/أو أعراض أخرى لتبولن الدم (وجود كميات فائضة من نواتج البول في الدم). يجب التوجه للطبيب حالا.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

- لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال محلول CAPD قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية تتعلق بطريقة الديلزة:

يجب التوجه للطبيب بأسرع ما يمكن عند ظهور إحدى الأعراض الجانبية الشائعة جداً:

- التهاب الصفاق مع علامات لتعكر سائل الديلزة المُصرف، ألم في البطن، سخونة، الشعور بوعة أو في أحيان نادرة جدا تسمم الدم (إنتان الدم). يجب أن تَري الطبيب الكيس الحاوي على سائل الديلزة المُصرف.

- التهاب الجلد في منطقة خروج القنطر أو على طول القنطر والذي يمكن تشخيصه بوجود إحمرار، إنتفاخ، ألم، إفرازات أو أغشية.
 - فتق في جدار البطن.
- أعراض جانبية إضافية:**
- أعراض جانبية شائعة:**
- مشاكل في تدفق سائل الديلزة أو في تصريفه
 - الشعور بشد أو بإمتلاء في البطن
 - ألم في الكتف
- أعراض جانبية غير شائعة:**
- إسهال
 - إمساك

أعراض جانبية شيعها غير معروف:

- صعوبات في التنفس نتيجة إرتفاع الحجاب الحاجز

أعراض تتعلق بالمحلول:

أعراض جانبية شائعة جداً:

- إضطرابات في الشوارد الكهربائية مثل: نقص البوتاسيوم

أعراض جانبية شائعة:

- إرتفاع نسب السكر في الدم
- إرتفاع نسب الشحُميات في الدم (hyperlipidemia) أو تقاغم فرط شحُميات الدم
- زيادة في الوزن

أعراض جانبية غير شائعة:

- نقص الكالسيوم
- إنخفاض نسب سوائل الجسم أكثر مما ينبغي (تجفاف)، الذي يمكن تشخيصه بواسطة فقدان سريع للوزن. قد يحدث تجفاف خطير عند إستعمال محاليل ذات تركيز أكبر من الجلوكونز
- دوّار
- إنخفاض ضغط الدم
- نبض سريع
- إرتفاع نسب سوائل الجسم أكثر مما ينبغي (إحتباس السوائل)، التي يمكن تشخيصها بواسطة تزايد الوزن بشكل سريع
- ماء في الأنسجة وفي الرئتين (وذمة)
- ضغط دم مرتفع
- صعوبات في التنفس

أعراض جانبية شيعها غير معروف:

- فرط نشاط ثانوي للغدة الدرقية الذي قد يؤدي إلى إضطرابات في إستقلاب العظم

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمّت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffect>
Medic@moh.gov.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

- **تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر الكيس والعبلة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين المحلول دون 25 درجة مئوية. لا يجوز التبريد. لا يجوز التجميد.
- يجب إستعمال المحلول مباشرة بعد فتحه.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً على:

Water for injections, Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide

يحتوي المحلول على سكر (جلوكوز وفركتوز) - انظر معلومات حول محتوى السكر في الفقرة 2: "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبلة:

كيس يحتوي على محلول رائق وعديم اللون حتى مائل للأصفر قليلاً.

أحجام وأنواع العب:

سستي- سيف (Stay-safe):

6 أكياس ذات 1500 ملل،

4 أكياس ذات 2000 ملل،

4 أكياس ذات 2500 ملل،

4 أكياس ذات 3000 ملل.

سليپ - سيف (sleep-safe):

كيسين ذوات 5000 ملل.

** من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العب.

صاحب الإمتياز وعنوانه: نيفرو ميد.ض، شارع كارلبياخ 7، تل - أبيب

إسم المنتج وعنوانه: فريزينيوس ميديكال كير دويتشلاند م.ض،، باد هامبورج، ألمانيا

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

CAPD 17: 134 78 31163

CAPD 18: 134 79 31164

CAPD 19: 134 80 31165

من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.