



מאי 2018

רופא/ה רוקח/ת נכבד/ה,

העדכונים בעלון לצרכן דווחו למשרד הבריאות כנוטיפיקציה עבור התכשירים הבאים :

Tacrocel Capsules 0.5mg; 1mg; 5mg
טקרוסל 0.5מ"ג, 1מ"ג, 5מ"ג
חומר פעיל: Tacrolimus (as monohydrate) 0.5mg; 1mg;5mg

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

Prophylaxis of transplant rejection in liver kidney or heart allograft recipients. Treatment of allograft rejection resistant to treatment with other immunosuppressive medical products.

בהודעה זו מצוינים ומסומנים ברקע צהוב רק שינוי אשר מהווה החמרה או שינויים מהותיים.

בעלון בוצעו שינויים נוספים שאינם מהווים החמרה, על מנת להתאימו להנחיות הנהל העדכני של משרד הבריאות.

עלון לצרכן המעודכן זמין במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות <http://www.health.gov.il> וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת פריגו ישראל, בטלפון: 03-5773700.

בברכה,
פריגו ישראל סוכנויות בע"מ

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על-פי מרשם רופא בלבד

טקרוסל 5 מ"ג כמוסות	טקרוסל 1 מ"ג כמוסות	טקרוסל 0.5 מ"ג כמוסות
כל כמוסה מכילה: Tacrolimus 5 mg טקרולימוס 5 מ"ג	כל כמוסה מכילה: Tacrolimus 1 mg טקרולימוס 1 מ"ג	כל כמוסה מכילה: Tacrolimus 0.5 mg טקרולימוס 0.5 מ"ג

[**]

2. לפני השימוש בתרופה:

[**]

עליך להקפיד:

[**]

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה

[**]

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

[**]

עליך לדווח לרופא אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות כגון:

[**]

• תוספי אשלגן, **תכשירים המכילים אשלגן**.

[**]

התרופות הבאות, הנלקחות בשילוב עם טקרוסל, עלולות להחמיר בעיות בכליות או **במערכת העצבים**:

• תרופות צמחיות המכילות את צמח ההיפריקום (St. John's Wort) או **תמציות של צמח**

Schisandra sphenanthera (צמח בשימוש הרפואה הסינית המסורתית)

[**]

• התרופות הבאות עשויות להיות בעלות השפעה בלתי רצויה על הכליות: **אמינוגליקוזידים**,

קוטרימוקסאזול, אמפוטריצין B, **ונקומיצין**, **מעכבי ג'יראז (אנטיביוטיקה)** או תרופות נוגדות

דלקת לא סטרואידיות (NSAIDs)

[**]

תרופות הורמונליות המכילות Ethinylestradiol

[**]

שימוש בתרופה ומזון:

עליך יש ליטול טקרוסל את התרופה באופן כללי על קיבה ריקה או לפחות שעה אחת לפני ארוחה או

2-3 שעות לאחר ארוחה, בשתי מנות מחולקות, בדרך כלל בבוקר ובערב. אין ליטול את התרופה

עם מיץ אשכוליות או לאכול אשכולית עם נטילת התרופה. יש להימנע מאכילת אשכוליות או משתיית

מיץ אשכוליות בזמן השימוש בטקרוסל.