

קורטימנט MMX**טבליות לשחרור מושהה**

רכוב:

כל טבלייה לשחרור מושהה של קורטימנט MMX מכילה:
korotektonide 9 mg
חומרם בלתי פעילים: ראה סעיף 6 "מידע נסוף".

קרא בעין את העלון עד סופו בטרם תשמש בתוורופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התוורופה. אם יש לך שאלות נספנות, פנו אל הרופא או אל תרופתאותה. תרופת זה נשמה לטיפול במחלתך. לא תעביר אותה לאחרם. היא עלולה להזיק לך אפילו אם רואת לך כמחלה דומה. התוורפה מיועדת למטופלים בלבד מעת גיל 18.

1. ומה מיועדת התוורפה?

התוורפה מיועדת לטיפול בדלקת כביה פעילה קלה עד בינית של העין הגד.

קובוצה רפואיית: גלקוקורטיקואידים.

2. לפמי שימוש בתוורפה:**א אין להשתמש בתוורפה אם:**

- אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל או לאחד ממרכיביו התוורפה (ראה סעיף 6).
- אתה אלרגי לבוטנים או לסוסי, כיון שבטיולוגים מושם סוסיה.

ב אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתוורפה פונה לרופא אם אתה סובל מראייה מטופשת או הפרעת ראייה אחרת.

לפני הטיפול בתוורפה, ספר לרופא אם:

- נדבך בזיהום ויראלי, חידקי או פטריטי.
- הी לה רץ-עפם לחץ דם גבוה.
- אתה חולת בטוררת.
- סבלת א-עפם מעיצמות שרניות.
- הी לה רץ-עפם בעקבות בכתבר.
- היה לה רץ-עפם לחץ תור-גביה (algoakoma) או קטרקט.
- בן שפחחה שלך סבל א-עפם מוסכרת או לחץ תור-ענין גביה (algoakoma).
- הוי לה רץ-עפם בעקבות בכבד.
- לפני טיפול בקורטימנט MMX נטלת טיפול סטרואידי אחר, כיון שהר יוביל לגראום לאכבי שרירים ומפרקים, עיפות, כאב ראש, כאילות ובקראות.
- עליל עברו ייחוץ סולן קורטימנט MMX היה מטופל בתכשי סטרואידי חזק יותר, התוממים עלולים להופיע עשו.

אתה דבך באבעבועות רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מ.erbba לאנשים החווים באבעבועות רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעבועות רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.

נטילת סטרואידי במינונים גבוהים ותגובה אரוכה עלולה להופיע על כל חלק הגוף ובמקרים מסוימים יכול להופיע פיסוליגיות (ראה פרק טיפול תופעות לוואי). אם הרופך חשש שאחד מהחומרים עליל נגע לך, צור קשר עם הרופא שלך.

אם אתה לוקה, או אם לך דלקת לאחרונה, תרופות אחרות יכול לרופא או לרוקח, מאחר ותגובה זו יכולה להשפיע על פעליתונן של תרופות אחרות וכן תרופות אחרות יכולות לסייע לך.

במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקה:

- נגדי אנטריאמין (נטריאזידים להוריד את ערכו הכלסטוריול).
- קטוקינזיאול או אטיזקאנזיאול (תרופות נגד זיהומים פטריטיים).
- תרופות הכלכליות אסתראגן, מכון תרופות שנח טיפול הורמוני, תפי וולק מגלאוליות ליבורנות הרוין).
- גליקוזידים קרדי-אליטים ותרופות משלחות.
- תרופות לטיפול ב-HIV כגון: ריטונוביר, נליפובייר, קוביקיטס.
- קרבמאזין המשמש לטיפול במצב הנפילה (אפילפסיה).

שימוש בתוורפה ומדוזה: אין להשתמש מז' אנטיליטות כאשר אתה טול בטביליות קורטימנט MMX. זה יכול להופיע על פעליתות התוורפה.

הירון, הנקה ופוריות:

לפני השימוש בתוורפה, יש להוועץ ברופא אם הנק בHIRון או מינקה, וחשבת שתת בHIRון או מתכוונת להיכס לHIRון.

נגייה ושימוש במכונות:

לא כביר שקורטימנט MMX תשפיע על יכולת הנגייה או על היכולת להפעיל מכונות, יחד עם זאת יש לשם בלב ולהזירה, שכן התוורפה עלולה לגרום לשחרחות או לעיפות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התוורפה:

טביליות קורטימנט MMX מכילות לקטוז, אם הרופך הדיע לך שאתה רגיש ללקטוז, סוכר מסוכרים, למלול בגול-איס-בלילות ללקטוז, עליל לייזר קשור עם הרופא בטרם תחילת טיפול תרופה זו. קורטימנט MMX מכיל גם ליצין (שמן סוייה). אם הנק אלרגי לבוטנים ולסוליה, אל תשמש בתוורפה.

3. כיצד תשמש בתוורפה?

תמיד יש לשמש לתוורפה לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק אם המינון והטיפות קיבען על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא שבליה אחת, בוקור, עם או בלי אוכל.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש:

יש לבולו על תבלייה שלשלמתה עם כוס מים.

או עלי לטלוש, ליתחש או לשבר את הטבלייה.

בד"כ יש לחתוך את התוורפה לכ-יום ולמשר 8 שבועות, לאחר מכן הרופא יחליט באופן הבא אם יש ליטול את התוורפה.

המשך ליטול את התוורפה על פי הנחיות הרופא גם אם הנק מתחילה ליטול את התוורפה טוב יותר.

מידע נוסף בעת נטילת טביליות קורטימנט MMX: אם הנק עמד לעורו ניתוח בקרוב או שהריך נעמד לעור תקופת זמן קצרה יותר מ-3 חודשים נטה תרופה מתחילה ב-150 מיליגרם (טבלייה) בפעם הראשונה, ו-100 מיליגרם (טבלייה) בפעם השנייה, ו-75 מיליגרם (טבלייה) בפעם השלישייה, ועוד.

שימוש במלדים: התוורפה אינה מומלצת לשימוש בילדים.

אם נטלה בטעות מנת יתר או אם בטעות בעלILD מין התוורפה, פונה מיד לרופא או לחדר מין של בית-חולמים והבא ראיית התוורפה אחרת.

אם שחתה ליטול תרופה זו בזמן הקצוב, יש ליטול מנה מיד כשמצרכת. אם מתקרב הזמן מההבהה, יש לדלג עליה.

המנה שנשכחת. אם מתקרב הזמן מההבהה, יכול להיפול.

יש להתמודד בטיפול כפ' שחומץ דל' הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתוורפה ללא התיעוצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התוורפה: אם אתה שמתעורר לתוורפה לא תנטיל התוורפה אלא תנטיל הנטוורפה, יכל להיות שמתעורר לתוורפה את הטוורפה.

אם אין ליטול נטול התוורפה בחושר, הרוכב השופע ב-150 מיליגרם (טבלייה) בפעם הראשונה, אם מתקבב עליה.

עמם שופע במחלה כפ' שחומץ דל' הרופא.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתוורפה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי: כמו בכל תרופה, השימוש בקורטימנט MMX עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמתרשמים. אל תיבהל למקרא רישימת התופעות לוואי. יתכן ולא תסבב מאף אחת מהן.

אם יש לך תגובת אלרגית, יש לגשת מיד לרופא. הסימנים לכך כוללים פריחה מגדלת, נפיחות בפנים, בשפתים, בפה, בלשון ובגונן. תופעות אלה יכולות לגרום לך קשיי נשימה.

להלן תופעות לוואי נספנות שעוללות לגרום给你 בזמן הטיפול בקורטימנט MMX, רוב התופעות המציגות מטה צפויות גם בטיפולים סטרואידים אחרים:

תופעות לוואי סכיחות (עלולות להשפיע על 1 מתוך 10 אנשים):

• נפיחות בלבן

• כאבי שרירים, התכווצויות שרירים

• כאבי בטן

• יובש בפה

• הפרעות בעיכול

• פעימות לב מוגזמות

• פריחה עורית או גירוי

• דיזמוס וויסת חזק אך לא סדרי בכנים נספנות, נדודי שינה, תנודות

רמות נספנות של אשalon בדם העולות לגרום לך חולשות שרים או לעייפות, ממא תוחשת עזקץ

תסנינים דמי' חסמת קושינגן כגון: גורת פנים עגולה, אקראיון, עליה במושקל, וטיה לבלבול חבורות בקלות

בחלונות

• כאבי ראש

• שמיומי בהתקנוגות כגון עצבנות, נדודי שינה, תנודות

בחבץ הרות

• חרישות חסום מנוחה עם היפראקטיביות

• חרדה

• נפיחות ברגליים

• רעדות

• כאב גב

• התכווצות שרירים

• שפעות

תופעות לוואי לא סכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 אנשים):

• עליה בצדירות דם לבנות

• שניים בהתקנוגות כגון עצבנות, נדודי שינה, תנודות

בחבץ הרות

• חרישות חסום מנוחה עם היפראקטיביות

• תרבות

• גזם

• סחרות

• חרישות חסום מנוחה עם היפראקטיביות

• תרבות

• גלאוקומה (לחץ תוך עיני גבוה)

• ערפל העין (קטרקט)

• טשטוש ריאיה

• נזודות אדומות או כחולות וחוורות על העור

תופעות לוואי נדירות מודרך מאריך (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10,000 אנשים):

• נזודות גורלית חריפה המכונה אנגיילקסיס העולוה לגרום לך נשים והלים.

חלק מתבודת הלוואי המזוכרת מעלת אופניות לתרופות לטיפולים סטרואידים ונטיה לנטיה לאירועים.

בנטילת סטרואידים כמו בטביליות קורטימנט MMX יתכן שיופיע בעיות פיסיולוגיות. יש להזכיר עליון עמי (הוועץ) או מי מושב בלב זיהום ויראלי, חידקי או פטריטי.

בנטילת סטרואידים בזיהום ויראלי נסה להימנע מרבב באבעבועות רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מרבב באבעבועות רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעבועות רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.

תגובה כליה בברב באבעבועות רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מרבב באבעבועות רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעבועות רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.

בנטילת סטרואידים בזיהום ויראלי נסה להימנע מרבב באבעבועות רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מרבב באבעבועות רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעבועות רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.

בנטילת סטרואידים בזיהום ויראלי נסה להימנע מרבב באבעבועות רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעdeen רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.

בנטילת סטרואידים בזיהום ויראלי נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעdeen רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.

בנטילת סטרואידים בזיהום ויראלי נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעdeen רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.

בנטילת סטרואידים בזיהום ויראלי נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעdeen רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.

בנטילת סטרואידים בזיהום ויראלי נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעdeen רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.

בנטילת סטרואידים בזיהום ויראלי נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעdeen רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.

בנטילת סטרואידים בזיהום ויראלי נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעdeen רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.

בנטילת סטרואידים בזיהום ויראלי נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת, בזמן השימוש בטביליות קורטימנט MMX נסה להימנע מרבב באבעdeen רוח או בחצבת. יש לידע את הרופא אם אתה שוחב שדבוקת באבעdeen רוח או בחצבת בזמן שאהה נטל תרופה זו.

אתה או בן שפחחה שלך סבל א-עפם מביעות של בריאות הנשימה.