

אדקס[®] 200 / אדקס[®] פורטה 400, קפילות

כל קפיליה של **אדקס 200** מכילה איבופרופן (Ibuprofen) במינון 200 מ"ג.

כל קפיליה של **אדקס פורטה 400** מכילה איבופרופן (Ibuprofen) במינון 400 מ"ג.

חומרים בלתי פעילים: ראה סופו בסרט השנתה בתרופה. **קרא בעיון את העלון** עד סופו **בטרם תשתמש בתרופה**. עלון זה מכליל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות בנושא, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת למבוגרים, ילדים ומתבגרים מעל גיל 12. על פי לטיוט לא את התרופה על פי ההוראות בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה" בעלון זה.

היועץ בקרוקא אם אתה זקוק למידע נוסף. על פי לטיוט לא את הרופא באם סימני המחלה (מבטומים) מתממרים, או אם אינם משתפרים לאחר 10 ימים במבוגרים 3-1 ימים בילדים ומתבגרים בגילאי 12-18 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

אדקס 200 / אדקס פורטה 400 הם תכשירים המיעדים לטיפול בכאבי ראש, כאשי הקשורים במגורגה; לשיכון כאבי קליים עד בינוניים כגון: כאבי ראש, כאבי שיניים, כאבי מחזור, כאבי גב, כאבי שרירים ונוגדי דלקת במחלות ראוטמטיות (פריארינות). **200 מ"ג** מיועד גם להורדת חום. **קבוצה תרופוטית:** איבופרופן שייך לקבוצת תרופות הנקראת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה גרש (אלרגי) לחומר הפעיל (איבופרופן), או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מצילה התרופה (ראה סעיף 6).
הייתה לך בעבר תגובה אלרגית (כגון אסתמה, נפוחות בפנים, תולת או חרלת [פריחה]) בבילטת אספירין או משך כנסים דומה במקבועת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
אתה סובל או סבלת בעבר (2 מרקים או יותר) מכב או ידומם במערכת העיכול.

כבול בעבר מדימום או הנקבועת במערכת העיכול בעקבות שימוש בתרופה ממחשפת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
אתה סובל מאם ספיקת בד כדומה, או ספיקת כליות חמורה או אי ספיקת לב חמורה.
אתה בשלשות חודשי היריון האחרונים.

אזהרות מיוחדות הנגועות לשימוש בתרופה:

- לפני השימוש באדקס 200 / אדקס פורטה 400, ספר לרופא אם:
 - אתה סובל או סבלת בעבר מאסתמה.
 - אתה סובל מבעיות בלבל, בכבד או במעינים.
 - אתה סובל מבעיות בלב (כגון אי ספיקת לב, תועקת חזה), סבלת בעבר מהתקף לב, בעברית ניתוח חזה (חוקים), סבלת ממחלת עורקים הקפית (ידידה ידומה) עם הרגליים או לפנות הרגליים עקב הצירוח או סימני דם עורקים), או אם סבלת מכל סוג שהוא של שבץ מוחי (כולל "מני-שבץ") או התקף איסכמי חוליף - "TIA").
 - אתה סובל או סבלת בעבר מלחץ דם גבוה, אתה סובל מסוכרת, כולסטרול גבוה, או אם יש לך היסטוריה משפחתית של מחלות לב או שבץ מוחי.
 - יש לך היסטוריה של מחלה במערכת העיכול (כגון קולטיס מכיבית או מחלת קרוהן).
 - אתה סובל ממחלות הפועות ברקמת חיבור או מזאבת אדמתית מפרקתית (מחלה אוטואימונית הגורמת לכאבי מפרקים, שינויים בעור והפרעות באיברים נוספים).
 - אתה עומד לעבור ניתוח (כולל ניתוח שיניים) מאחר שהתרופה עלולה להגביר את הסיכוי לדימום.
- אתה מנשן.
- אתה שותה אלכוהול.
- אתה שותה חודשי היריון הראשונים.

• **אזהרות נוספות:**
• איבופרופן שייך לקבוצת תרופות אשר עלולות לגרום לפגיעה בפרייות בנשים. הפגיעה הפיכה עם הפסקת

הטיפול בתרופה. בשימוש מדי פעם, בלתי סביר שייפגעו הסיכונים הליכנס להריון; אך אם את מתקשה להיכנס להריון, עליך להיועץ ברופא לפני נטיילת תרופה זו.

■ **נוגדי דלקות** משככי כאבים כמו איבופרופן עלולים להיות קשורים בעלייה קטנה בסיכון להתקף לב (אוסם שריר הלב) או שבץ מוחי, בעיקר בנוטיל מינונים גבוהים. אל לעבור על המנה או משי הטיפול המומלצים.

■ **קליים** סיכון לנזק כליתי בילדים ומתבגרים במצבי התינושות.

קשישים קשישים הם בעלי נטייה גבוהה יותר לפתח תופעות לוואי בעקבות נטיילת תכשירים מקבועת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, כגון איבופרופן, ועיקר דימום או הנקבועת בקיבה, העלולים להיות קטלניים.

תגובות בין תרופותיות:
אתה לוקח או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

תרופות אחרות המכילות נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (כגון אספירין, איבופרופן). אין לטיוט לתרופות אלה יחד עם **אדקס 200 / אדקס פורטה 400** על מנת להפחית סיכון לתופעות לוואי. ניתן לטיוט אספירין במינון נמוך (עד 75 מ"ג ליום) בהמלצת רופא בלבד.
סטרואידים (לטיול) במצבים דלקתיים). שימוש בו זמנית עלול להגביר את הסיכון לכב או דימום במערכת העיכול.

• אנטיביוטיקו קוולנונים.

תרופות נגד קרישת דם (מדללי דם) מעכבי קרישה כגון אספירין/חומצה אצטילסליצילית, וארפיין, טיפידין).

תרופות להמרת הלב (כגון גלוקידים של הלב - דיגוקסין).

תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה (למשל מעכבי אנזים המפרק אנגיוטנסי ACE כמו קפטופרייל, חוסמי בטט כמו אטנולול או אנגיוטנטיים לרצפטור אנגיוטנסי II כמו לוסרטן). איבופרופן עלול להפחית השפעת התרופות אלה.

• משתנים (איבופרופן עלול להפחית את השפעת המשתנים), תרופות לדיכוי זמני של מערכת החיסון (כגון מתוטרקוט, ציקלופופריין, סקורלומוס).

תרופות לטיפול במבארי או דיאנון [כגון ליתיום - ישנן עדויות לכך ששימוש בו זמני מעלה את רמת הליתיום בדם, או כגון מעכבים מלקטיביים של ספיגה מחדש של סרוטונין (SSRIs) שימוש בו זמני עלול להגביר את הסיכון לדימום במערכת העיכול].

תרופות להפסקת היריון (כגון מפיפריסטון).

תרופות לטיפול באיידס (כגון זידודיין).

שימוש בתרופה ומזון

יש לבלוע את התרופה עם כוס מים. ניתן לטיוט עם או ללא מזון.

היריון, הנקה ופריות:

ספרי רופא אם נכנסת להריון במהלך הטיפול באדקס 200 / אדקס פורטה 400.
אין לטיוט אדקס 200 / אדקס פורטה 400 במהלך שלושת חודשי היריון האחרונים.

היועץ ברופא לפני השימוש בתרופה אם את 6-ב חודשי היריון הראשונים.
את את מנקה, היועץ ברופא או רוקח בטרם נטיילת התרופה.
ראי סעיף 2- "אזהרות נוספות" לגבי השפעת התרופה על הפריות.

נהיגה ושימוש במכונית:

בשימוש במינון המומלץ ולמשך השימוש המומלץ, לא צפויות תופעות לוואי שעלולות להשפיע על פועולת אלו.

3. כיצד שתשתמש בתרופה?

אדקס 200 / אדקס פורטה 400 מיועדים לשימוש לטווח קצר בלבד. יש לטיוט לא המנה הנמוכה ביותר, למשך הזמן הקצר ביותר, הנדרשת לצורך הקלת הסימנים. עליך

לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון המקובל בדרך כלל הוא: **מבוגרים וילדים מעל גיל 12:** 3 פעמים ביום. יש להמתין לפחות 2-1 קפילות. **אדקס 200:** 1-2 קפילות. יש להמתין לפחות 4 שעות בין מנה למנה. אין לטיוט יותר מ-6 קפילות ב-24 שעות.

אדקס פורטה 400: קפיליה אחת עד 3 פעמים ביום. יש להמתין לפחות 4 שעות בין מנה למנה. אין לטיוט יותר מ-3 קפילות ב-24 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת. אין להשתמש בתרופה בילדים מתחת לגיל 12.

משי הטיפול

יש להיועץ ברופא אם נדרש טיפול יש יותר מ-3 ימים בילדים ומתבגרים בגילאי 12-18 או אם יש ההמורה בתסמינים.

במבוגרים, אין לטיוט לא התרופה למשך יותר מ-10 ימים. בצפויים ללא הוראה מרופא.

פנה לרופא או לרוקח אם התסמינים ממשיכים, אם הכאבים או החום מתממרים, או בהופעת תסמינים חדשים.

צורת הנטיילה: ניתן לחצות את התרופה. אסור לכתוש או ללעוס את התרופה על מנת להימנע מטעמה הרמה. לבלוע את התרופה עם כוס מים. ניתן לטיוט עם או ללא מזון.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, עלולים להופיע תסמינים כגון נמנום או כאבי, הקאה, כאב בטן, שלשול, צלצולים באוזניים, כאב ראש, דימום במערכת העיכול.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או להדור מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

במקרים של הרעלה חמורה ייתכנה תופעות כגון: חוסר ההמאיות, עוררות או תרדמת ולעיתים פרנסים. החמרת אסתמה ייתכן בחולי אסתמה.

אם שחת לטיוט לא התרופה

אם שחת לטיוט לתרופה זו בזמן המיועד, יש להמשיך לטיוט לא התרופה על פי ההחמיות המפורטות מעלה. אין לטיוט מנות הדלקות מהמינון המקובל.

אין לטיוט לתרופות בחושך! בדוק התוית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באדקס 200 / אדקס פורטה 400 עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים, אל תיבה למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

ניתן להגות את הסיכון לתופעות לוואי על ידי נטיילת של המינון הנמוך ביותר למשך הזמן הקצר ביותר ההכרחיים לטיפול.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לקבלת עזרה רפואית (חדר מיון של בית חולים או רופא) אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות:

- תסמינים של דימום במערכת העיכול, כגון: הופעת צואה דמית או שחורה כופת, הקאה דמית או עם חלקיקים כהים הנראים כמשקף קפה.
- תסמינים של תגובה אלרגית חמורה, כגון: קשישי נשימה או צפוצים לא מוסברים, חרחרורות או דופק מהיר.
- תגובות שריות חמורות כגון גרד, פריחה, קילוף עור או הופעת פולמוסיות (כגון תסמונת סטיבנס-ג'ונסון).
- נפוחות בפנים, בלושן או בגרון.

• סימנים לבעיות במערכת הדם, דימום או מחורות בלתי שגרתיים או בלתי מוסברים, חום, כאב גרון, כיבים בפה, תסמינים דמויי שפעת ותשישות חמורה.

• סימנים לבעיות בכבד: למשל כאבי בטן, צהבת (הצהבה של העור ולובן העיניים) או מתן שתן בצבע חום כהה.

יש לפנות לרופא אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות: חום, כאב ראש, צוארן נוקשה, הקאות

• קשישי עיכול, כאב בטן, עזירות, שלשול, נפוחות, בחילה, כאבים בחזה, דופק מהיר או לא סדיר.

• בעיות בכבד או בללויות, המלוות בפפוחות של הידיים או הרגליים.

תרופת כמו אדקס פורטה 400 / אדקס פורטה 200 עלולות להיות קשורות בעלייה קטנה בסיכון להתקף לב (אוסם שריר הלב) או שבץ מוחי. ראוי להיות זהיר "אזהרות נוספות".

אם אתה מופיעה תופעת לוואי, אתה מופיעת תופעות הלוואי המחמירות, או כאשר אתה סובל ממופעת לוואי שלא צוינה מעליועץ הרופא, פנה מיד לרופא.

ניתן לדון על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות מערכת העיועץ "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שמנצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il).

המפנה לטופס המוקון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי ניכסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@mo.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור ומוצו לנגיש לידם עד טווח ארימות של ילדים (ואו הנוטקות מעל גיל תנעמק הערה). אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date). המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• **תנאי אחסון:** אחסן במקום יבש, אין לאחסן בטמפרטורה מעל 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

אדקס 200:
Microcrystalline cellulose, Maize starch, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Hypromellose, Carmellose sodium, Silica colloidal anhydrous, Talc, Stearic acid, Titanium dioxide E-171, Erythrosine aluminium lake E-127, Macrogol, Camauba wax, Quinoline yellow aluminium lake E-104, Brilliant blue FCF aluminium lake E-133.

אדקס פורטה 400:

Microcrystalline cellulose, Maize starch, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Carmellose sodium, Silica colloidal anhydrous, Hypromellose, Stearic acid, E-171, Talc, Macrogol, Camauba wax.

כיצד רואים התרופה מזה תוכן האריזה:

אדקס פורטה 400: קפילות בצבע ורוד עם קו חלוקה בצד אחד.

אדקס פורטה 200: קפילות בצבע לבן עם קו חלוקה בשיני הצדדים.

גדלי אריזה מאושרים:

אדקס 200: 10, 16, 20, 30, 40, 50, 100, 1000 קפילות.

אדקס פורטה 400: 10, 10, 30, 40, 50, 100, 1000 קפילות.

ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: מאי 2018

• **רשימה רישום התרופה בנקסד הממלכתי במשרד הבריאות:**

אדקס 200: 03971-26007-00

אדקס פורטה 400: 110-28-29270-00

לשם הפשטות והקלות הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר, על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

יצרן ובעל רישום: דקסל[®] בע"מ

רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל