

نُسْقَةِ الدِّيَاعِ بِدِهَنٍ وَصَفَةِ طَبَّ

أيكس /٢٠٠ / أيكس فورته ٤٠٠، حبوبات
تحتوي كل حبولة من أيكس ٢٠٠ على أيبوبروفين (Ibuprofen)
٤ مل. بعيار.
تحتوي كل حبولة من أيكس فورته ٤٠٠ على أيبوبروفين
(Ibuprofen) بعيار ٤٠٠ مل.

مواد غير فعالة: انظر ليند ٦ معلومات اضافية.
اقرأ المنشورة بيعان حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه المنشورة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
هذا الدواء متخصص للأطفال والمرأهين فوق عمر ١٢ سنة. هنا عليك تناول الدواء وفقاً للتوصيات في ليند ٣. حفظة تتناول الدواء في هذه النشرة.
استشر الصيدلي إذا كنت تحتاج لمعلومات اضافية.
عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت علامات [عراض] المرض، أو إذا لم تتحسن أياً من أيام لدى الكبير و- ٤ أيام لدى الأطفال، والمرأهين بين الأعمار ٦-١٢ سنة.

١. لأى غرض مخصص الدواء

- اوكس ٤٠٠ / اكين / فوريه ٤٠٠ - مخصّص لعلاج الصداع المتعلق بالشقيقة، تشكّل الآلام الخفيفة التي المتوسطة مثل: صداع أيام إنسان، الام الدورى التهسيّر، الام الظهر، الام العضلات ومضادات الالتهاب في حالة الامراض الروماتيزمية. اوكس ٢٠٠ مخصّص أيضًا لخفض حرارة الجسم.
- مضادات الالتهاب الاصطناعي وبنية مجموعة الأدوية المسماة (NSAIDs). تنتهي بـ يبريرون

٢. قبل استعمال الدواء

- لا يجوز استعمال الدواء أبداً:
- كانت مسحات (البريجي) المادة الفعلية (بيوروفين)، أو لاي واحد من المركبات الأصلية التي يحتويها الدواء (بريجرليند).
- كان لديك في الماضي رد فعل تحسسي (مثل: انتفاخ في الوجه، سيلان الأنف أو شرى [طقم]) عند تناول سبرين أو مسكن الآلام مشابه من مجموعة محدثات الالتهاب الاسترئوبينية.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من حاليتين أو أكثر من فرحة أو نزيف في جهاز القضم.
- عانيت في الماضي من نزيف أو تقطّع في الجهاز الهضمي عقب استعمال دواء من قصبة محدثات الالتهاب الاسترئوبينية.
- كنت تعاني من صور كثيف وخمى، صور كوكى وخمى وصور وخمى في القلب.
- كنت في الثلاثة شهور الأخيرة من الحمل.