

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

إيبوفن ٤٠٠ ، حبسولات

تحتوي كل حبة إيبوفن على إيبوبروفين (Ibuprofen) بعبارة ٤٠٠ ملغ.

مواد غير فعالة: أنظر البند ٦ "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهائية قبل استعمال الدواء. يحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء مخصص للكبار، الأطفال والمراهقين فوق عمر ١٢ سنة.

عليك تناول الدواء وفقاً للتعليمات في البند ٣ "كيفية تناول الدواء" في هذه النشرة.

استشر الصيدلي إذا كنت تحتاج لمعلومات إضافية. عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت علامات (أعراض) المرض أو إذا لم تتحسن بعد ١٠ أيام لدى البالغين و ٣-١٠ أيام لدى الأطفال والمراهقين بين الأعمار ١٨-١٢ سنة.

١. لأي غرض مخصص الدواء

إيبوفن ٤٠٠ هو مستحضر مخصص لعلاج الصداع المتعلق بالتهاب؛ لتسكين الآلام الخفيفة حتى المتوسطة مثل: صداع، آلام أسنان، الآلام الدورة الشهرية، آلام الظهر، آلام العضلات ومضادات للالتهاب في حالة الأمراض الروماتيزمية.

الفصيلة العلاجية: ينتمي إيبوبروفين لمجموعة الأدوية المسماة مضادات الالتهاب الستيرويدية (NSAIDs).

٢. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الرجي) للمادة الفعالة (إيبوبروفين) أو لكل واحد من المركبات الإضافية في يحتويها الدواء. (انظر البند ٦).
- كان لديك في الماضي رد فعل تحسسي (مثل: ربو، انتفاخ في الوجه، سيلان الأنف أو شرى [طفح] في الجلد أو تورم أسبيرين أو مسكن آلام مشابه من مجموعة مضادات الالتهاب الستيرويدية).
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي (حالتين أو أكثر) من فرقة أو نزيف في جهاز الهضم.
- عانيت في الماضي من نزيف أو تقيح في الجهاز الهضمي عند استعمال دواء من فصيلة مضادات الالتهاب الستيرويدية.
- كنت تعاني من قصور كلبي وخيم، قصور كلوي أو قصور في الكبد.
- كنت في الثالثة شهور الأخيرة من الحمل.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- **قبل العلاج بإيبوفن ٤٠٠ أخير الطبيب إذا:**
 - كنت تعاني من مشاكل في الماضي من الربو.
 - كنت تعاني أو عانيت في الكلى أو في الأمعاء.
 - كنت تعاني من مشاكل في القلب (مثل قصور في القلب، نبضة صديرة).
 - عانيت في الماضي من نوبة قلبية، خضعت لمجازة الشريان التاجي الجراحية، عانيت من مرض الشريان المحيطي (انخفاض جريان الدم في الأرجل أو القدمين عقب تضيق أو انسداد الشرايين)، أو إذا عانيت من أي نوع كان من سكتة دماغية (يشمل "السكتة الدماغية البسيطة" أو نوبة نقص التروية العابرة - TIA).
 - كنت تعاني أو عانيت في الماضي من ارتفاع ضغط الدم، كنت تعاني من السكري، كولسترول مرتفع، أو إذا كان لديك ماضى عائلي من أمراض القلب أو سكتة دماغية.
 - كان لديك ماضى لمرض في الجهاز الهضمي (مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون).
 - كنت تعاني من أمراض التي تصير التسبب الضام أو من دئبة الغضابية مجموعية (مرض ضام ذاتي الذي يؤدي للإلام في المفاصل، تغيرات في الجلد واضطرابات في أعضاء أخرى).
 - كنت قبيل الخضوع لعملية جراحية (يشمل جراحة الأسنان) وذلك لأن الدواء قد يزيد من احتمالية حدوث نزيف.
 - كنت مسنخ.
 - كنت في السنة شهور الأولى للحمل.

تحذيرات إضافية:

- ينتمي إيبوبروفين لمجموعة أدوية والتي قد تؤدي لتضرر الخصوية لدى النساء. الضرر منكم عن توقف العلاج بإياداء. عند الاستعمال من حين لآخر، ليس منطوقاً أن تضرر احتمالات حدوث الحمل؛ كما إذا كنت تودين صعوبة في حصول الحمل، عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.
- مضادات الالتهاب الالام الالام ومسكنات الآلام مثل إيبوبروفين قد تكون متعلقة بارتفاع طفيف بخطورة حدوث نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو سكتة دماغية، خصوصاً عند تناول مقادير دوامية مرتفعة. لا يجوز تجاوز الجرعة أو فترة العلاج الموصى بها.
- هناك خطورة لحدوث ضرر كلوي لدى الأطفال والمراهقين في حالات الجفاف.

المسئون

المسئون هم ذوو ميول أكبر لتجاوز أعراض جانبية عقب تناول مستحضرات من مجموعة مضادات الالتهاب الالام والستيرويدية، مثل إيبوبروفين، وبالأخص زريف أو تقيح في المعدة، والذنان قد يكونا ممتيان.

تفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى والتي تحتوي على مضادات التهاب لالام لالام لالام (مثل أسبيرين، إيبوبروفين). لا يجوز تناول هذه الأدوية سوية مع إيبوفن ٤٠٠ من أجل تقليل خطورة حدوث أعراض جانبية. يمكن تناول أسبيرين بمقدار دوائي منخفض (حتى ٧٥ ملغ في اليوم) بتوصية من الطبيب فقط.
- ستيرونيدات (علاج حالات التهابية). قد يزيد الاستعمال المتزامن من خطورة حدوث فرقة أو نزيف في الجهاز الهضمي.
- المضادات الحيوية المسماة كونيولونات.
- أدوية مضادة لتخثر الدم (مبيطات التخثر مثل أسبيرين/حمض الأسيتيل ساليسيليك، وارفارين، تيكلوتيد، دابلاجين).
- أدوية تخفيف القلب (مثل جليكوزيدات القلب - ديجوكسين).
- أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثل مبيطات الأيونيم المحلول لالام لالام ACE مثل كابتوبريل، حاصرات بيتا مثل إيتانولول أو مضادات للمستقبل أنجيوتنسين II مثل لوسارتان).
- قد يقلل إيبوبروفين من تأثير هذه الأدوية.
- مدرات بولية (قد يقلل إيبوبروفين من تأثيرات المدرات البولية).
- أدوية للتخفيف المؤقت لجهاز المناعة (مثل ميتوتريكسات، سيكلوسبورين، تاكروليموس).
- أدوية لعلاج الهوس أو الاكتئاب (مثل الليثيوم - هناك دليل بان الاستعمال المتزامن يرفع من نسب الليثيوم في الدم، و المبيطات الانتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs) - الاستعمال المتزامن قد يزيد من خطورة حدوث نزيف في الجهاز الهضمي).
- أدوية لإيقاف الحمل (مثل ميفيبريستون).
- أدوية لعلاج الإلحاح (مثل زيدوفودين).

استعمال الدواء والظعام

يجب بعب الدواء مع كأس من الماء. يمكن تناول مع أو بدون طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوية:

أخبر الطبيب إذا أصبحت حاملاً خلال العلاج بإيبوفن ٤٠٠. لا يجوز تناول إيبوفن ٤٠٠ خلال الثلاثة شهور الأخيرة للحمل.

استشري الطبيب قبل استعمال الدواء إذا كنت في السنة شهور الأولى للحمل.

إذا كنت مرضعة، استشري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

أنظر البند ٢- "تحذيرات إضافية" بشأن تأثير الدواء على الخصوية.

السيفاق واستعمال المانثاق:

عند استعمال المقدار الدوائي الموصى به ولفترة الاستعمال الموصى بها، ليس هنالك احتمال لحدوث أعراض جانبية والتي قد تؤثر على هذه الفعاليات.

٣. كيفية استعمال الدواء

إيبوفن ٤٠٠ مخصص للاستعمال قصير الأمد فقط. يجب

تأكل الجرعة الأقل، لأقصر فترة زمنية، والمطلوبة من أجل تخفيف الأعراض. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بشأن المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.

المقدار الدوائي الاعتيادي عادة هو:

كبار وأطفال فوق سن ١٢ سنة: حبة واحدة، أو حتى ٣ مرات في اليوم، يجب الانتظار ٤ ساعات على الأقل بين الجرعات، وبالجرعة الأخرى. لا يجوز تناول أكثر من ٣ حبيبات خلال ٢٤ ساعة.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

المقدار الدوائي لدى الأطفال: لا يجوز استعمال الدواء لدى الأطفال دون عمر ١٢.

قيد العلاج

يجب استشارة الطبيب عند الحاجة لعلاج لأكثر من ٣ أيام لدى الأطفال والمراهقين بين الأعمار ١٨-١٢ أو إذا تفاقمت الأعراض.

لدى الكبار، لا يجوز تناول الدواء لفترة تزيد عن ١٠ أيام متوالية بدون تعليمات من الطبيب. إذا تفاقمت نتوء للتهاب أو الصداع، استشر الطبيب أو الصيدلي إذا تفاقمت الأعراض، إذا تفاقمت الآلام أو السخونة، أو عند ظهور أعراض جديدة.

طريقة تناول:

يمكن شطر الدواء. لا يجوز سحق أو مضغ الدواء وذلك من أجل تجنب طعمه المر. يجب بلع الدواء مع كأس من الماء. يمكن تناول مع أو بدون طعام.

إذا تناولت بالخطأ مقدارًا دوائيًا أكبر

إذا تناولت بالخطأ مقدارًا دوائيًا أكبر، قد تظهر أعراض مثل غثاس أو غثيان، تقيح، ألم بطن، إسهال، رنين في الأذنين، صداع، زريف في الجهاز الهضمي.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا تناول طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لفرقة الطوارئ في المستشفى واحضر عبلة الدواء معك.

في حالات التسمم اللوخيم يحتمل حدوث أعراض مثل: توهان، قيظة أو سبات وأحياناً تشنجات. تفاقم الربو جازز لدى مرضى الربو.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المعتاد، يجب مواصلة تناول الدواء وفقاً للتعليمات المفصلة أعلاه. لا يجوز تناول جرعات أكبر من المقدار الدوائي الممنوع.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. أعراض جانبية

كما بكل دواء، إن استعمال إيبوفن ٤٠٠ قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني آياً منها.

يمكن تقليل خطورة الأعراض الجانبية بواسطة تناول المقدار الدوائي الأقل للفترة الزمنية الأصغر والضروريات للعلاج.

يجب التوقف عن استعمال والتوجه فوراً لتلقي مساعدة طبية (فرقة الطوارئ في المستشفى) إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:

- أعراض لالام في الجهاز الهضمي، مثل: ظهور براز دموي أو أسود الكفطران، تقيح دموي أو جزئيات عاغمة تظهر كتترسب قهوه.
- أعراض لالام في التنفس أو صغير غير مستمر.
- دوار أو نبض سريع.
- ردود فعل جلدية وخيمة مثل حكة، طفح، تقشر الجلد أو ظهور حويصلات (مثل متلازمة ستيفنسون-جونسون).
- انتفاخ في الوجه، في اللسان أو في الحنجرة.
- مؤشرات لمشاكل في جهاز الدورة الدموية: زريف أو كدمات غير اعتيادية أو غير مفسرة، سخونة، الحنجرة، تقرحات في الفم، أعراض شبيهة بالأنفلونزا وإرهاق وخيم.

- مؤشرات لمشاكل في الكبد: مثلاً ألم البطن، يرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين) أو تبول بولون بني غامق.

يجب التوجه للطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية:

- سخونة، صداع، رقيقة متصلة، تقيحات.
- صعوبات في الهضم، ألم البطن، إسهال، انتفاخ، غثيان.
- ألم في الصدر، نبض سريع أو غير منتظم.
- مشاكل في الكبد أو في الكلى، والمصحوبة بانتفاخ في اليدين أو الرجلين.

أدوية مثل إيبوفن ٤٠٠ قد تكون متعلقة بارتفاع طفيف في خطورة حدوث نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو سكتة دماغية. أنظر البند ٢ "تحذيرات إضافية".

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من أعراض جانبية، بما في ذلك، في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التطلع عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط: www.health.gov.il الذي يتيح للابستشارة المباشرة للمعلومات عن أعراض جانبية. أو عن طريق الخول للرابط: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

٥. كيفية تخزين الدواء

- تحبب التسمم يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال وأو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيح بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date). الظاهر على ظهر العبلة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية لليوم الأخير من نفس الشهر.
- ظروف التخزين: احفظ في مكان جاف. لا يجوز الحفظ بدرجة حرارة فوق ٢٥ درجة مئوية.

٦. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة على: Microcrystalline cellulose, Maize starch, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Camellose sodium, Silica colloidal anhydrous, Hypromellose, Stearic acid, Titanium dioxide E-171, Talc, Macrogol, Carmauba wax.

كيف يبدو الدواء وما هو محتو العبلة:

حبسولات بلون أبيض مع خط شطر بكل الجيتين.

أحجام الحبات المصادق عليها:

٢٠، ١٠، ٥، ٥٠، ١٠٠، ١٠٠٠ حبسولة. من الجائز ألا تسوق جميع أحجام الحبات.

تم فحص هذه النشرة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة بتاريخ: أيار ٢٠١٨

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٢٦٠٠٨٠٠٠-٣٩٢٧٠

صاحب التسجيل والمنتج: دكسل م.ض، شارع دكسل ١، أور عكيفا ٣٠٦٠٠٠٠، إسرائيل

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض، شارع دكسل ١، أور عكيفا ٣٠٦٠٠٠٠، إسرائيل

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض، شارع دكسل ١، أور عكيفا ٣٠٦٠٠٠٠، إسرائيل

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض، شارع دكسل ١، أور عكيفا ٣٠٦٠٠٠٠، إسرائيل

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض، شارع دكسل ١، أور عكيفا ٣٠٦٠٠٠٠، إسرائيل

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض، شارع دكسل ١، أور عكيفا ٣٠٦٠٠٠٠، إسرائيل

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض، شارع دكسل ١، أور عكيفا ٣٠٦٠٠٠٠، إسرائيل