


איבופרו ליקווין-ג'לס 200,



כל כמסה מכילה איבופרופן (Ibuprofen) במינון 200 מ"ג.

חומרים בלתי פעילים: ראה בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרקמים של התרופה", וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע מצטמצם על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת למבוגרים, ילדים ומתבגרים מעל גיל 12. על ידי ליטול את התרופה על פי ההוראות בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה" בעלון זה.

הישמש ברוקח אם אתה צדק למידע נוסף. על ידי לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) ממשיכים. אם אין סימנים משתפרים לאחר 10 ימים במבוגרים ו-3 ימים בילדים ומתבגרים בגילאי 12-18 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

איבופרו ליקווין-ג'לס 200 הוא תכשיר המיועד לטיפול בכאבי ראש הקשורים במיגרנה; לשיכוך כאבים קלים עד בינוניים כגון: כאבי ראש, כאבי שיניים, כאבי מחזור, כאבי גב, כאבי שרירים ונוגד דלקות במחלות ראוטמיות (שיגוריות). מיועד גם להורדת חום.

קבוצה פרופרטיבית: איבופרופן שייך לקבוצת תרופות הלקבוצת נוגדי דלקות שאינם סטרואידים (NSAIDs).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה ירש (אלרגי) לחומר הפעיל (איבופרופן), או לכל אחד מתרכיביו הנוספים כמו מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- היית לך בעבר תגובה אלרגית (כגון אסתמה, נפחות בפנים, זלזת או חרלת [פריחה]) בשלילת אספירין או משך כאבים וזמרה מקבוצת נוגדי דלקות שאינם סטרואידים.
- אתה סובל או סבלת בעבר (2 מקרים או יותר) מכיב או דיומם במערכת העיכול.
- סבלת בעבר מדיומם או התקבכות במערכת העיכול בעקבות שימוש בתרופה משפחת נוגדי דלקות שאינם סטרואידים.
- אתה סובל מאי ספיקת כבד חמורה, אי ספיקת כליות חמורה או אי ספיקת לב חמורה.
- את בשללות חודש היריון האחרונים.

3. אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אל תלוי הטיפול באיבופרו ליקווין-ג'לס 200, ספר לרופא אם:**
 - אתה סובל או סבלת בעבר מאסתמה.
 - אתה סובל מבטות בלתי, בכבד או במעינים.
 - אתה סובל מבעיות בלב (כגון אי ספיקת לב, תעוקת חזה), סבלת בעבר מהתקף לב, עברת ניתוח מעקפים, סבלת ממחלת עורקים היקפית (ירידה בזרימת דם לרגליים) או לפצות הולגיים עקב היצרות או סימה של עורקים, או אם סבלת מלם סוג שהוא של שבץ מוחי (כולל "מיי-שבץ" או התקף איסכמי חולי - "TIA").
 - אתה סובל או סבלת בעבר מלחץ דם גבוה, אתה סובל ממסורת, לכולטרוני גבוה, או אם יש לך היסטוריה משפחתית של מחלות לב או שבץ מוחי.
 - יש לך היסטוריה של מחלת סוג שהוא של שבץ מוחי קולטיסי כביב או מחלת קרוחן).
 - אתה סובל ממחלות הפוגעות ברקמת חיבור או מזאבת אדמנית מערכתית (מחלה אוטואימונית הגורמת לכאבי פרקים, שריונים בעור והפרעות באיברים נוספים).
 - אתה עומד לעבור ניתוח (כולל ניתוח שיניים) מאחר שהתרופה עלולה להגביר את הסיכוי לדיומם.
 - אתה מעשן.
 - את בשטת חודש היריון הראשונים.

4. אזהרות נוספות:

- איבופרופן שייך לקבוצת תרופות אשר עלולות לגרום לפגיעה בפריות בנשים. הפגיעה הפיכה עם הפסקת הטיפול בתרופה. שימוש מדי פעם, בלתי סביר שיפגעו הסיכויים להיכנס להיריון; אך אם את מתקשה להיכנס להיריון, עליך היוועץ ברופא לפני נטילת התרופה זו.
- נוגדי דלקות ומשכי כאבים כמו איבופרופן עלולים להיות קשורים בעלייה קטנה בעינין בהתקף לב (אוסם שריר הלב) או שבץ מוחי, שיכון ברטילת מניונים גבוהים. אין לעבור על המנה או משך הטיפול המומלצים.
- קיים סיכון לנזק כליתי בילדים ומתבגרים במצבי התייבשות.

קשיים

קשיים הם בעלי נטייה גבוהה יותר לפתח תופעות לוואי בעקבות נטילת תכשירים מקבוצת נוגדי דלקות שאינם סטרואידים, כגון איבופרופן, ובעיקר דיומם או התקבכות בקיבה, העלולים להיות קטלניים.

התגובות בין תרופות:

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות אחרות המכילות נוגדי דלקות שאינם סטרואידים (כגון אספירין, איבופרופן), אין ליטול תרופות אלה יחד עם איבופרו ליקווין-ג'לס 200 על מנת להפחית סיכון לתופעות לוואי. ניתן ליטול אספירין במינון נמוך (עד 75 מ"ג ליום) בהמלצת רופא בלבד.
- סטרואידים (טיפול במצבים בלתי יציבים). שימוש בו זמנית עלול להגביר את הסיכון לזכאי או דיומם במערכת העיכול.
- אנטיביוטיקות הקבוצות קווינולונים.
- תרופות נגד קרישת דם (מדללי דם/מעכבי קרישה כגון אספירין/חומצה אצטילסליצילית, ואפרין, טיקלודיין).
- תרופות להמדת הלב (כגון לידז'קוידים של הלב - דוגמקין).
- תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה (למשל מעכבי אהים המרפר אנגיוטנסין ACE כמו קפטוריל, חוסמי בטא כמו אטנולול או אנוטנסטיל רצפטור אנגיוטנסין II כמו לוסרטן). איבופרופן עלול להפחית השפעת תרופות אלה.

- משותים (איבופרופן עלול להפחית את השפעת המשותים).
- תרופות לדיכוי זמני של מערכת החיסון (כגון מתוטקסט, ציקלופורין, טקרולימוס).
- תרופות לטיפול במזניה או דיכאון [כגון ליתיום - ישנן עדויות לכך ששימוש בו זמני מעלה את רמות הליתיום בדם, או כגון מעכבים סלקטיביים של ספיגה מחדש של סרטונין (SSRIs)] שימוש בו זמני עלול להגביר את הסיכון לדיומם במערכת העיכול.
- תרופות להספקת היריון (כגון מפיפראסטון).
- תרופות לטיפול באיידס (כגון זידודואין).

שימוש בתרופה ומזון

יש לבדוק את התרופה עם כוס מים. ניתן ליטול עם או ללא מזון.

היריון, הנקה ופוריות:

ספרי לרופא אם נכנסת להיריון במהלך הטיפול באיבופרו ליקווין-ג'לס 200.

אין ליטול איבופרו ליקווין-ג'לס 200 במהלך שלושת חודשי היריון האחרונים.

היוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה אם את ב-6 חודשי היריון הראשונים.

התרופה עלולה להפחית את היעילות של תרופות נטילת ראי סעיף 2- "אזהרות נוספות" לבי השפעת התרופה על הפריות.

נהיגה ושימוש במכונית:

שימוש במינון המומלץ ולמשך השימוש המומלץ, לא צפויות תופעות לוואי שעלולות להשפיע על פעולות אלו.

מידע חשוב על חלק מהמרקמים של התרופה

כל כמסה מכילה כ-7 מ"ג של סורביטול.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

איבופרו ליקווין-ג'לס 200 מיועד לטיפול לטווח קצר בלבד. יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר, למשך הזמן הקצר ביותר, הנדרשת לצורך הקלה על התסמינים. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12: 1-2 כמסות, עד 3 פעמים ביום. יש להמתין לפחות 4 שעות בין מנה למנה. אין ליטול יותר מ-6 כמסות ב-24 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

מינון לילדים: אין להשתמש בתרופה בילדים מתחת לגיל 12.

משך הטיפול

לשם הוועץ ברופא אם נדרש טיפול של יותר מ-3 ימים בילדים ומתבגרים בגילאי 12-18 או אם יש התמרה בתסמינים.

במבוגרים, אין ליטול את התרופה למשך יותר מ-10 ימים ורצויים ללא הוראה מרופא.

פנה לרופא או לרוקח אם התסמינים נמשכים, אם הכאבים או החום ממשיכים, או בהופעת תסמינים חדשים.

צורת הנטילה: אסור לחצות, לכתוש או ללעוס את התרופה. יש לבדוק את התרופה עם כוס מים. אין ליטול עם או ללא מזון.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, עלולים להופיע תסמינים כגון נמוגם או בחילה, הקאה, כאבי בטן, שלשול, צלצולים באוזניים, כאבי ראש, דיומם במערכת העיכול. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לאחד מינון של בית חולים, והבא ארזות התרופה איתך.

במקרים של הרעלה חמורה תיתכנה תופעות כגון: חוסר התמאות, עוררות או תרדמת ולעיתים פרוטוסים. החמרת אסתמה תיתכן בחולי אסתמה.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש להמשיך וליטול את התרופה על פי ההנחיות המפורטות מעלה. אין ליטול מנות הגדולות מהמינון המקובל.

אין ליטול תרופות בחושרן בדוקות הוותיות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה צדק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באיבופרו ליקווין-ג'לס 200 עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרה רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

ניתן למדעך את הסיכון לתופעות לוואי על ידי נטילה של המינון הנמוך ביותר למשך הזמן הקצר ביותר ההכרחיים לטיפול.

רפואתי (לדבר מיון של בית חולים או רופא) אם מופיעות תופעות לוואי:

תופעות הלוואי הבאות:

תסמינים של דיומם במערכת העיכול, כגון: הופעת צואה דמית או שחורה כזפת, הקאה דמית או עם חלקיקים כהים הנראים כמקשק קפה.

תסמינים של תגובה אלרגית חמורה, כגון:

- קשיי נשימה או אפצופים לא מוסברים.
- נחירות או דופק מהיר.
- תגובות עוריות מורחות כגון גרד, פריחה, קילוף עור או הופעת פשפחות (כגון תסמונת טיטבינג-לובינון).
- נפחות בפנים, בלבלב, או בגרון.

סימנים לבעיות במערכת הדם: דיומם או חבורות בלתי שגרתיים או בלתי מוסברים, חום, כאבי גרון, כיבים בפה, תסמינים דמויי נפשת ותשישות חמורה.

סימנים לבעיות בכבד: למשל כאבי בטן, צהבת (צהרבה של העור ולבן העיניים) או מותן שתן בצבע חום כהה.

יש לפנות לרופא אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות:

- חום, כאבי ראש, צואה נוזשה, הקאות.
- קשיי עיכול, כאבי בטן, עיזרות, שלשול, נפחות, בחילה.
- כאבים בחזה, דופק מהיר או לא סדיר.
- ציבת בכבד או בלבלב, המלות נפחות בפיות של הידיים או הרגליים.

תרופות כמו איבופרו ליקווין-ג'לס 200 עלולות להיות קשורות בעלייה קטנה בסיכון להתקף לב (אוסם שריר הלב) או שבץ מוחי. ראה סעיף 2 "אזהרות נוספות".

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מתוועת הלוואי מחמורה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדיווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" הנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כיסוף הקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence.aspx?formType=AdverseEffectMedic@mo.gov.il>

5. איך ליטול את התרופה?

מעט הרעלה תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לריח הידע יום וטווח יאיתום של ילדים /או ניתוקת עור לך תמנע תרופה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון: אין לאחסן בטמפרטורה מעל 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם: Macroglol 600, Purified water, Potassium hydroxide, Gelatin, Sorbitol, Sorbitan-1,4, Maize starch, Higher polyols, Mannitol, Patent blue E-131, Titanium dioxide E-171.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: כמסות גלטיין רכות, בצבע כחול עם הדפסה "200".

גדלי אריזה מואשמים 2, 4, 8, 10, 16, 20, 24, 30, 32, 50, 60, 70, 80 כמסות.

ייתכן ולא כל גדלי האריזות משוקים.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: מאי 2018

משרד רישום התרופות פבנקס התרופות הממלכתי
מספר הבריאות: 00-3107-18-131

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר, על אף זאת, התרופה מיועדת לנשי בני המינים.

בעל רישום ויצרן: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל

מיוצר עבור ומשווק על ידי: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516